


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1090/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1090/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1090/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1090/A


F. III


16/2

1090

A







42550
DE RATIONE VICTVS

IN SINGVLIS FEBRIBVS


secundum Hippocratem,

IN GENERE ET SIGILLATIM

LIBRI III.

AUTHORE BRVDO LVSITANO

Medico, Dionysij filio.



VENETIIS. MDLIX.

DE RATIONE VITAE

IN S. MOVIS TERRIS


ROMANIS

IN GEMER ET SIGILLATIM

LIBER

LIBER

M. D. C. C. C.



NEWELL'S


CAPITA TRIVM

LIBRORVM BRVDI

LVSITANI

DE RATIONE VICTVS

Febricitantium.



LIBRI PRIMI.



Isceptionem continet, an crasso
uictu alendi sint acute febricitan-
tes, ut arbitratus est Petronas,
pro quo variae rationes hic adfe-
runtur.

Cap. 1

Quod tenui uictu alendi sunt acu-
tè febricitantes, iuxta rationalium medicorum
sententiam.

Cap. 2

Ostendit quid per crassum, tenuem, exacte tenuem,
tenuissimum, ultimo tenuissimum, uictum Hipp.
intelligat.

Cap. 3

Ostendit qualiter sint intelligenda crassi, symmetri,
& tenuis uictus notiones, quas Galenus primo
Aphorismo assignauit.

cap. 4

Locum citat Galeni à quo ostenditur qualiter intel-
ligenda sit tenuis uictus ratio.

cap. 5

Quod uictus forma à robore uirtutis, & à distantia
status sumenda sit.

cap. 6

Rationes eorum qui à constitutione morbi, & à ro-
bere

LIBRI. I.

bore uirtutis, uictus formam sumendam esse opinantur. cap. 7

Quod in multis locis Hippocrates secundæ positioni consentit in inuestigatione formæ uictus. cap. 8

Non satis esse ad rectam formæ uictus inuentionem, uirtutis robur, & morbi constitutionem considerare, sed ijs præcognitionem status adiungendam esse. cap. 9

Iuxta status distantiam, singulis morborum acutorum conuenientem elicere uictus formam docet. cap. 10

An medico liceat quatuor dierum abstinentiam febricitantibus aliquando consulere. cap. 11

Virtutis imbecillitas præsens, & quæ in posterum futura erit, è quibus sit cognoscenda. cap. 12

Quo nam signo discernatur morbus qui ad quartum terminari debeat. cap. 13

Acuti morbi quo maxime deprehendantur signo, & quæ nam sit acutarum febrium leuissima, & quem habeat terminum. cap. 14

E quibus signis, morbum ad septimum & ad undecimum terminandum fore sciamus. cap. 15

Parum referre ad rectam formæ uictus inuentionem, an terminus diebus intermedijs accadat. cap. 16

Quænam febris intra quartum, & quæ intra septimum, undecimum, & quartumdecimum terminentur. cap. 17

An à statu, uel à crise, uel à termino uniuscuiusque morbi, quem à symptomatibus sumendum diximus, uictus ratio sumenda sit. cap. 18

Tem

CAPITULA

- Tempora morborum tripliciter distingui.* cap. 19
Quotupliciter ab Hippocrate crisis nomen accipia-
tur: & tres esse symptomatum primas causas. ca. 20
De qua status acceptio intelligendus sit aphorismus,
Contemplari igitur oportet aegrotatem si sufficiat
cum victu ad statum aegritudinis, &c. cap. 21
Quod in ijs symptomatibus quae morbum insequun-
tur, cum ad maximam perueniunt magnitudinem,
statum esse intelligere oportet. cap. 22
Quod cum duo sint quae incremento symptomatum
finem imponant, nempe ultimum resistentiae natu-
rae, & perfecta morbi coctiones. terminum non à
coctione, sed à robore uirtutis & symptomatum
magnitudine accipiendum fore ostendit. A qui-
bus ultimum resistentiae accipitur natura. cap. 23
Quod primus Hippocra. post assiduas observationes
iuxta symptomatum differentias, in singulis mor-
bis terminos, hoc est ultimum resistentiae naturae
diffiniuit. cap. 24
Statum, à quo victus formam inuestigandam docuit
Hippocrates in aphor. Contemplari igitur oportet
&c. terminus esse ad quem usq; laborantis uir-
tus morbi acumen citra aliquam quatuor cricum
ferre possit. cap. 25
Quod victus ratio conualituris pariter & morituris
adhibenda sit. cap. 26
Quod duae aliae sint morborum constitutiones, quae vi-
ctus rationem ualde dissimilem à iam dicta expo-
scant. Cap. 27

LIBRI II.

In morbis ijs qui ab initio statim florent & uigent, non à distantia status, sed à coctione morbi uictus rationem sumendam esse ostendit. Cap. 28

Quotupliciter uirtus urgeat, & signa, per quæ uirtutem maximè, multum, & parum urgentem dignoscere possimus. Cap. 29

Quotupliciter morbus urgeat. Cap. 30

Tabella, qua facile quiuis in singulis morbis conuenientem uictus formam inuenire possit. Cap. 31

LIBRI SECVNDI.

A quibus quantitas uictus sumatur. Cap. 1

An melius sit ad id quod magis est accedere, quàm ad minus, ubi à iusto modo sit abscedendum. Cap. 2

An forma uictus seruāda sit à morbi initio ad statum usque, & quantitas mutanda, an e contra. Cap. 3

A quibus numerus oblationis sumatur. Cap. 4

A quibus sumatur qualis uictus febricitantibus sit exhibendus. Cap. 5

An uictus affectum & eius causam respicere debeat. Cap. 6

An uictus opponi debeat intemperiei æquali gradu contrariæ qualitatis. Cap. 7

A tribus qualitatem uictus sumi. Cap. 8

A quibus sumatur quando exhibere cibum febricitantibus debeamus. cap. 9

Eorum quæ de ptisana Hippocrates scripsit nonnulla sunt

CAPITA

*sunt a'ijs cibarijs communia, & aliqua ptisanę pe-
culiaria.*

cap. 10

Vbi mulsa, ubi oxymelite utendum sit.

cap. 11

*A quibus ratio potus qui ægrotantibus ministrandus
sit sumatur.*

cap. 12

*Quod Lusitani medici & Hispani methodum Hippo-
cratis in administratione uictus non insequan-
tur.*

cap. 13

*Minoratiuam euacuationem quę per pharmacum fit
non esse semper administrandam in initijs febriliū
putridarum.*

cap. 14

*Qui inter initia morborum tenui magis uictu utun-
tur, cūque prope statum peruentum est, soli-
diori, in damnum ægrotantium grauiter pec-
cant.*

cap. 15

*Uictus rationem quam medici Angli obseruant præ-
ceptis artis medicę magis consentire.*

cap. 16

*Anglis ægrotantibus non esse tenuem uictum offeren-
dum, sumpta indicatione à consuetudine, regione,
& cæli temperie.*

cap. 17

*Anglos uitiosis aut semicorruptis humoribus abun-
dare, non crudis.*

cap. 18

*Ægrotantibus Anglis tenuem uictum ob id mini-
strare ut redundantes in eorum uentriculis humo-
res absumentur, errorem esse.*

cap. 19

* 4

Causa

LIBRI III.

LIBRI TERTII.

- Causo legitimo quis uictus competat* Cap. 1
Causo notho seu spurio conueniens uictus qui sit.
cap. 2
Quid Hippocr. per attractorias intelligat sorbitiones. cap. 3
Uictus quos recentiores medici tradidere, causo non conuenire ostendit. cap. 4
Quis uictus synochys febribus competat. cap. 5
Inconuenientes esse uictus synochis, quos recentiores medici tradunt. cap. 6
Uictum tertianæ continuæ conuenientem inquirat. cap. 7
Contra exhibentes assa gallinaceorum hepata, in feb. continuis. Item cibum ex refrigerantibus herbis ante morbi coctionem in continuis febribus non conuenire. cap. 8
Quis uictus continuæ à phlegmate conueniat. cap. 9
Phlegmatica febris quem exposcat uictum. cap. 10
Tertianæ conuenientem uictum inuestigat, primum exquisitæ, deinde alijs eius differentijs. cap. 11
Disceptatio an rectè consuluerint Arabes medici, in tertiana pura à cibis in quibus est caro abstinendum esse. cap. 12
Febri à pituita dulci, & salsa quis uictus conueniat. cap. 13
Craßiorem uictum exposcere tertianam quàm quotidianam.

CAPITA.

- tidianam contra recentiores medicos.* cap. 14
An in febre phlegmatica procedendum sit tenui vi-
ctu ad septimum usque, ut arbitrati sunt antiquiores
Arabum. cap. 15
Febri quartana quis victus competat. cap. 16
Qua specie quartana tenui sit utendum victu ad vi-
gesimum usque diem cap. 17
Rationem inquit quare diuersis cibarijs prauæ sub-
stantiæ aliquando sanentur ij qui quartana febre
laborant; occasionesque singulorum remediorum
signis docet cognoscere. cap. 18
Pestilenti febre conuenientem victum inuestigat.
 cap. 19
An alia conueniant in pestilenti constitutione gratia
præseruationis & curationis cap. 20
Victum inquit colliquantibus febribus conuenien-
tem. cap. 21
Victum inuestigat qui morbillis & uariolis compe-
tat. cap. 22
An usus salitorum piscium in uariolis sit secundum
rationem. cap. 23
Victum conuenientem hemitriteo docet. cap. 24
Febri in qua exteriora frigent, & interiora calent,
& econtra, quis conueniat victus. cap. 25
Quando à symptomatibus sumenda sit victus ratio.
 cap. 26
In uigilijs conuenientem victum inuestigat. cap. 27
Victum docet, qui sitienti infirmo conuenit.
 cap. 28
 Ad

LIBR I. III.

Ad inducendam appetentiam quæ conueniant cibaria. cap. 29


Qui ad sedandam tussim proffit uictus. cap. 30

Ad obstructiones iocineris & lienis quæ competant cibaria. cap. 31

In fluxu uentris, quæ uictus ratio sit obseruanda. cap. 32

FINIS.


triba-
p. 19
p. 10
vunt
p. 31
mda.
31



BRVDI LVSITANI DE VICTV
FEBRICITANTIVM

Secundum Hippocratem, & Galenum,

Ad Lectorem.



P R A E F A T I O.



V M omnis generis affectus qui homini accidere possunt, uia triplici soluantur, pharmaco, manuali operatione, & debita uictus administratione: partem eam quæ de pharmacis agit quando & qualia exhiberi debeant plurimi Græcorum luculenter tractarunt: disertissime quidem Galenus multis in locis utranque disseruit: eam uerò quæ rectam uictus administrationem docet, calamo ideo dignam nostro iudicauimus, quia qui speculationem generatim tractarunt rationali methodo, cum ad particularia peruentum est, hoc est ad singulas morborum species, deficere uidentur ab eo quod res exigit. Nam & illa animaduersione digna sunt, an ab ijs quæ in uniuersum dicta sunt amplectantur, aut extra sint. Et horum singula diuisione non carêt. Qui autem eam in particularibus tractarunt, ut medici recetiores inartificiose quidem & subinde a uera deuiantes methodo, multa tradiderunt, quæ ægrotantibus minus salubria sunt. Rei præterea difficultas medicorum nostri temporis opinionum uarietas, in debita uictus administratione, dictorum Hipp. obscuritas, effecere, ut id quod à perspicua & completa doctrina deest, apponam.

Atque

P R A E F A T I O


Atque eo maxime quod medicæ artis pars quæ uictus rationem docet reliquis duab. potior sit, & magis necessaria. Illæ enim morbum & eius causas, hæc corporis facultates præcipuè respicit. Reliquæ duæ nisi hæc adsit consistere non ualent. At sola uictus ratione scimus multos à morbis liberatos quotidie: & plures essent profectò si medici quauis occasione pharmacorum auxilium non implorassent. Quot enim sunt qui solo competenti uictu citra ullum discrimen ab affectibus liberari possent, qui propter rem pharmacis contunduntur? Ijs adde si in quauis illarum error contingat quantum sit exitialis, in acutis præsertim morbis, in quibus noxæ grauiores esse solent, ut scite à Galeno in secundo de ratione uictus scriptum est in hæc uerba: Si enim hominis naturam non noueris, metus est ne plus iusto uacues, uel nullo pacto uacuationem moueas, aut si moueris, non tamen sufficienter euacues. Quæ omnia magnas in morbis acutis pariunt offensas. Quapropter cum in arte medica ultra artificialem coniecturam, quam Græci tecmarfin dicunt, certitudo alia non sit, cautè agendum semperque ad id ubi errores minus discriminis afferunt magis accedendum. Nec in acutis duntaxat morbis maximam uim habet uictus ratio, sed etiam in diuturnis. Quod enim medicaminibus obtinere medicus non potuit, id conueniens uictus temporis longitudine efficit. Cuius argumentum est medicos ijs quos incuratos dimittunt, conuenientis uictus obseruare rationem, tanquam ultimum auxilium à quo superfit spes tandem, consulere. Quod autem in acutis admodum sit necessaria hæc speculatio ratio indicat. Nam si minus nutrias naturæ uiris adimis: sin magis, morbo fomenta ministras, utrunque autem medicus prudens dabit operam ut uitet. Nam ut à Galeno scriptum est in secundo de ratione uictus in morbis acutis, Verū (inquit) si in uentrem absorptus fuerit cibus quod redundat superfluitq; , si aliàs, multò magis in acutis tollere est difficile. Præterea in eodem, Quod plus est, inquit exuperatq; , noxas interdum inemendabiles facit. Eodem præterea libro

A V T H O R I S


libro ipse Hipp. neque sanè calumniam effugere potest, inquit, qui ægrè ualentem ex uasorum inanitione non cognoscit torquetq; diæta, periculum siquidem aliquod affert erratum hoc, sed longè minus quàm alterum & risu dignum magis. Cum hæc igitur speculatio admodum sit febricitantibus necessaria, magniq; sit momèti in morbis acutis, cernens nostra ætate hanc partem artis à medicis uelut incultam & neglectam, & quosque citra rationalem methodum suum insequi modum, Hipp. dogmata post terga mittentes tanquam inutilia, & quæ ad artis opera adduci non possint; uisum est mihi de ratione uictus librum hunc componere, ut in eo mentem Hipp. & Gal. aperte ostendamus: & quàm facile sit secundum eorum doctrinam febricitantibus uictus administrationem debitam differamus. Singulis postea febrium speciebus conuenientem uictum perscribemus. Postremò secundū naturam symptomatum uictus formam iminurabimus. Vnum ergo prius admonentes ad rem festinabimus, Hippocratis & Galeni dictis fidem dari postulamus, reliquorum uerò Græcorum tum Arabum quantam ratio & ueterum autoritas concesserit. Illud quoque admonere oportet; quod ad modum quem obseruabo in adducendis aliorum medicorum opinionibus, citabo proprijs nominibus eos qui recte senserint, qui opinione mea à uero deuiauerint innominatos dimittam. Neminem uolo sua defraudare, gloria, præcipuè eò quod & ego ipse facile in ijs labi possum, unde iure mihi fiet, quemadmodum & ego feci. Nam in hoc Hippocratem in libro de arte insequor, qui ita scribit: Malis autem uerbis aliorum inuenta uituperare ars non est.

DIONISIUS MEDICVS
BRVDIVS EIVS FILIVS

INTERLOCVTORES.



Brudius.




BVND è à medicis hodie disceptatum est de epithematum impositione. In re alia non uideo inter medicos citius conuenire ac in debita uictus administratione. Quod argumentum est rectam exhibendi uictus rationem autem adeo manifestum esse, ut nullus supersit dubitationi locus, aut adeo difficilem ut supra omnem sit disputationem. Aut ideo quod ab ijs, quos in uictus exhibitione committunt erroribus parum posse ægrotantes lædi iudicant. D. In utraque artis medicæ parte, tum quæ de pharmacis, tum ea quæ manuali agit operatione, secundum antiquorum dogmata medici agere conantur. Sola in uictus ratione non aliter quàm si intra portum nauigarent nauticum directorium dimitunt. Cum tamen res aliter habeat. Nam si antiquis aliqua sit adhibenda fides, uni præcipue Hipp. Scripta quæ posteris reliquit, haud qualescunque, sed insignes maxime noxas incurrere acutè ægrotantes ab incompetenti uictu, & intempestiue exhibito apertè ostendunt. Quantæ autem huic uires sint, si rectè administretur in roboranda natura, declarat ieiunantium ad quasunque leuiusculas obeundas actiones formidolosa, imbecillitas. B. Pater optime da quæso ut tecum de hac re sermonem habeam. Nam ocium huic speculationi opportunum rigida præbet hyems.

A Ardet

P R A E F A T I O .

Ardet animus ab ijs quibus non paucis implicitus est no-
dis explicari . Scio te annos quadraginta peruigili le-
ctione Græcorum & Arabum uolumina uoluisse, ita,
ut recentiorum nullum prætermiseris quorum cala-
mus dignus sit nomine. Hoc temporis interuallo inces-
santer ægrotantium gemitibus assidens inusitata dili-
gentia præstantissimi apud occidentalissimos hominũ
medici nomen es consecutus . Nec me fugit te dicere
solitum , ingenuum artificem esse qui sciat quæ cæteri,
& quare cæteros lateant. Hic unus instar multorum est
D. Gaudeo quod in hanc speculationem procliuem stu-
dio ardenti te sentiam . Ego uerò quod mea dedit scire
ætas libenter tibi aperiam. Id enim iam diu decreueram
ut id quod in arte medica longo usu, aut humano gene-
ri commodum, aut noxium inueneram, in te ipso ad ob-
liuionem senij (ut Plato ait) uelut comentarios mihi re-
ponerem. Simul ut mihi ad manus cum morte iam de-
certanti tertius à parte meo succedas, medico apud prin-
cipes Hispanorum viros præclaro, ita ut per artis medi-
cæ peritia nostræ domui iam familiaris inhabitet. Nam
nodus triplex non facile soluitur, ut Hæbreorum sa-
pienti placuit.

AUTHOR AD LECTOREM DE
ARGUMENTIS TRIVM LIBRORVM
SEQUENTIVM.



V*T Singula quæ in hoc continentur opusculo facile inueniri possent, in libros tres hanc de victu speculationem partiti sumus.*

In primo de forma victus loquemur; eius autem anacephaleo sin habes in duobus ultimis capitib.

In secundo de quantitate & qualitate victus, & de numero & hora administrationis agemus.

In tertio singulis febribus conuenientem victum inuestigabimus: cui adiecta est victus ratio secundum symptomatum naturam.

BRVDI LV³SITANI DE RATIONE

VICTVS

*In febris Liber primus, qui est de forma
victus.*

DISCEPTATIO AN CRASSVS VI-
ctus acute febricitantibus conueniat,
VT MEDICVS CONTRA METHODICOS
disputans in hoc capite asserit.



CAPVT PRIMVM.



IRCA victus admini-
strationem varias esse cō-
stat apud medicos opinio-
nes. Fuerunt qui crasso
semper victu quibuscun-
que in morbis alendos
agrotantes opinati fue-
rint, ut olim Romæ Pe-
tronas, cuius meminit Gal. in Proœmio libri de ra-
tione victus in acutis. Sunt qui semper tenui. Sunt
in primis ægritudinis diebus magis crasso, deinde ma-
gis tenui. Sunt, & qui contrà censeant. Cum
iis primum obseruant modum, ut pote, qui rem
attigisse rationibus proprijs, magis videntur,

A 3 sermo-

DE VICTV FEBRICIT.

Aphor.

sermonem habebimus . Et , ut disceptatio recte procedat , præmittere oportet crassi , tenuis , & symmetri uictus , notiones , ut constet id de quo disputatio est . Est quidem uires augere potens alimētum quod plenum aut crassum uocatur , à Græcis διαίτα ἀδρὰ dicitur . Conseruās uerò quod symmetrum existit . Quod uerò comminuit tenue, λεπτόν διαίταν Græci nuncupant . Has à methodico confestas habere notiones uolumus . Insuper & illud , raro accidere , ut robur corporis ægrotantium maius reddere quam acceperimus , studeamus , imò magna ex parte properandum esse in longis morbis uires seruare , in acutis parum debilitatas conseruare . Concessa hæc omnia sunt à Gal. in Aphorif. Tenuēs & exquisiti uictus , &c. Ex quibus aperte ostenditur , ægrotantibus symmetrum , tenuem , aut tenuissimum , conuenire uictum , eum uerò qui crassus dicitur , solum sanis concedendum corporibus , secundum rationalium medicorum dogmata .

Eorum uerò qui contra sentiunt nempe quibuscunque in morbis crasso uictu , qui uires augeat utendum esse , rationes audire oportet . In omni morbo ob naturæ robur sequi euasione[m] sæpius , ob imbecillitatem uerò , in mortis discrimen laborante deuenire . Cibo & potu cum natura uires assumat , talem iccirco ac tantum indulgendum , ut laborantis naturam roborare ualeat . Id cum crassus solum uictus præstet , quibuscunque in morbis ministrandum fore . Præterea aut uirtus corporis morbo

bo superiore est, aut æqualis, aut inferior. Quæ nam uerò spes superest tenui aut symmetro utenti uictu, dum natura ab initio morbo est imbecillior, cum horum neuter vires naturæ augeat. At posse ex ijs aliquot crasso liberari uictu, experientia eorum qui pestilenti febre detinentur, qua nulla alia exitiosior est, constat: Cum qua duellum si committat natura, ut plurimum succumbit, ut asseruit Gale. in expositione illius, Quibuscunque crisis sit, ab ea tamen multos à medicis destitutos sanatos esse, quos uulgus ipsa natura edoctum, crasso uictu nutriuerit. Ita ut nonnulli rationalium medicorum id aduertentes, crasso uictu eos reficere qui pestilentia detinentur iubeant; Vt Celsus qui uinum calidum ac meratius dare iubet, & omnia glutinosa, inter qua carnem generis eiusdem, Auicenna etiam summus inter Arabes medicus. Qui ex ijs (inquit) uiriliter agunt & uiolenter comedunt, euadunt. Neque id præter rationem est, nam quæ antea inualidæ vires erant, crassi uictus ope, firmiores euadunt. Nullos autem tenui aut symmetro posse liberari docet rationalium medicorum sollicitudo, in cognoscendis ijs morbis qui corporis vires superant, ut ab eis medici illæso honore confestim discedant. Ob quam causam Hippocr. rationalium medicorum princeps, Cognoscere (inquit,) oportet, horum affectuum naturas, quantum supra vires sunt corporum: Tenues ergo uictus, & qui tenuissimi dicuntur, solum ijs ministrandos morbis fo-

In primo
prædictio
num.

DE VICTV FEBRICIT.

re methodice fatebaris, in quibus natura ab initio morbo superior est. Quod Gal. confessus est, cum de victus forma secundum Hippocratis mentem ageret, nempe ubi tenui, aut tenuissimo utendum esset, admonet eum victum in ijs duntaxat morbis ministrandum, qui ad salutem terminantur, minime in ijs qui ad mortem. Cuius uerba ita habent secundum ueram uersionem; Non enim distrahere naturam oportet ad aliam nouam coctionem, cum eo tempore humorum morbum efficientium coctioni fortiter uacet, & sit paulò post ipsos euictura. Sic à nobis ostensum est in tractatione de crisibus, secundum illos scilicet morbos sermone omni procedete, in quibus omnino diæta et curatione utimur. Sunt autem illi, in quibus uigorem excipit declinatio. nam in quibus mors post uigorem sequitur, ea solum artis parte quæ prædicit utemur, prænunciantes quod futurum est, ut absque culpa simus futuri euentus. In solis ergo morbis qui ad salutem sunt terminandi tenui, aut tenuissimo utendum esse victu, apertè supra dicta Galen. uerba declarant. Sed dicat methodicus oportet, unde medicus acuto morbo inchoante euasurum ægrum, certo sciet, ut illi tenuem instituat victum, aut tenuissimum: aut horum neutrum, si moriturum? Cum in arte medica futuri euentus nulla certa habeatur scientia, necesse est, ut aliquando eos qui liberandi sunt, præter medicorum opinionem, crasso
alamus

LIBER I.

alamus uictu, et non rarò eos qui extremum inspe-
 rato clausuri sunt diem tenui. Crasso ergo ui-
 ctu medicorum iudicio morituri, sanabuntur:
 tenui eorundem opinione conualituri, interi-
 bunt. Quod fateri cogeris si optimorum medi-
 corum iudicio, quibus non rarò præter opinio-
 nem tales euentus accidunt, quicquam certitu-
 dinis tribuas. Si necessitatem salutis aut mortis
 supra dicta Galen. uerba supponere dicas, nihili
 est profectò Hippocrat. apud eos qui conuale-
 scent necessariò aut morientur, et nihil interest si
 crasso aut tenui hos alas uictu comparandæ salutis
 gratia. At si fortè methodicus concedat certa scien-
 tia nihil haberi, esse tamen in arte medica artificia-
 lem coniecturam, quam Græci τέχμαστιν dicunt;
 qua eorum quæ sunt aut erunt, cognitio habetur:
 Hac instructus medicus coniiciens ab initio ægritu-
 dinis corporis laborantis uirtutem morbo supe-
 riorem, ægrum conualiturum sperabit, tenuem-
 que uictum prout morbo acumen contigerit insti-
 tuet. Quod si inferiorem moriturum. Quare
 nec tenuem, nec tenuissimum huic ministrabit,
 sola prædictione contentus discedet. Attamen
 cum coniecturale signum non necessarium sit,
 neque impossibile aliter habere non tollet,
 quod supra obiectum est. Præcipuè cum Hippocr.
 ipse acutorum morborum pronuntiationes, non
 omnino certas esse, nec salutis, nec mortis scri-
 pserit.

DE VICTV FEBRICIT.

*pferit. Præterea esto ab initio acuti morbi uirtus
 tem superiorem certò conijcias, tenuem adhibebis
 uictum methodicè: sed cum talis ob tenuitatem ui-
 res minuat, ut supra ostensum est de mente Gal. fie-
 ri posse, ut tenui illo uictu moriatur ille, crasso ue-
 rò seruetur. (Nam si ponas uirtutis supra morbum
 excessum tantillum, ut soli uincendo morbo & eius
 obsistere incursibus uirtus sufficiat, apudque uigo-
 rem sola habita morbi ratione minori excessu su-
 persit morbo superior quàm sit id quod tenuis ui-
 ctus uirium exoluit.) Hunc si tenui uictu, qui quan-
 tum ex se est uires exoluat, ab initio alas, putas-
 ne apud statum superiorem futurum, an potius in-
 feriolem? Ego quidem non peruenturum ad sta-
 tum si ultra dies septem prorogetur opinor. At si
 symmetro uictu qui quantum ex se est uires seruat,
 quo solum in chronicis morbis utendum fore ratio-
 nalium medicorum secta imperat, hunc nutrias,
 nonne euadet? Nam ratione symmetri uictus nul-
 lum patiuntur uires detrimentum. Quod si cibum
 qui uires naturæ addat ministres multò fortiolem
 hunc quo uis morbi tempore quàm symmetro ui-
 ctu efficies. Sed forsan ad hæc methodicus dixerit,
 uictum tenuem, uirtutem etsi imbecilliolem quan-
 tumcunque reddat, morbum breuiorem efficere.
 Nam natura, cibi tenuis coctioni parum incum-
 bens, diutius materiæ morbi uacabit, unde citius
 fieri coctiones, minusque morbi symptomata & la-
 bores*

bores naturæ robur exoluentes durare continget. Unde etsi magis æger tenui uictu exoluatur quam symmetro aut crasso: quia tamen minori exoluitur tempore, minus damni natura feret acuto morbo laborantis, ex tenui uictu, quam symmetro aut crasso, si uirtutis tenorem in statu cum tenui uictu conferas, ad eandem cum symmetro aut crasso apud uigorem. Hæc methodicus respondens arbitratur iuxta tenuitatem aut crassitiem uictus citius aut tardius futuras coctiones, quare & distantiam status longiorem & breuiorem iuxta cibi crassioris, aut magis tenuis exhibitionem fieri posse putabit. Cum Gal. libr. de crisis primo, & in lib. de quatuor morbi temporibus, & in secundo de ratione uictus, in expositione illius, Coniungere autem oportet & robur &c. statum esse cum maximè conficiuntur coctiones ostendat. Quod si ita, ut opinatur, res haberet, grauiter peccasset Galen. rationalis methodi author ab Hyppocrate secundus, cum uictus formam penes distantiam status sumendam nobis præcipiat, si pro uictus ratione longior & breuior fieri posset. Nam eo modo rectius esset status distantiam ex forma uictus coniungere, quàm contrarium. Sed pone rursus acutè febricitantis uires morbo superiores, morbumque ad septimum terminandum, tenui hunc nutries uictu qui uires minuit, nempe hydromelite, aut ptisanæ cremore, aut huiusmodi tenui sorbitiuncula,

Septima

DE VICTV FEBRICIT.

Septima die, utpote quo morbi vigor futurus sit, ægrotantem in omnimoda seruabis inedia. Agē nunc sanum hominem æquē robustum, ac ægrotans erat, simili uictu ad septimum seruato, totaque ea die incibatum hominem conuenias uesperascente die septimo qualem illum fore putas? Quod si prima die miliaria sex pedestri itinere peragebat citra manifestum incommodum, quot die septima putas posse peragere? Quilibet sanē mentis compos, an tria possit conficere dubitabit.

Idem de saltu, cursu, ponderis eleuatione, in summa in omni conatu multum ab ea deficiet meta, quam prima die attingebat. Sed in naturalibus actionibus idem iudicium. Nam si die septima dimidium cibi, quem ante diem primam facile digerebat offeras, grauato uentriculo lædetur. Quanto autem uitalis facultas fiet imbecillior declarant languidi pulsus integra die ieiunantium. Cum ergo sano homini sola illius uictus ratione omnium trium uirtutum tam sensibilis accidat imbecillitas, quanto plus læsionis, & detrimēti uirium ex tali uictu ægrotantes ferent arbitraris? Quod si hæsitas, roga huius sectæ principes Hippocratem, secundo de ratione uictus, & Galenum, cum scribunt detrimenta minus sanos, quàm ægros afficere. Præterea languentes à repentina uictus mutatione lædi magis, quàm sanos

sanos, sed adhuc eos magis, qui acutis infestantur morbis. Item in eodem, permutatio uictus si sanis molesta est, languentibus molestior erit. Cum ergo hominem sanum si tenui illo uictu ad septimum nutrias, manifestè eius vires minui uideamus, multo magis id ægrotanti accidet, ita ut manifesto excessu imbecilliores fiant ex illo uictu. Ostensa est causa una insignis diminutionis uirium. Sed age morbum & eius symptomata, earum quantum absument septem dierum interuallo consideremus. Profecto si mens humana ab experientia edocta, ut trutina horum admittitur, iudicabit labores acuti morbi vires posse diebus septem insigniter imbecilliores reddere. Una enim die patiens homo ephemeram febrem, die sequenti sensibilibiter imbecillior est, quàm ante febris inuasionem. A virtutis igitur robore duo sunt, quæ insigniter detrahunt, & præter modum absument, nempe tenuis uictus, & morbus. Quod si morbo vires accrescere ad statum usque iuxta Hyppocratis sententiam intelligas; Circa principia & fines, & cæt. Colliges, non quencunque excessum Naturæ supra morbum, satis esse ad euasionem. Pone exempli causa morbum, & eius symptomata quartam uirium partem absumpsisse: tenuem uictum sextam, morbi vires tertiam superadant, si prima die uirtus duplo erat, ad morbum excessu superior die septi-

DE VICTV FEBRICIT.

die septima eodem erit imbecillior una octaua .
Quare illa uictus ratione morietur ille cuius uir-
tus prima die erat morbo bis fortior . Quod si hos
respectus nempe quartam, sextam, & tertiam, ut
incertos nihil certi ostendere dicas; concedam ali-
qua ex parte; nam exempli causa adducta sunt, ut
manifestum fiat, plures eorum qui ab initio morbo
erant uiribus superiores, posse ex ea uictus ratione
interire, multoque excessu opus esse, ut illo ui-
ctu quis euadat. At si ijs quæ a fide dignis medicis
& philosophis scripta sunt in reductione effectuum
agentium naturalium ad numeros, aliqua fides sit
adhibenda, quibus ostendere nituntur ab effectu
insensili ad eundem cum manifestè sentitur duplā
esse geometricam rationem, minori quàm par erat
ratione supradictos respectus me definisse scies. Ma-
ximum ergo malum est eo uti uictu, quo plures qui
alioquin seruari poterant intereant. Quod si sermo
nem ad eos qui à morbi initio pari certant robore,
conuertamus, horum nullum intelliges tenui uictu
posse euadere, ratione monstrante, cum morbi vi-
res ad statum vsque validiores fiant, vt ab Hip.
scriptum est, corporis autem virtus imbecilli-
or. Qui ergo ab initio pari cum morbo robore
certabant paulopost eodem futuros imbecilliores
constat. Nisi igitur id quod morbus & eius sy-
mptomata virium absument, crassi uictus ope re-
pendas, mors certa sequetur. Quod si dicat met-
hodicus præter uictum tenuem esse medicis re-
media,

media, quibus morbi causam abscindunt, ut missione sanguinis, et purgatione; ijs si quidem euacuationibus humorem morbum efficientem educunt. Vnde & si pari robore ab initio natura cum morbo certet ob causæ morbi euacuationem bona acuminis morbi pars tollitur, & multo superior natura redditur, cuius causa euadet infirmus. Sic in Anglia olim Lusitano contigit. laborabat pleuritide, cumque morbo ingrauescente delirare cœpisset, omniaque in deterius abirent, tertio facta fuit sanguinis missio, multumque eductum est, confestim omnia mitiora fuere, melior pulsus & urina, cessauit delirium, screauit, sanatus est. Videbatur tamen ante sanguinis missionem uirtus morbo inualidior. Sint hæc ut uis methodicè, hac tua ratione, ut multoties huiusmodi possis salubres euacuationes moliri, citra magnum uirium incommodum; melius tamen egisses si crasso uictu qui uires ægrotantis augeat usus esses, quàm tenui, à quo uires imbecilliores effectæ, plures euacuationes citra magnum uitæ discrimen non ferunt. Insuper si euacuationes pro uotis succedant, non oberit ante euacuationem naturam cibo roborasse crassiusculo. Neque quicquam si id agas postmodum die una interposita lædes. A fœlici nanque euacuatione roborare naturam, ut potentiùs quod reliquum est coquat, & expellat, oportet. Quod si e contra accadat, ut non rarò usu uenire quotidie cernimus,

DE VICTV FEBRICIT.

mus, intempestiuas à medicis euacuationes, easdemque infelices, & cum magno uirium ægotantis incommodo fieri: tenui hos indigere uictu iudicas, qui uires adhuc imbecilliores reddat, an eo magis qui aliquod imbecillæ naturæ solamen asserat, ut eas quas euacuatione deiecit uires medicus cibo roboret? Nec hoc ipsi rationales negabunt, nempe si in euacuatione erratum sit, melius esse crassiori, quàm tenui, magis usum fuisse uictu, nam enunciationem à qua illa ostenditur, ut ueram admittent, utpote ab Hippocrat. concessam & Galeno. Nempe ægotantes ab ijs, aut quæ ipsi commiserint, aut sponte, aut modo quæcunque acciderint peccatis, minus lædi, crassiori uictu si usi fuerint, quam tenui. A sanorum experientia ad ægotantes id deducit Hippocrat.

Sano enim homini si aliquid præter consuetudinem accadat, ut exempli causa longam pedestri itinere peragat uiam, aut Venere nimia usus sit præter consuetudinem, aut Solis æstus diutius passus fuerit, aut alius quicunque error accadat, magis lædetur si tenui uictu ante usus fuerit quam crasso. Et hoc est quod Hippocra. dixit, Propterea sanis fallaces sunt ualde tennes & exquisiti uictus, quoniam peccata difficilius ferunt. In quo Aphorism. non agit ille de peccato, quod in exhibendo uictu committitur, utrum maius sit in tenuis exhibitione

zione an crassioris, ut perperam plurimi intelligūt, sed de quibuscunque agit peccatis modo quocunque euenientibus quæ magis eum ledere ægrotantem ait, qui tenui quàm qui crassiori usus fuerit victu. Et ut certo scias hanc fuisse Hyp. mentem non ab re fuerit Græcum Gal. contextum adducere qui idem de Hy. sentit.

Κὺν ita ait ἀμείναν δὲ ἢ προτέρα γραφὴ περὶ λαμβάνει γὰρ καὶ τὰν τὴν καὶ γενικώτερον ποιᾶται τὸν λόγον. Ὑπὲρ ἀπέσης ἀμαρτίας ἐκδεῖ δάσκεισα τῆς ακρουσίως τὲ καὶ ἐκυσίως συμπιπτουσης, τοῖς νοσοῦσιν, ὥς εἶναι τὸν λόγον τοιοῦτον ὅτι αὐτὸ ἀμάρτημα συμπέση τοῖς λεπῶς οὕτω διαιτωμένοις σφαλερώτερον τοῦτο καθίσταται παρόσον ἢ τε δυνάμεις ἄρ' ῥ' ὥτος ὑπὸ τῆς τοιαύτης διαίτης, γέγονεν ἢ τε ἐπ' αὐτὴν μεταβάσις αἰνότης. μαρτυρεῖ δὲ τῇ προειρημένῃ γραφῇ καὶ τὰ περὶ τῶν ὑγιαίνοντων ἔρημένα σφαλερὰς γὰρ ἐπ' αὐτῶν ἢ φη τὰς λεπὰς διαίτας ὑπάρχοντες ὅτι τὰ ἀμαρτανόμενα χαλεπώτερον φέρουσιν οὐκ ἔστι διὰ τὸ λεπὸν τῆς διαίτης ἀρμαρτάνει ἀναγκάζονται. Ὡς.

Hoc est melior prior scriptura complectitur enim, & hanc, & generaliore facit sermonem, de omni peccato docens voluntarie, aut in uoluntarie contingente ægrotantibus, ut talis sit sermo. Quod si peccatum accidat sic tenuiter dietatis periculosius illud est, quantum virtus imbecillis à tali dieta fuerit, & quantum transitus ad ipsam insuetus fuerit. Confirmant dietam scripturam quæ de sanis dicta sunt, quibus periculosas tennes dietas existere dicit, quoniam peccata difficilins fuerunt. Non quod propter tenuitatem dietæ peccare cogantur. Sentis ne ex ultimis Gal. verbis non agere Hypp. de ijs

DE VICTU FEBRICIT.

quæ à tenui victu accidunt peccatis, sed de quibus-
 cun que voluntarie aut inuoluntarie contingentibus,
 quæ magis lædere asserit eos qui tenui victu usi fue-
 rint, quàm qui crassiori. Cunque non raro accadat
 ægrotantes ex intempestiuis lædi euacuationibus, id
 esse agendum, & ad id accedendum, unde damna,
 & errores minus discriminis afferant. Id fiet si cras-
 siori utemur victu. Cum autem non solum in euacua-
 tionibus, sed in alijs non paucis quotidie ægrotan-
 tes delinquant, aut sua sponte, aut assistentium cau-
 sa, & non raro ab ipsis medicis, accedet iam dictis
 non parui momenti ratio ostendens crassi victus non
 spernendam ægrotantibus commoditatem, nempe mi-
 nus lædi ab erroribus. Quandoquidem peccata eua-
 cuationis si cum tenui victu coniungantur, methodo,
 quidem sed irrationali ægrotantem in mortem defe-
 runt. Nam ut in prouerbio apud Hispanos est, ca-
 put cito tondent plures manus. Fateri igitur cogeris
 methodice cum in euacuatione erratum sit, minus
 mali ægrotantes patiet si crassiori, quam si tenui ma-
 gis victu usi fuerint. Quod si pro votis euacuatio
 succedat, non est, quod tenui utaris. Nam si
 à naturalibus ad eas, quæ ab arte fiunt euacuatio-
 nibus validum est argumentum, ut tradidit Hyp-
 pocra. manifestum erit si quanto maior fuerit ex-
 purgatio, tanto magis ad iudicationem usque dare
 oportet, ut ille scripsit, idem obseruandum fore in ea
 quam medicus feliciter molitur euacuatione. Qua-
 re committendum non est, ut ea fiducia tenui uta-
 ris

1. Aphor.

1. de ratio
 ne uictus.

ris victu, ut id imbecillitatis quod ex eius usu natura incurrit noxij humoris euacuatione rependas. Sed his ommissis mentem ad eos qui insuetum nauigant æquor conuerte cum eorum turbantur corpora, quorum qui cibo et potui non parcunt minus cõturbari certum est. nam facilius & minori cum molestia euomunt, vnde citius ab effectu liberantur. Qui vero magis abstinent. contrarium eis euenire diligentiores nautæ affirmant, Age experiamur alias causas, pone duos omnia quibus sint paria ad solis æstum nimis incalescentem, alter tenui victu, alter crassiori vsus sit ab ante hesterna die, vter eorum magis afficietur putas, ego quidem periculũ huius rei iam in me ipso faciens sensi minus me solis calore cum crassiori vsus fueram cibo, quàm tenui affectũ fuisse. Idem ijs accidit qui alta niue iter peragunt. Quare si quis hæc alta mente reuoluat, aperte colliget, verum id esse in cuiuscunque causæ impressione minus fore obnoxium qui crassiori victu vsus fuerit, multo autem magis qui tenui. Quare cum ita res habeat magnum afferet ægrotantibus crassus victus commodũ. Nam cum in morborum consideratione duplex sit medico scopus, alter ad id quod factum est, alter vero ad id quod futurũ, id curat medicus quod iam est, id præcauet quod nondum est, hoc que est, quod alijs verbis medici dicunt, cum morbus & causa simul coincidunt, curationẽ mixtam esse, ex ea artis parte quę curat, & ex ea quę præcauet, prophylacticæ græce dicitur. Cum ergo præcipua intentio medici deficiente eo quod vrget, ad id sit quod futurum est, danda est opera ut eo

B ij disponamus

DE VICTU FEBRICIT.

disponamus modo ægrotantē ut minus eius quod futu-
rum est recipiat. Ostendi autem supra crassum uictum
corpus sic disponere ut minus quarum uis causarum im-
pressionem percipiat. Quare ægrotantibus omnibus mi-
nistrandum esse, ut ab eo quod futurum est minus affi-
ciantur. quod si febricitantem consideres qui tenui ui-
ctu usus fuerit, calorem acriorem ad intima corporis
penetrantem morbiq̃ labores molestius ferentem, cō-
tra qui crassiori, minus à febrili calore molestari, faci-
lius autem symptomata & labores ferre, magis uero
morbi & eius causæ impressioni obsistere, ualidius bo-
nos chimos ne putredinem concipiant manutenerē. Cu-
ius signum est causarū non naturalium actiones minus
eos qui crasso usi fuerint uictu præmere. Quod si rusti-
cos operarios nautas & id bonum genus in mentem re-
uoces, cum ab acutis corripuntur morbis, non ptisana,
non aqua mulsa, non oximelite euadere, sed ualenti ci-
bo & potu, sola ea differentia quod subtiliori modo pa-
rant, ob coctionis facilitatē, id ita esse scies, cum ob id
periclitari magis rusticos quàm ciues non uideamus,
qui tenui uictu utuntur, quin immo rusticos facilius &
citius à morbis liberari. Vt Venetijs rusticæ duplici la-
boranti tertiana contigit. Cunque accedens medicus
aquam hordei & iusculum pulli frigidis herbis tempe-
raturum consuleret, illa annuente abiit. Sequenti die ac-
cedēs & cū nihil eorū quæ iusserat factum accepisset,
ægre ferens discessit, nihil boni rusticæ futurū sperans,
quam duobus post diebus in domo amici offendit glo-
riantem se suo consilio & non medici seruata. Sed
heus

Somni

heus tu methodice cum uirtus ægrotantis nimis imbecillis est, non ne eam cibo & potu roborare conaris uel ipso morbi uigore ut Gal. tradit. An non putas melius Aphorismorū I. crassiori uictu corpus antea nutrisse, ut hora maxime cōmotionis absq; cibo permanere potuisset, ob id quia natura ad insignem deueniente imbecillitatē non facile cibo noxa corrigitur. Nisi enim ipsa natura circa cibum elaborauerit cibus per se non digeretur, nec uires nature ministrabit, nam oportet ut ab ipsa natura principium sui adiumenti habeatur, quæ cum ualde imbecillis est tātillum non ualet cibum coquere nec digerere. Quare consultius ageretur crassiori ante corpus uictu nutrire ut minus in huiusmodi imbecillitates incidat natura. Diētæ sunt nonnullæ rationes ob quas in morbis crasso uti debeamus uictu qui uires laborantis augeat, nullamque legitimam methodicis rationē ostendet quod tenui qui uires ægrotantis minuat uti Aphorismorū I. oporteat. Methodicus forsan pro ratione Galenum adducit ita dicentem, nam si crasso uteremur cibo, adderemus in morbum, cuius uerba sic habent, nam si eas tales quales acceperimus properemus in istis seruare uel etiam augere, semper adderemus in morbum. Vnde aperte ostendit non solum uictu crasse sed & symetro si utamur augere nos semper in morbum. Hæc quidem Verba methodicus pro se citans putat obtinuisse. Et si hoc tibi præstem, ut in hac re Galenum ut iudicem admittam, possem tamen methodice arte tuū in præsentī deuiare tellum. Nam male citasti Gal. in eo uerbo semper, illud ad sequentem dictionem adderemus referēs.

B iij Et

DE VICTU FEBRICIT.

Et talem facis sensum quod si in acutis vires seruare properemus, uel etiam augere, semper adderemus in morbum. Cum aliter habeant græca exemplaria nempe *εἰ γὰρ ἦτοι φυλάτταν αὐτὸν ὅταν παρελάβομεν ἐν τοῦτοις ἢ προσαύξην ἢ σπινύδοιμεν αὐξήσομεν τὸν νόσον*, hoc est si enim seruare ipsam, scilicet uirtutē qualem acceperimus in ijs scilicet acutis uel augere semper properaremus, addemus in morbum. Vnde non damnat Gal. in acutis simpliciter uirium additionē, sed illud maxime ne semper properemus addere eas cibo, innuens in statu & apud ipsum si cibo vires addere coneris errorem esse. Sed age methodice hæc demittens uolo tecum in hoc duello ea uti animi liberalitate qua cū Aiace usum fuisse Hectora refert Homerus. Crasso uictu qui vires augeat ideo utendum non esse ais, ne addamus in morbum, unde quæso hæc fiet additio, aut quia cibus in morbi materiam conuertitur, aut quia eo temporis interuallo quo natura cibo preparando uacat à morbi cōtione cessans causa est ut diutius duret effectus, aut quia affectum maiorem reddimus, aut quia in priorē causam addimus, ab omnibus hisce modis morbū sumere posse incrementum certum est. Age nunc an in ratione cibi crassi qui vires augeat aliqua dictarum insit occasionē consideremus. Cibus porrò in morbi materiam conuerti duplici de causa contingere aut quia similem in qualitate aut substantia aut quia à natura non commode apparatus, unde corruptioni disponitur, non apparatus aut ob multitudinem immodicam aut crassitiem. Proinde fieri potest ut egrotantibus cibum offeramus

feramus qui vires augeat, qui nec qualitate nec substantia humori peccanti similetur, sed & eius modicam exhibere possumus quantitatem qui quàm minime difficilis sit coctionis sed admodum lenis. Verum ob dictam causam conuincitur petrona carnes assas acute egrotantibus ministrans, quæ cum difficilis sint coctionis & haud commode à natura præparentur causa est ut diutius immorantes in laborantium uentriculis corrumpantur, unde in morbi materiam tandem conuertuntur. Quod ad morbi durationem spectat, necessarium non esse ut quicumque cibus vires egrotantis augens multum exposcat ad eius coctionem tempus. Nam alica inter crassa ab ipso Gal. connumerantur cibaria, tamen breui admodum coquitur. Simile habent oua sorbilia, & uinum quod citissime quidem coquitur & multum vires inuat, præcipuè naturales & vitales. Affectum intensiorem efficitur ut si iocinere aut liene obstructione laborantibus dulcia cibaria ministremus, & quæ facile particulis hæreant. Et si liquefacientibus febribus aquam mulsam exhibeamus. Quod nec hoc crassum cibum qui vires augeat committetur necessario, manifestum est. An postrema participat occasione tentemus. Priorem dico causam pororum obstructionem aqua putredo ortum habet, hanc à multitudine humorum intra uenas aut ab eorum crassitie aut lentore aut à duobus aut simul ab omnibus prouenire Gal. autor est. Cum autem obstructiones sunt aut suspitio est ne fiant, cauendum esse eum cibum qui pectoriam efficiat exhibere. Victus autem

r. Aphorif
simorum.

In libris
de metho
do medendi.

B iiij qui

DE VICTV FEBRICIT.

qui vires auget omnino hoc nō caret crimine, nā vires augere non posset nisi maior eius pars in sanguinē conuertatur. Ob solam igitur pororum obstructionē crassus uictus suspectus esse uidetur. Sed cum in omnibus acutis morbis non adsint obstructiones nec dispositio à qua iusta earum detur suspitio. Non esse ob id quod singulare est, uniuersale efferas perceptū, nempe omnibus in acutis tenui esse utendum uictu. Sed age methodice cum febris acuta cum obstructione adest, quo uteris remedio ut hominem in sanitatem uindices. profectò si Gal. in libris de methodo medendi & in libro de plenitudine consentis, & toti rationalium medicorum scholæ, sanguinis missione, nisi quæ prohibeant adsint, dices. Nam febrem tolerare non posses nisi prius obstructionibus liberandis intendas, quorum causa euacuatio nem molimur & si plethoria non adsit, sola melioris transpirationis gratia, ut ab eodem discimus. Nā stante eadem pororum raritate post humorum imminutionem liberi ores fieri inspirationes & expirationes contingit. Tu igitur methodice sanguinem mittis hac sola de causa ut liberiores fiant transpirationes, ego hac ipsa quam tu, & ut post euacuationem crasso cibo qui vires augeat uti secure & citra lesionē possim. Sentis ne pluribus in morbis acutis crasso uictu illico citra aliquam preparationem utendum esse, in ijs uero quibus obstructiones coniunguntur quæ morbi materiam fouent aut suspitio est ne fiant corpus fore preparandum ante crassi uictus exhibitionem. Nec hanc preparationem solus huius gratia melior. Nam & tu & rationales

racionales quicumque illam tanquam remedium ad sanationem non uulgare amplectimini. Solum unum est quod inter nos separat quod uos id agitis ut morbum oppugnetis ego uero ob id ipsum, & ut laborantem naturam citra lesionem roborare possim. An non tibi methodice subiit in mentem simile esse illud Hyppocratis cum de corporibus athletarum sermonem faceret, quem Oribasius de omni crasso & obeso intelligendum monet, horum igitur, inquit causa bona habitudinem soluere confert, non tarde ut rursus principium nutritionis accipiat corpus. Nullam igitur ualidam perpetuam assignabis rationem quod tenui uictu qui agrotantis uires minuat et imbecilliores reddat in acutis uti debeas. Nonne Hyp. praeceptum est cum aliquod signum prorritatorium aut euacuatorium affuerit uel in hypochondrio, crassiori uictu utendum esse. Ubi Gal. communi prorritationis nomine comprehendisse omnia Hyp. quae quo uis modo uirtutem ad imbecillitatem agunt scribit, ut morsus quem acris humor in intestinis aut uentriculo parit, praeterea uigilia, ira, mœror, lumbrici, elmynthes, qui ab intestinis ad uentrem usque ascendunt, & pruritus cutis et partis alicuius qui nocte oboriatur, & plurima alia quae sub euacuatorio comprehenduntur signo, & sub hypochondrio. Cum ergo omnibus his ob id quod uirtutem infirmiore reddere nata sunt, crassiori uictu obviare praeceptum uobis est, id diligenter praecauentibus ne corporis laborantis natura multum imbecillis fiat, consulto tenui uictu uti, quo agrotantium corpora ad insignem ducuntur imbecillitatem praeter rationem esse uidetur.

2. de ratione uictus

DE VICTV FEBRICIT.

8. de me-
thodo.

In 3. de ra-
tione ui-
tus.

uidetur. Quinimmo nisi mihi certo ostendas cōmodum
quod à tenui uictu acute agrotantibus euenit, maius
esse uirium incommodo, insanam esse temeritatē indi-
co, eo uti cuius damnum manifestum est, adiumentum
uero rationi haud peruiū est. Quod si methodicus ad
hac. Nihil igitur obstabit quo minus in acutis uinum
concedamus quod uires insigniter roborat & breui co-
elionem recipit, nec in morbi materiam aptum esse ut
conuertatur, nec affectum augebit si tenue fuerit &
aquosum, sed nec hoc obstructionibus læsioni erit, nam
omnes promouere euacuationes asserit Gal. in libris de
methodo medendi. Vere quidem si agrotans assuetus
sit, non esse quod interdicator uinum tenue & aquo-
sum. Nam quam æstimas esse dispositionem methodice
cui maxime aduersum sit uinum, forsā febris acutæ
cum ingenti capitis dolore & mentis læsione, hac con-
stitutione uinum omnino prohibendum esse credideris.
In ea ipsa tamen dispositione ante dictum uinum si ue-
strum concessisse Hip. audias, an ne mutabis sententiā
& rectius posthac agrotantibus consules, & saluber-
rimum esse iudicabis, naturæ uires medo quo possis au-
gere precipue ubi citra effatu dignum incommodum
id efficere possis. Hip. igitur ita scribit cum uero in hu-
iusmodi morbis fortem capitis grauitatem uel mentis
læsionem suspicatus fueris, à uino penitus est abstinē-
dum, aquamque tunc dare oportet uel uinum aquosum
flauūque & prorsus inodorum, atque ab ipsius po-
tione aquæ exiguum super bibendum. Nam hoc modo
uini potentia caput, mentēque minus tentabit. Vali-
dum

dum ex dictis Hyp. summi potest argumentum, in omni morbi constitutione assueto egrotanti aquosum uinum à rationali medico concedi posse, ut in pleuritide affectu quamuis maxime crudo existente, ut habetur ab eodem ubi ita scribit. Et si morbus siccior, quam ut quispiam existimet fuerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitionem uel mulsam uel uinum utrum magis auxiliaturum putaueris propinare conuenit. An non percipis ante dictæ constitutioni uinum & si tenue & aquosum noxa non uacare, cuius causa Hyp. exiguum aquæ super bibendum præcipit. Commodum tamē quod ab eo in corroboranda natura sequitur, maius esse suspicandum ideo esse, quia alioquin non concessisset. Hyp. stantibus forti capitis gravitate & mentis læsione. Hucusque illius rationes qui crasso semper uictu hoc est qui uires laborantis augeat in quibuscunq; morbis utendum esse opinatur. Qui uere in acutis, tenuem qui uires minuat ministrandum fore contendunt sic breuiter ratiocinantur.

In i. de ratione uictus.

CAP. II.

AT qui paroxismo sæuiente inquieto febricitanti præ igneo calore æstuanti pedes & brachia huc & illuc iactanti sitim linquæque ariditatem ægre ferenti, cibum offeremus, an paroxismi inclinationem expectabimus. Nullus profectò qui mentis sit compos egrotanti paroxismo ita sæuiente cibum ministrabit. Proinde cum plures sint morbi quos recentiores perperacutos uocant, qui ab initio ad morbi manifestam inclinationē similes labores prædictis & plures & uehementiores

DE VICTV FEBRICIT.

2. lib. de ra-
tione ui-
ctus in il-
lo ciborū
autē adie-
ctioni.

tiores afferunt, nec intermissione habent, cibum ne ijs
qui vires augere valeat an qui minuat ministrabimus.
Ego quidem tantum abest ut crasso uictu qui vires au-
geat sic laborantem nutriā, ut omnimoda inedia ho-
minem ad morbi inclinationem seruare opus esse credi-
derim. Qua in sententia Hip. & Gal. esse certum est.
Nec præter rationem nam si illud uerum est quantum-
cunque quis sæuiente paroxismo ediderit nocumento
esse, unde monstrante experientia asseruit Hip. appo-
nere læsionem esse, quod cum in periodica febre in qua
errores minus periculi afferunt hoc facere ob timorem
læsionis ueremur, causatius profectō in peracutis ci-
bum non esse offerendum in quibus certum est citra
magnam læsionem ministrari non posse. Nam si in uen-
trē absorptus fuerit cibus quod redundat superfluitq;
si alias multo magis in acutis tolerare est difficile ut scri-
psit Gal. Præterea cū inflāmatio in aliqua parte exci-
tatur ab humoris effluxu siue phlegmone aut erisipe-
las sit, nō aduertisti nullum cibum quantumcunque le-
uissimū fluxione durante laborantes citra læsionē pos-
se sumere, quando quidem à cibo dolores & fluxus
insigniter crescunt. Cunque hæc ita se habeant nun-
quam inducar ut rationibus mihi persuadeas cū agro-
tans uel ab ipsa morbi uehementia uel ab aliquo dolo-
re minis molestatur crassum cibum offerre ex usu esse.
Quinimmo cum Hyp. sentio in primo de uictu acuto-
rum ubi ita scribit postea si dolor uel periculum ali-
quod comparuerit sorbitionem dare oportet neq; mul-
tam neq; crassam sed post septimum uel nonum si ua-
lidus

lidus sit. Ubi igitur morbus statim ab initio maxima affert symptomata omnimoda inedia egrum seruare ad morbi inclinationem, si virtus sufficiat, rectius esse iudicat, quàm cibum offerre qui citra insignem lesionē tali morbi constitutione exhiberi nō potest. In qua sententia Hyp. esse cū ita scribit, ciborum autem adiectio ni intendendum multo minus subtrahere vero saepenumero expedit cum eger sufficere possit donec morbus mature scat. In reliquis ab hac vehementia degenerantibus morbis tenuem aut tenuissimū concedendum esse victum, tutius quē esse in ijs ad magis tenuem a iusto aberrando accedere, quam ad crassiorem. Quod ualida ratione ostenditur. Pone morbo acuto laborare Socratem est ne aliquis cibus qui morbo & naturæ Socratis & ceteris exacte conueniat, dicatur ille mediū, omnia cibaria quæ illo tenuiora sunt haud quam conuenient propter virium diminutionem quæ cunque illo crassiora incommoda sunt propter morbi additionem. Sed cum acuti morbi ut plurimum iuuenibus aut cōsistentibus accidunt quorum vires maxime tunc vigent, manifestū est quod in ijs magis urget morbus quàm virtutis imbecillitas. Addere modo in id quod urget periculosius cum sit quàm in id quod non urget aut minus urget, manifestum est in acutis deterius esse & magis periculosum crassiorem cibum ut pote qui in morbum urgentem addit, quàm magis tenuē qui virtutē cuius imbecillitas non urget exoluat.

In 2. de ratione uictus.

DE

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. III.

QV I D de ijs sententiam in præfenti breuiter ostendam, id quod maxime in artis operibus post longam considerationem magis probauerim. Eam enim esse artis utilitatem, inuenire ea quæ ægris conducibilia sunt. Nunc mihi præbete aures de ratione uictus uobis aliqua dicturo, quæ animos uestros componant. qua quidem in re unum insequor Hypp. cuius scripta ultra humanam eruditionem quid præstant, huic acceptum fero quæ de uictus ratione uobis dixerò. Sed prius dubitationem soluere expediet. Craßum uictum, tenuem tenuissimum, primus Hyp. dixit in Apho. Quid tamen per hæc nomina intelligat ex libris de ratione uictus illici potest, apertius tamẽ in libro de Prisca medicina, ubi ita scribit. Qui uero medicinam excogitauerunt inuenerunt ue, sententiam opinionem ue habuerunt quam illi de quibus prius dixeramus, primum quidem arbitror ex eorundem ciborum copia quid subtraxerunt & pro multis pauca fecerunt & dederunt. Cunque hoc illis satis non uideretur nõ enim languentibus hæc æquo modo proderant, sed erant nonnulli qui sic haberent uti ne exiguos quidem cibos superare possent, hos itaque putarunt imbecillioris cuiusdam rei egere. Propterea sorbitiones inuenerunt paulum quid firmioris & robustæ materiæ multa aqua commiscentes, quod inerat ualidum mixtione & coctura subtrahabant minuebantque, quicunque uero nec sorbitiones poterant superare eos ad pocula deducebant, hæcque usu & copia obseruando quod modice

dice, ac æquo quodammodo haberet, nec plusquam oporteret, nec minus, nec meratius, nec dilutius, nec serius, propinabant. Hoc autem probe scire oportet, quibus sorbitiones in morbis non conferunt, & considerare nā cum fecerint febres irritantur, & crescunt dolores, clarumque fit quod propinatur, & infertur, morbo quidem nutrimentum & incrementum esse, corpori vero tabem malum & exitium. Quibus autem sic habentibus siccus cibus panis placenta plus mazaue, & si pusillum datur, decuplo magis malum crescit quā si sorbitio, nullam aliam ob causam nisi cibi vehementia quæ ad malum quo quis afficitur non facit. Nam cui sorbere confert comedere vero minime, hic si plusculum assumat magis afficitur, cuius languoris causa huc referatur. Nā quæ ualidæ materiæ sunt maxime & apertissime sanum ledunt, nedum languentē. Hucusq; Hyp. aut thesalus eius filius. In quibus verbis triplicem designavit victum, nempe quæ comeduntur sorbentur, & bibuntur, nempe crassum tenuem & tenuissimum. In apho. quartū addidit nempe ultimo tenuissimum quem recte Gal. omnimodam cibi & potus abstinentiam interpretatus est. Ut ipse aperte secundo de victu auctorum ostendit. Ita ut totus victus quadriariam diuidatur nempe in ea quæ comeduntur, sorbentur, & bibuntur, & in omnimodam cibi & potus abstinentiam. Verum si ea quæ sorbentur bifariam partiaris nempe in crassam & tenuē sorbitionem; habebis differentias in quas omnes. Hyp. victū partitus est. Verum quatuor ex ijs sunt quæ acute agrotantib. con-

ue-

DE VICTV FEBRICIT.

ueniunt nempe crassa sorbitio, tenuis, pocula, et omni-
moda abſtinentia, quorum meminit Hip. in libris de ra-
tione uictus in acutis. Crassa sorbitionis in primo,
cum de eo uictu agit quem hordei substantia prestat
duplicem ab eo sorbitionem parans, nempe crassam et
tenuem, illam abſolute ptisanam aut tota uocat ptisa-
nam aut hordeaceam, & est quæ post integram hordei
coctionem non collatur, hanc cremorem siue succum ptisanæ
nuncupat, & est succus qui post collaturam remanet.
Vt scriptum est à Gal. primo de ratione uictus in expo-
sitione illius talia autem parte plurima profunt ijs &c.
Ea ergo quæ comeduntur crassum, sorbitiones crasse
ut tota ptisana tenuem, tenuis sorbitio ut ptisanæ cre-
mor exacte tenuem, potus ut melicratum tenuissimum,
omnimoda abſtinentia ultimo tenuissimum uictum con-
stituunt. His omnibus cōsentire Gal. scito in eo apho.
tenuis & certe diætæ ab eo loco nunc sufficit tantum
dicere ad finem. Quo in loco Nicolai uersio ita habet
nunc uero tantum dixisse sufficiat quod in omnibus
morbis quibus maximus vigor & iudicatio primis qua-
tuor diebus futura sit modo natura sit fortior, inte-
gram inedia seruare debemus. In quibus uero non ul-
tra primam septimanam protrahuntur forti exi-
stente natura solo utendum est melicrato, solus au-
tem & hic ipse uictus tenuissimus esset non tamen
in extremo & cætera. Græcus tamen cotextus,
duo uerba addit hoc modo ὡς δὲ ἀρχὴ τὸ γε τοσούτον ἀ-
πὸν ὡς ἐφ' ὧν μὲν αὖ τοσημὰ τῶν ἁκμῶν καὶ ἡ κρίσις ἐν τῇ πρώτῃ μελ-
δα γίνεται τετραδὶ τῆς δυνάμεως ἰσχυρᾶς ὑπαρχούσης ἐπὶ ἀ-
σιτῇ

οἷας παντελοῦς τοῦτους φυλάξομεν ὁ περὶ τὴν ἰσχάτως λεπιοτατης
 διαίτης &c. hoc est nunc uero tantum sufficiat dixisse,
 nempe in quibus morbis uigor & crisis in primis quat-
 tuor diebus futura sit, uirtute forti existente, in absti-
 nentia omnimoda hos seruabimus. Quod quidem est ul-
 timū tenuissimi uictus. In quibus uero nō ultra primā
 septimanam, forti existente uirtute sufficiat melicra-
 to solo uti. Tenuissimus sit hic solus uictus, non ta-
 men in ultimo. Ex quibus uerbis & ex ijs, quæ ad fi-
 nem Apho. scribit, aperte ostendit per crassum, te-
 nuem, exacte tenue m, tenuissimum, & ultimo tenuissi-
 mum uictum, intellexisse id, quod supra diximus. Ho-
 rum quinque uictuum generum meminit Hip. in libris
 de ratione uictus in acutis.

CAP. II II.

GAL. hyppocratica diuisione non contentus, quæ
 ciborum diuersas formas respicit. Eorundem penes ui-
 rium dispositionem uariam, quam cibaria diuersa indu-
 cunt, aliam denuo diuisionem super addidit. Omnem ci-
 bum in crassum, symetrum, & tenuem diuidens. Vires
 augere ualens alimentum, crassum dicens. Seruare, sy-
 metrum. Tenuem, minuere. Quæ qualiter sunt intelli-
 genda uerba, dicere opus est. Nam si crassi, symetri, &
 tenuis notiones quas assignauit Gal. respectu uirium sa-
 nitatis tempore intelligas, nullus utique symeter uictus
 ægrotantibus daretur, nam satis manifestum est nulli
 contingere ægrotanti quantumcūque crassis utatur ci-
 barijs æque robustum in ægritudine seruari ac fuerat
 ante morbi inuasionem. Quod si ad tempus ægritudi-

A phorif-
 fimorū i.

C nis

DE VICTV FEBRICIT.

nis referas tenuis non datur, non præter omnimodam
abſtinentiã & aquam frigidam, quem nam assignabis
uictum qui ex ſui ratione vires ægrotantis imminuat.
Ego quidem nullum eſſe uictum quantumcũq; tenuem
qui vires, acuto morbo ægrotantis, nõ augeat exiſtimo.
Nam ſi ptisanam dicas, audias Gal. in primo de uictu
acutorum in expoſitione illius at ſi os mafeſcat ubi ita
de ptisana ſentit. Ergo qui probe expurgantur inquit,
his ptisanam dare oportet, non ut uirtutem modo robo
ret, uerũ quoq; et his, quæ per tuſſes ex pulmone ſunt,
humidorum expulſionibus opem ferat. In quo quidem
contextu ſic habet Ioannis Vaſſei uerſio. Sed apertius
græcus contextus id quod propoſuimus oſtendit, nam
propoſitionem affirmatiuam facit, in hunc modum. Da
re igitur oportet probe expurgatis ptisanam, cauſa ro
borandi uirtutem &c. Audiſti ptisanam uirtutem ro
borare poſſe. Idem de mulſa ab eodem intelliges tertio
de ratione uictus in expoſitione illius uini autẽ & mel
lis &c. Ubi copioſiorẽ ex mulſa nutritionẽ aſſerit, quã
ex uino. Idẽ apertius oſtendit in expoſitione illius dam
nata aut propterea &c. Non ob id ergo tenuem dixiſ
ſe uictum putandum eſt quod ægrotantis vires minuat.
Crassi igitur uictus, ſymetri, et tenuis rationes, ſanis re
ferendas eſſe, ut crasſum eum uictũ dicas, qui ſani cor
poris vires augere poſſit. Symetrum qui euſdem vires
ſeruare. Tenuẽ eum qui ſani corporis vires haud qua
quam ſeruare ualeat. Hunc acute ægrotantibus conue
nire ſcribit. In chronicis uero morbis vires eſſe ſeruan
das ſymetro uictu, hoc eſt talem eſſe uictum offerendũ
qui

qui laborantis cum sanus erat vires seruare posset. Tenem igitur qui sano Socrati vires seruare non poterat acuta febre egrotanti & iam imbecilliori effecto si ministres easdem augebit. Nam non aliter quam si in ingenti pira ut ignem eadem serues magnitudine, certa lignorum multitudine opus est. Quod si eundem augere, maiori. Finge nunc ignem aut ob aquæ effusionem, aut ob quodcunque sit imminutum, minori profecto lignorum congerie seruabis, & augebis. Consimiliter hominum corpora, cum prospera fruuntur ualitudine crasso cibo & multo indigent ut uirium robur seruetur, aut augeatur. Cum ob morbos uirtus corporis imbecillius est affecta subtiliori cibo & eius minori copia et seruari & augeri possunt. Quare mirum non est si à mellicrato, uino, oximelite, & similibus vires acute egrotantium augeantur. Cuius euidentis præstant argumentum uiatores & operarij. Cum integra die à cibo & potu abstinere, hos uespere uix corporis onus sustinere posse. His tunc temporis mellis & aquæ parum si porrigas, alacriores eos ad opus reddes. Hoc ita esse, ostendit Ionatham Saulis hæbreorum regis filius, qui vires resumpsit, id mellis gustans quod extremæ uirgæ inhaesit. Non est igitur quod acuto morbo laborantis vires, mellicrato augeri non posse credamus. Cum ergo in artis operibus id uerum esse probemus, nempe cibum & si tenuissimum acute egrotantis vires augere posse; nullus utiq; tenuis dabitur cibus, sed omnis crassus erit si crassi & tenuis rationes ad ægritudinis tempus & non sanitatis referas. Sed non ab re fuerit uerba Gal. in

C ij præsent

DE VICTV FEBRICIT.

presenti græce adducere quandoquidem de ijs conten-
tio est ut sciatis quantum dictis conueniant. λεπήδ' δ' ε-
ὀλύγονε δευμάτων ἢ δι' ὀλιγοτρόφαν ὄιον περ καὶ ὁ τῆς πλίσανης ἐστὶ χύ-
λος ὅρος δὲ αὐτῆς ἢ τῆς δυνάμεως ἐστὶ καθαίρεισις ἥς πρὲρ ἔνεκα καὶ
τρέφομεν ὑδὶ μὲν οὖν τῶν ὑγαίνοντων αἰ χρὴ τὴν ρώμην τῆς δυ-
νάμεως φυλλάτταν ἢ παράξιν ταῖς τροφαῖς ἢ καθαιρέν καὶ εἴη ἀνῆ
ἢ μὲν παράξουσα τροφή ἀδρά ἢ δὲ φυλλαττούσα σύμετρος ἢ δὲ
καταρούσα λεπή, hoc est tenuis victus per pauca edu-
lia uel per ea quæ parum nutriunt, quale est ptisanæ
succus, terminus ipsis, uirtutis est imminutio. Cuius
causa nutrimus. In sanis igitur semper oportet robur
uirtutis seruare, uel augere alimentis, non minuere, &
statim clausula non finita ita ait ijs, quæ de sanis dixe-
rat, sequentia annectens. Et sit quidem augens alimen-
tum crassum, seruans uero symetrum, imminuens te-
nue, hoc inquit fugere oportet semper, subintellige in
chronicis, aliorum ultro magis indigeant presentia ipso
uti. In ægrotantibus raro contingit uirtutem fortio-
rem quàm acceperimus operari. Dixit raro ethicos &
marasmo confectos excipiens, quorum uirtutem labo-
ramus singulis diebus robustiorem efficere alimentorū
successiuo incremento. Damus operam ut in pluribus
seruare in chronicis, mensuratè quidem imminutam
conseruare in acutis, si enim seruare ipsam qualem ac-
ceperimus in iis, uel augere semper properaremus, ad-
demus in morbum. Ex quibus uerbis colligitur in chro-
nicis dandam esse operam ut cibo & potu id uirium,
quod à morbo absumentur quo ad fieri possit repona-
mus. In acutis uero id non dari. Satisque esse si partem
detrimenti uirium, tenuis victus ope resarciamus. Ma-
iorem

io^{ri}orem & modo minorem prout nobis uirtutem posse
sufficere uisum fuerit. Et hoc est quod dixit mensura-
te quidem imminutam conseruare in acutis. Ea ergo
quæ comeduntur crassum uictum constituunt, ob id
quod eo uictu sanorum corpora seruatur & augentur;
sorbitiones uero tenuem, nam uires sanorum ab ijs ser-
uari nō posse si eis solummodo utantur. Pocula tenuis-
simum, maximum siquidem uirium detrimentum pa-
tientur sana corpora, aliquot diebus ab iis solummodo
alimoniam suscipientia.

CAP. V.

ALITER tenuis uictus ratio intelligatur, pro-
ut Gal. exposuit in eo loco damnata autem propter-
ea &c. Ubi imbecillitare & nullo pacto nutrire & pa-
rum nutrire non idem esse ait. Diminuunt inquit vi-
res, sanguinis eruptio, deiectio superflua, sudor in-
modicus, & per accidens sibi abstinentia, hæc uere
imbecillitare dicuntur. At quæ nullo pacto nutriunt
ut aqua eā imbecillitare nec roborare uires quispiam
uere dixerit, nisi id per accidens contingat. Ter-
tio sunt loco quæ exigue nutriunt, et potuisset quidem
si quis solis ipsis usus fuerit, mori, non equidem quia ui-
res diminuunt, sed quia non sufficienter roborant. Ex
his est mulsa, nā si quis diebus quattuor cibo priuatus
interire possit, is mulse usu, non quintam modo diem,
uerum quoque & sextam attinget. Ex iis elicitur uer-
bis quod cum in apho. dixit de tenui loquens uictu,

§. de ratio-
ne uictus.

C. iij. A. A. A.

DE VICTV FEBRICIT.

ἀλλὰ καὶ ἀπορροῖα, hoc est imminuens tenuis, nō quia uere uires imminuat dixit, sed quia non sufficiēter roborat. Danda est ergo opera ut agrotātis uires cibo tantisper augeamus, quatenus id citra manifestam lēSIONEM fieri possit. Longa didici consideratione quod postea à Dionysio medico patre meo, uiro apud Lusitanos clarissimo accepi, agrotantibus quibuscunq; saluberrimum esse, medicum id agere ut uirtutē citra morbi aut eius durationis additionem, roboret. Qua de causa inuentę sunt ab antiquis sorbitiones et pocula acutis morbis uictus idonei, qui sanē agrotantis uires citra noxam augeant, & facillē ab imbecilli superentur natura. Quorum uno aut altero prout morbi constitutio est utuntur.

C A P. VI.

HIS ita determinatis methodum de recto febricitantibus ministrando uictu, incipiam breuiori & facilius quam possim uia. Quinq; habet uictus debita administratio considerationes, nempe uictus formę, quę gręci διαίτης σχήμα uocant, deinde quantitatis, qualitatis, numeri, & horę, horum singula inuestiganda fore à medico qui uictum agrotantibus conuenientem ministraturus sit. Uictus forma à uirtutis robore & status distantia sumitur, ut scribitur libro Apho. Ut si longē fuerit morbi status symetro utemur uictu, quod si propē tenui, tenuissimo uero, si propriissime, quod si iam affuerit, ultimō tenuissimo. Ad hęc uirtus corporis consideranda est, an talem uictus speciē ferat, quam status distantia pręscripserit. Verum in hoc negotio primum quęrere oportet, an recte à distantia
status

status & à uirtutis robore, uictus formam inquirere oporteat. An potius cum uirtute, morbi dispositionem considerandam esse, ut recte uictum agrotantibus diffinire possimus. Rationales medici qui Hip. insequuntur à uirtutis robore & à distantia status uictus formam inuestigandam ideo esse opinantur, quod sola corporis uirtus sit, quæ cibum pro sui custodia indiget. Nam ut uitale robur seruemus, iò cibum agrotantibus exhibemus. Ut scripsit Gal. in expositione illius postea si dolor &c. Virtus igitur pro sui custodia cum cibum indicat quo maxime seruari possit. Morbus autem talem diffinit, ut eo ad uigorem, solam sufficere possit agrotans. Nam apud hunc, morborum iudicia ad salutem aut ad mortem fiunt. Eo usque igitur uirtutem seruare cibo oportet. Crassiores uero exhibere quo ultra durare queat, damno erit, nam morbum augebimus. Nam si morbosam affectionem nullo pacto offenderet alimonia, nos uirtuti soli attendentes, agros ut sanos aleremus. Sed quia sæpius noxam uti ostendimus affert, ob id morbi affectionem non tanquam cibi indicatricem, sed tanquam prohibetricem contemplamur, ut Gal. prudenter citato loco scripsit. Virtus ergo pro sui custodia omnem cibum indicat, quem apparare possit, ab hoc morbus omnem abscindit, quo ultra uigorem durare queat agrotans. Id tunc conijcimus, cum eo subtiliori scimus ad statum durare posse. Quare si ad uigorem usque sufficere posse agrotantem existimemus solo uictu per pocula, sorbitiones non dabimus. Sed nec ea que comeduntur, idque ob morbi rationem ut

In r. dera
tione ni-
tus.

C iij. scite

DE VLCTV FEBRICIT.

scite ab Hyp. scriptum est in hæc verba. Postea si dolor quispiam vel periculum comparuerit, sorbitionem dare oportet, neque multam neque crassam sed post septimum aut nonum si validus sit. Audis Hyp. sorbitione supersedere ad septimum aut nonum vsque, cum in eis iudicationem futuram speramus, ubi æger citra sorbitionem eo usque possit sufficere. In cuius expositione Gal. ita scribit. Cum igitur virtus ad morbi vsq; iudicationem sine ptisanæ sorbitione suffecerit, oximeli & aqua mulsa satis sunt &c. Ex quibus manifestum est vñ etiam eum eligendum fore, quo cum corporis virtus sufficiat & eo subtiliori non. An non ne id ab eodẽ loco citato colligimus, ubi ita ait. At si iudicationẽ septima die citius futuram speraueris vt verbi gratia vel quarta vel quinta ægros sane multos sufficere citra ptisanæ sorbitionem posse comperies, quod si ad septimam vsq; protrahatur paucos omnino. Qui igitur citra ptisanam sufficere possunt, ijs oximeli & aquam mulsan exhibere docuit. Qui uero non ptisanam Quinimmo si absq; cibo & potu ad iudicationem vsque durare posse speremus, omnimodã ei inediam consulemus. Vt ipse Hyp. aperte monuit secundo eiusdem de ratione victus ubi ita ait. Ciborum autem adiectioni intendendum multo minus, subtrahere uero omnino sæpenumero expedit, cum æger sufficere possit donec maturescat morbus. Quod Gal. confirmat in hæc uerba. Nempe si æger ad morbi usque uigorem sine cibo sufficere posse uideatur, in omni ciborum abstinentia eum & potu solo cum tibi uidebitur necessitas moderaberis. Vocetur autem ille

Idẽ eodẽ
2. in expõ-
ne illius in
terdum au-
tem & cru-
da.

ille victus quo ad statum sufficit egrotans & eo subtiliori non, medius, hoc subtiliorem exhibentibus corporis uirtus exoluitur, morbus autem incrementum assumit, eo crassiores ministrantibus. Quare rationaliter à distantia status tanquam à termino ad quem usque ducendus sit aeger, victus formam inuestigandam esse rationales opinantur. Nec hoc in arte medica solum didicimus, uerum in rebus humanis id licet obseruare. Prudentem uiatorem quingenta profecturum miliaria, haud nimis festine equitare. Sed moderato ducere equum incessu & labores diurnos nocturna temperat quiete. Nec solum labori modum imponit, uerum & cibo quo equum nutriri oportet, ut eo durare possit. Quod si unius diei acturus sit iter haud necessarium putat quicquam obseruare. Nonne idem nauigantes obseruare uidemus. Nullum quidem sibi parant uiaticum, qui à Calesijs in Angliam se recipiunt. Non sic qui à Venetijs Epidaurum Ragusiorum oppidum proficiscuntur. Iis longe dissimile quod Lusitani Indos petaturi magnis parant expensis. Ii omnes non ab alio viatici rationem sumunt, quam ab itineris mora. Cōsimiliter in arte medica egrotantibus victus formam sumendam à distantia status recte quis ratiocinetur. Nam proxime huic adsunt morborum iudicia alterutrum exitum minantia. Sed age, si à distantia status victus formam non quæras, à quo nam altero ultra uirtutem indicationem sumes? A morbi dispositione forsitan ais, sed cum singulis morborum quattuor ad sint dispositiones, quarum differētiam sensu licet percipere

DE VICTU FEBRICIT.

pere, nempe principium augmentum statum et inclinationem. A qua non harum uictus formam sumendam putas. Proinde cum apud principia & fines omnia sint imbecilliora, apud statum uehementiora, crassiorē quā expediat ministrabis si ab illis, aut plus iusto tenuem si ab ijs, indicationem uictus sumas. Præterea cum nulla sit morbi dispositio quæ cibum indicet sed omnis prohibeat, ut supra ostensum est, cunque alio sit alius acutior & uehementior morbus, non ex æquo omnes pariter prohibebant, sed unus magis alio. Cunque uirtus eum semper uictum indicet quo maxime seruari possit, quem ab ijs duobus quorum alterum unum indicat & id alterum prohibet elicere possis uictum. Finge uirtutem pro sui custodia uictum indicare per ea quæ comeduntur, si morbus multū dissuadeat, quid ab eo uictu detrahes, quid ue cum parum prohibuerit. Insuper unde similes in detractionibus scias aut possis proportionem obseruare, ac in morborum dispositionibus erant. Caterum non obstiterit, plures esse morbos, qui inæqualiter ægotantes affligant, ita ut hodie mitius habeant, in crastinum deterius degeant. Modo absque febre ulla, postmodum magno æstu exagitantur. Aliquando dolores labores ue patiantur, quandoque nullo symptomate infestentur. Non ob id fieri non posse, ut una uictus forma, morbis inæqualiter affligentibus conueniat. Nam & si non eadem ratio in die accessionis et in die quietiori habenda sit, quo maxime differre oporteat, non uictum esse, sed tempus quo innoxie cibum offeras. Eandem nanque uictus

Etus formam quam à robore uirtutis et à distantia status sumpsisti, perpetuo ab initio morbi ad statum seruare oportet. Sed tempus obseruare expedit quo innoxie cibū offeras. Nam in paroxysmis subtrahere oportet, apponere. n. lesio, ut in aphor. scriptum est. Vnde licet colligere ab uniuersali victu formā à particulari vero qui singulis accessionibus conueniat, cibationis idoneum tempus suppeditari. Quod manifestus alibi scripsit in hæc verba. Tempus autē dandæ sorbitionis tum per initia, tum per omnem morbi decursum, nam si pedes frigidi fuerint non à sorbitione modo, verum quoque & maxime à potu temperandum. At cum caliditas ad pedes descenderit, tunc dare expedit. Idem sub alijs verbis dixit. Cum purgauers inquit sorbitionibus quibusdam utitor, obseruatis ita febriū accessionibus, ut nunquam cum adsint neque cum futura sint exhibeas, sed vel cum cessant uel quieuerunt & maxime à principio recesserunt. Frigentibus ergo pedibus, neque potum, neque sorbitiones, neque aliud quippiā huiusmodi dabis. Sentis in ijs duobus locis Hyp. de particulari victu egisse, ut singulis conuenit accessionibus ubi nihil à totius uictus ratione diuersum docuit, quā tempus cibationis idoneum. Idem intelligendum est dedisse in apho. perceptum, cum dixit in paroxysmis subtrahere oportet, quod confirmat Gal. citās. in expositione locum Hyp. quem supra adduximus quarto de ratione uictus. Non igitur eo quod morbi inæqualiter affligant alio utemur uictus quā uirtus & distantia status indicauerunt, ut aduersarij opinantur.

In 2. de ratione uictus

4. de ratione uictus.

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. VII.

*V*ERVUM eorum qui contra sentiunt, rationes as-
dire oportet. Haud facile esse in arte medica metho-
dum tradere, qua id quod est, tale esse dignoscamus,
nedum quale illud futurum sit. Difficillima quidem in
omni arte præcognitio est. Quapropter facilius à uir-
tute & morbi dispositione uictus formam eliciemus,
quam à distantia status qui nondum est. Sed quod cer-
tius hinc, manifestum erit. Cognoscere quæ nã sit ægri-
tudo, et quas habeat causas, et quibus nam commitata
sit symptomatibus, quã quæ pernitiola sint, certius sci-
ri possunt in arte medica, quàm præsciri. Minus præter
ea errori obnoxius est, qui à dispositione morbi cum
uirtute uictus formam inquirunt, quàm qui à distantia
status. Nam considerãtes quod est, ob mutationes deci-
pi non possunt. Prout accidit ijs qui quale quicquã erit
considerant. Conijciens medicus ab initio morbi, eius
acumen, talem fore ad septimum aut nonum æsti-
mat. Hac nixus æstimatione uictum inuestigat, quem
& nunc & in posterum ad illud usque tempus ægro-
tanti ministraturus sit. Sed quantum decipi possit ad-
uerte. Quot sunt quæso morbi, qui ultra incrementa
periodica & decrementsa inæqualiter moueantur, Ita
ut tribus aut primis quattuor diebus ægrotantes graui-
ter affligant, totidem postea aut plus minúsue citrà in-
ditium intermittant. Deinde iterũ increcant et luceãt
& ad pristinam uehementiam redeant. Aut si contra
mutatio fiat. Possis ne in his methodice, uiso ab initio
morbi acumine, aut segnitie, qualis erit ad quintum
aut

aut septimum aut in sequentes dies certo coniungere. Ut ex hac coniectura distantiam status adipiscaris à qua demum uictus formam diffinias. Cuius in eo quod primum præcognoscendum sumpsisti non parum à ueritate aberres, haud leuiter in eo quod ultimū est, in ægrotantem peccabis. Nam paruus error in principio maximus est in fine. Quod si in morbis haud cōtingere huiusmodi mutationes dicas, Hyp. libros de morbis uulgari-
bus reuolue. In quibus nō paucis hoc accidisse inuenias ægrotantib. Cæterū de certitudine mittamus sermonē, et aliquantulū perspicatius rē tractemus. Virtutē eum semper uictū indicare ais, quo maxime seruari possit. Dende status distantiam talem diffinire, quo eo usque sufficiat ægrotans, & eo subtiliori non. Vocasq; hunc uictum medium, crassiori non uteris, ne in morbum addas, sed nec magis tenui, ne plus iusto uirtutē exoluas, & ob id ante statum deficiat. Age methodice laboranti Socrati uictum, quem medium uocas, ministras quo ad morbi uigorem posse sufficere æstimasti. Quid per illud uerbum sufficere intelligis. An aliud ab eo quod Hyp. in Apho. intellexit, qui primus illo in hac re usus est uerbo. Cum ait συντεκμείρεται δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσούντα εὐχαρίεσαι τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆς νόσου, id est coniungere oportet laborantem si sufficiat cum uictu ad statum ægritudinis. Vbi an perdurare possit tali uictu toto inter medio tempore ad statum usque intellexisse, ipse statim ostendit, in eo uerbo quod sequitur καὶ πῶτερον ἔχωντος ἀπαυδόσαι προτερον, hoc est utrum ille deficiat prius. Qua etiam significatione uerbum illud intellexit Gal.

DE VICTV FEBRICIT.

ut ab expositione licet coniiicere, uictum ergo talem mi-
 nistrare laboranti Socrati intendis, quo perdurare pos-
 sit toto inter medio tempore ad statum usque. Quod si
 id simpliciter intelligas, uerbiq; significationem mi-
 nime restringas, modo quocunque ad statum tali uictu
 perducatur Socrates sat esse. Quid si adeo imbecillis
 tui uictus ope eo perueniat ut nulli quantum uis mitis-
 simo morbo sit aptus obsistere, nedum morbo maxime
 apud uigorem seuiente. An te obtinuisse putabis cum
 talem uictum laboranti Socrati longam post medita-
 tionem inueneris. An hoc est cur palles. Forasan illud
 uerbum ais, non fore simpliciter intelligendum, sed suf-
 ficere ad statum usque, tunc intelligis, cum apud uigo-
 rem aliquale ægrotantis uires robur obtineant. Et si
 hoc detur, alia utaris nota oportebit, rem indiuiduam
 nobis significante. Nam illud tuum aliquale nimis am-
 ple patet, nam ea uia, omnis crassus uictus Socrati con-
 ueniret. Nullumq; damnare posses uictum ob crassitiẽ.
 Quod si uirium robur tantum ex poscas, ut morbificas
 possit debellare causas & morbi incurfibus obsistere.
 Ridiculum caput, si hoc quod postulas methodice præ-
 stare uictus posset, nulla esset adeo pernitiõsa ægritu-
 do, quæ non uictis ope medicari posset. Quod si ita rem
 habere contendas scias saltem, hoc tuum latuisse Hyp:
 sed ijs omissis fateberis id saltem, apud morbi uigorem
 labores & symptomata multo uehementiora fieri, quã
 ante, ut a uestro scriptum est Gal. cum dixit de uigore
 1. Aphoris loquens, μέγιστον τοῦ νοσήματος ὡς ἐν συμπτώμασι, hoc est ui-
 ciorum. gor nihil aliud est, quam maximum morbi ut in sym-
 ptomati-

ptomatibus. Putas ergo sat esse qualicumque uirium robore eo perducatur æger, cum tunc maximus sit morbi conflictus. An salubrius fore ægrotanti, si demus operam ut citra morbi additionem, ægrotantē robustiorem quantum possumus ad statum perducamus. Quis hoc damnabit methodice, non tu, si uera & ægrotantibus salubria sequeris dogmata. Cunque hoc ita sit, finge Socratem citra sorbitionem ad statum sufficere posse, pocula ei ministrabis, ut pote quæ minus alimentum præstant. Scis ne eo uictu Socratem sufficienti uirium robore ad statum peruenturum, hoc quamuis iuranti tibi uix credam. Sorbitionibus quare non uteris. Nam ijs usus robustior esset apud uigorem. Forsan ais, quia in morbum addent. Unde hoc scis queso, an à distantia status id conijcis, uel potius à morbi dispositione uel acumine. Quod si dicas, cum statum præcognouero, fieri nequit quin morbi dispositionem cognoscam. Cedo, sed quod horum prius cognoueris dicas, nam id manifestius & certius scies. Ea enim quæ principiorum uicem obtinent, semper manifesta magis sunt, ijs quæ ab eis deducuntur. Cunque à morbi dispositione, status distantiam præcognoscas, morbi dispositionem euidentius cognosces, quam status distantiam. Quare certius & magis citra errorem à morbi dispositione & acumine conijcies, an sorbitiones laboranti Socrati noceant, quàm si idem à distantia status iudicare uelis, esset enim tuum non paucis erroribus iudicium obnoxium. Quare cum in inquisitione formæ uictus, morbus non tanquam indicans

DE VICTU FEBRICIT.

ens sed prohibens admittatur, ut rationales omnes fatetur. Prohibet autem inquantū uictus in morbum, aut in eius auget symptomata. Idq; cum à dispositione morbi euidentius dignoscatur, rectius esse à uirtute & morbi dispositione, uictus formam inuestigare, quàm à distantia status. Ad hæc uires corporum & si hora præsentis conijcias, nō ob id quales futuræ sint in posterum ab initio recte æstimari possunt. Nam multoties euenit, uirtutes corporū exolui plusquam æstimarat. medicus. Aut ob corporis habitum aut naturā aut ob morbi aliquod irritatorium symptoma. Quare si ut uirtuale robur seruetur, ideo cibus ægrotantibus exhibetur. Hoc non similiter sed morbo procedente nonnunquam præter medici opinionem disponatur, fieri non potest ut à distantia status & à uirium robore prout est in initio, conuenientem uictum tum naturæ laborantis per totum morbi decursum ad statum usque, tum morbo ob inæquales mutationes eliciamus. Sed sint omnia ut uis methodice. Scito non satis esse in arte medica, uera dogmata docuisse, nisi in artis operib. utilia fore ægrotantibus probentur. Utilitas enim artis nō est uera differere, sed remedia inuenire quib. æger sanetur, aut uetetur. Neque satis esse si uera & utilia tradideris dogmata, sed tradere oportet uia adeo perspicua, ut plebi si liceat res inotescat. Sic enim id quod humano generi salubre speramus communissimum faciemus. Quod si aliter sit, demittenda esse ea dogmata, ad quæ percipiēda, aut operibus probanda, difficilis datur uia. Qua propter cum præcognitionis status difficilis admodum sit

fit scientia, & ab ijs solummodo adepta medicis, qui uires omnium quæ in arte sunt probe didicerint, memoriæ mandauerint, omniq; diligentia in artis operibus se exercuerint. Pauciq; cū tales existant, patet demittendam hanc uiam esse, ut quæ à uiris dūtaxat doctissimis percipi possit. Quare cum facilius & certiori modo res inuestigari possit à morbi dispositione, manifestum est hanc uiam eligendam esse in inuestigatione formæ uictus.

CAP. VIII.

QVAM non esse præter senis mentem paucis accipe, ut qui primus à morbi dispositione & uirtutis robore, uictus fermam inuestigauerit in libro apho. Vbi ita scribit ubi morbus peracutus est & illico extremos labores habet extreme tenuissimo uictu necessarium est uti. Per labores accessiones & symptomata intellexit quæ morbi dispositiones sunt. Maxime acuto morbo in ediam adhibendam consuluit quæ extreme tenuissimus est uictus. Et infra ait ubi uero non, sed cōuenit crassius reficere, tantum sub condescendere oportet, quantum morbus extremis est mollior. Quibus in uerbis apertissime Hyp. uictum à morbi dispositione seu constitutione inuestigasse uidetur. In eo in super qui sequitur cū morbus, inquit in suo constiterit uigore, tenuissimo uictu necessarium est uti. In quo maximum morbi esse in symptomatibus scimus. Eadem in commentarijs de ratione uictus uia, uictus formam inuestigat. Vt in primo de pleuritide agens ita scribit, postea si dolor quispian uel periculum comparuerit, sorbitionem dare

D nec

DE VICTV FEBRICIT.

nec multam neque crassam, sed post septimum aut nonum si ualidus sit. Idem paulo ante apertius dixit, ubi autem dolor aliquis uexauerit, oximeli bibendum dabis. Sentis ex ijs duobus locis ex dispositione pleuritidis, uictum per pocula ministrandum consuluisse. Sed non solum à morbi dispositione competentem uictum inuestigare docet, sed noxium ab eadem deprehendi Hyp. docente eodem cōmentario. Ubi ita scribit. Præterea si lateris dolor assiduus est, calidisque fomentis non remittitur sputumque non procedit, sed summa glutinosum sit, nisi quis dolorem uel alui subductione uel secta uena, pro utriusuis exigentia soluerit, ptisana nam autem ita affectis dederit, præcipitē aget in mortem. Nec illud tanquam peculiare ptisanæ fore concipias, nam omnem sorbitionem & multo magis ea quæ comeduntur damnauit, stante tali morbi cōstitutione seu dispositione. Quod ipse statim monet, præhendunt, inquit hæc, non solum si ptisana intempestiue utantur, uerum & multo magis si quippiā aliud ederint aut biberint, quod ptisana inconuenientius sit. Sed ut non teratur tempus in singulis citandis locis, unū adducamus in quo Hyp. omnes ad rectam uictus institutionem scopos collegit. Ex quibus post uirtutis robur, morbi dispositionem innumerauit. Coniungere, inquit oportet & robur & morbi cuiusq; dispositionē, homini item naturam atque egrotantis in uictu consuetudinem, nō in cibis solum, uerum & in potibus &c. Sed hoc idem à Gal. audias tertio cōmentario eiusdem libri in expositione illius. Tutius aut longe &c. Ptisanā, inquit totā porrigit

In 2. de ratione uictus.

porrigit his qui moderate habēt. (Nō qui mitius quie-
tiusq; habent, ut quidam perperam transtulit) solum
uero cremorem ijs qui deterius degunt. Verum ijs qui
periculosius acutiusq; laborāt, potus solos. Ostendimus
igitur in ijs quæ dicta sunt, uictus formā à morbi dispo-
sitione seu cōstitutione unā cum uirtutis robore secun-
dum senis mentem inuestigandum esse.

CAP. IX.

VERVM hæc non satis esse ad rectam uictus
institutionem nisi ijs distantia status præcognitionem
adiungas. Et si enim à morbi constitutione & à uirtu-
tis robore uictum per pocula conuenientem esse scias
in præsentī, non tamen ex his duobus scire posses, ci-
tra status præcognitionem an cibo illo in posterū agro-
tans sufficiat, citra magnum uirium incommodum.
Nam si alicuius pedestri itinere quingenta profecturi
miliaria robur præsens consideres & unius diei iter
sat esse si hominem pane & melle nutrias &c. Pote-
rit enim eo cibo triginta pertransire ea die miliaria.
Quod si reliquum uia consideres, crassiori sibi opus
esse nutrimento iudicabis. Ob id igitur diuinus Hyp-
poc. postquā morborum dispositionem recensisset, sub-
intulit conijcere autem oportet ægrotantem si sufficiat
cum dieta ad statum ægritudinis. Non enim sat esse ut
robur uirtutis quale nunc est consideres, & an talem
uictum hodie citra uirium sensibilem lesionem ferat,
sed an toto intermedio tempore ad statum usq; ferre
possit. Ob id Hyp. in consideratione uirtutis, status me-
minit à morbi igitur dispositione uictus formā primū
D ij elicimus

DE VICTU FEBRICIT.

elicismus. Deinde virtutem laborantis inspicimus. Tertio distantiam status conijcimus. Demum aestimamus an eo victu quem morbi constitutio indicavit, virtus aegrotantis ad statum citra magnum virium incommodum durare possit. Qua propter status distantiam praecognoscere oportet ultra morbi constitutionem, ut recte aegrotantibus victum diffinire possimus. In qua sententia Gal. esse scito in libro aphorismorum in eo paroxysmos, & consistentias. ubi à duobus victus formam inuestigare docet nempe à uirtute & morbi constitutione, in qua morbi dispositionem, & status distantiam comprehendit. Cuius verba ita habent.

Τὸ μὲν τῆς ὅλης διαίτης σχῆμα πρὸς δύο σκοποὺς ἀπεβλήπων ἐποίητο τῶν τε δυνάμιν τε καὶ μόντος καὶ τῶν κατὰ τὰς τῆ νόσηματος τοῦ ῥᾶ ἢ τε κατοξὺ ἢ τε ὀξὺ ἢ τε χρόνιον εἶσιτο τοῦ νόσημα καὶ ὁ πῶς καὶ μάλιστα τῶν ἀκμὴν ἀπολίφετο, τῶν κατὰ τὰς ἐν τῇ νοσηματος σκοπεῖν, hoc est totius victus formam duos respiciens scopos instituit, aegrotantis nempe uirtutem, & morbi constitutionem, illud enim siue peracutus siue acutus siue chronicus morbus erit, & quando maxime in statu consistet, constitutionem morbi est considerare. Unde male quidam vertit hunc locum in hunc modum, nā si morbus sit peracutus uel acutus, uel longus & cæt. Litere sensum corrumpit & non transtulit. Ex quibus uerbis duo sub constitutionis nomine comprehendisse Hippoc. nempe morbi acumen, & status distantiam, aperte ostendit Gal. Verum unde peracutum & acutum cognoscas & discernas & eos qui inter hos medium obtinent locum infra ostendemus.

Cap.

Iis ita determinatis. Morbo peracuto quiq; intra quartum diem terminandus sit ultimo tenuissimo uictu utemur. Quem supra omnimodam sumus interpretati abstinentiam. Sic dixit Hyp. ubi peracutus morbus fuerit, & statim ultimos labores habet, ultimo tenuissimo uictu necessarium est uti. Per morbum qui statim ultimos labores affert, eum intellige qui intra dies quatuor finire debeat. Et subdit ubi uero non, pleniorum uictum adhibebimus. Hoc est ubi morbus ab ultima symptomatum uehementia proxime degenerat, (qualem qui ad septimum terminantur, habent) eo utemur uictu, qui inedia proximus est, talis autem est uictus per pocula ut melicratum, & similia. Huic tali uictum per pocula ministrandum fore consentiente uirtute asserit Gal. in expositione illius. Postea si dolor quispiam &c. Vbi ita scribit, si enim ualidus ad septimum usque diem fuerit, oximeli & melicratum & aquam dare satis erit. Per quæ ut dixi tunc liberabitur & sanabitur. Idem dixit prima Apho. in quibus uero, inquit non ultra primam septimanam protrahuntur, forti existente natura solo utendum est melicrato &c. Qui uero morbo simpliciter acuto laborant, cuius terminus ad duas finitur septimanas crassa sorbitione, exempli causa, tota ptisana uti debent. Qui autem morbo acuto laborantes periculi magis participes sunt, ad undecimum terminum habituri, tenui sorbitione alendi sunt, ut cremore ptisane. Hæc similiter secundum mentem sunt Gal. in libris

Primo de
ratione ui-
ctus.

D ij de

DE VICTV FEBRICIT.

de ratione uictus. Iis ergo qui peracuto morbo intra primos quatuor dies terminando laborant, omnimodā conuenire inediam. Cum uero eo morbo laborat qui ad septimū terminari debeat, pocula. Ex ijs duabus uictus rationibus quæ ab Hyp. didicimus manifestum fit quibus utraque sorbitio competat. Nam cum has quatuor uictus rationes, acute ægrotantibus cōuenire supra ostenderimus, terminusq; acutorū morborum xiiij. sit, manifestum sit quod utraq; sorbitio ijs cōpetet morbis qui xi. & xiiij. terminū habituri sunt. Cūq; ij qui xi. finiēdi sunt morbi, grauius affligant, quā qui xiiij. ijs tenuē exhibendā, qui uero xiiij. crassam fore sorbitiōnē manifestū est. Morborū igitur acutorū intra xiiij. diē terminandorū, hmoi est uictus ratio à morbi constitutione diffinita. Hæc autē nihil aliud est quam morbi dispositio, terminos morborū diffiniens. Non immerito igitur ab huius termini distantia, uictus ægrotantibus diffiniendi sunt. Cūq; quatuor assignentur ab Hyp. in dies xiiij. quaternarij, qui primā sensibilem differentiā morborum in acumine præstant quibusq; ut plurimum terminari morbi acuti solent, singulis suā uictus spetiē diffiniuit, prout morbi ad inuicem acumine differunt. Ita ut quatuor qui intra dies. xiiij. sunt terminis, quatuor similiter uictus formæ respondeant.

C A P. X I.

SUPEREST nunc, quibus nam signis februm singulas quæ ad quartum, & quæ ad septimum, undecimum, & quartumdecimum terminū habituræ sint noscamus. Maxime enim conducit in arte medica sensu

su ea discernere quæ cognita ægrotantibus salutifera sunt. Deinde de uirtutis robore sermonē faciemus, ut pote quod nō minus indicatiuū est formæ uictus quàm morbi constitutio ut infra ostendemus. Prius tamen unum querere oportet, an cōmittendum sit aliquo in morbo ægrotantem diebus quatuor omnimoda seruare inedia. Res ardua uidetur profectō præter assuetudinem hominem incibatum ad diem quartum ducere.

Nam ut Hyp. in libro secundo de ratione uictus scribit, oportet disciplinam quæ conferat ex sanorū uictu facere. In cuius expositione Gal. ita ait si sanis læsionē afferent, repentine uictus ad cōtraria mutationes, multo maiore ægrotantibus. Ponamus igitur hominem sanum uiribus ualentē, aut inualidum, si uelis, ab assuetō uictu ad quatuor dierum inediam repente mutari.

Qualem hunc uesperascente die quarta fore æstimas. Profectō si mortuus non fuerit, semimortuus iacebit, collapsis uiribus, qui an cibo & potu refici possit, necne, n̄ parum dubito. Cum igitur hoc sano accidat, ex illa repentina mutatione, quid ægrotanti maius illo accidere potest nisi ipsa mors ex totidem dierū inedia. Res plena discrimine uidetur, ægrotantem sine cibo & potu, ducere usque peracuti morbi inclinationem. Qui ad quartum quandoq; ad quintum protrahi eius crisis potest. Ut Gal. uisum est. Præterea cum morbi quibus inediam consulimus, maxime acuti sint, & ob id perniciosi, haud quaquam medicus uulgi calumniam effugere posset, si post quatuor dierum ieiunium moreretur æger. Non quidem ob morbi uim, sed ob inediam

1. Aphorismorū.

D. iij mortem

DE VICTU FEBRICIT.

mortem subsecutam uulgus clamaret. Vbi insuper hoc ab Hyp. didicimus. Et si longiorem hæc disceptatio sermonem exoptulat, solam tamen eam quæ ad rectam institutionem & ad ægrotantium commodum spectant attingant. Sequens summa rerum fastigia. Non omnem mutationem quæ ægrotantibus repente accidit, molestio rem ijs esse quam sanis. Nam id nos sanorum experientia, docet, prandium præter assuetudinem demittentes moleste ferentes. At febre si corripiantur facile eis esse prandium assuetum dimittere. In sola igitur dissimili siue disproportionali mutatione peius habent ægrotantes quam sani. Vt si ab inedia unius diei aut duorum ad crassa cibaria mutatio fiat, peius habebunt ægrotantes quam sani. Quod si a crasso victu ad inediam mutatio fiat, grauius ferent sani quam ægrotantes. Ob id quod mutatio dissimilis est, mutatio enim victus ab inedia ad crassa cibaria, ad maius est, quam ob rem maiori opus erat uirium robore, ægrotantes uero dissimiliter mutantur nempe à maiori uirium robore ad minus, quare molestius ferent. Hoc arbitror sensisse Hypo. cum ait mutare quidem bene habet non modicum recte sanè transferatur & mutatio. Illo uerbo recte quod græce ὁρῶς dicitur proportionalem intellexit mutationem quam pluribus ostendit exemplis, hoc idem sed obscure admodum ut solet, dixit in eo textu qui ita incipit τῆς τροφῆς δὲ τοιοῦτὸ τὸ μέρος, hoc est inuandam partem hanc sermone contrario. In cuius expositione Gal. uerbum ὁρῶς non interpretatus est. Sed dixit Hyp. non paucis ostendisse quid per illud aduerbium indicare

2. de victu
acutorum.

Eodem 2.
bib.

indicare uolisset. Tu ergo breuem habes de mutationibus repētinis sententiā, quam arbitror scriptis Hyp. conuenire. Quod de uiriū maximo detrimento ex quatuor dierum inedia dicitur, citra est. Noui Hæbreum sex diebus abstinentem apud Lusitanos & plures sunt qui triam dierum abstinentiam patiuntur, citra in si-gne incōmodum negocia obeunt. Qua in regens Hæbreorum firmum ualet præstare testimonium, ut quorum plurimi annuatim huiusmodi trium dierum abstinentia corporū absumentur libidines. Unde ijs magnitudine morbi suadente citra ullū discrimen quatuor dierum inediam consulet medicus. Alijs uero propter inassuetudinem non nisi urgente morbi uehementia, & uirium imbecillitate id non dissuadente, tum corporis habitu tali ut ob pororum angustiam & cutis spissitudinem haud facile corpus effluat, præcipue media hieme hæc si coniungantur omnia, quatuor diebus hominem omnimoda seruare abstinentia nō uereberis. Aliquo horum deficiente potum dato. Verum ad hæc forsā aliquis insurget, nā & si hæc duo cōcedantur. Nēpe cibum quantumcunq; tenuē ijs esse læsioni qui peracuto morbo laborant, ut in superioribus initio huius operis demonstrauimus, & ab inedia quatuor dierū minus egrotantes lædi quā sanos, non constat ob hæc utrum eorum magis conferat, aut minus lædat, nempe inedia, aut uictus tenuissimus. Quod si ab Apho. locū argumētationis sumamus in paroxysmis subtrahere oportet &c. Dubitationis occasionē dederimus, nā in paroxysmis læsio q̄ ex inedia unius diei prouenit, par-

ua

DE VICTV FEBRICIT.

na est, quæ uero à cibi oblatione, maior, nam cibus eo tempore sensibili nocumento esse solet. Inedia vero unius diei cum parum sano noceat, minus egrotanti nocebit ut ostensum est. At in peracuto morbo & si cibus non parum ledat, magis fortasse quatuor dierum inedia nocebit. Nam scimus sani corporis robur à quatuor dierum abstinentia prosterni: quapropter cum alia ad id discernendum non detur via, de consuetudine rogare oportet. An unius aut duorum aut trium dierum inediam sustinuerit. Quod si parum fuisse læsum ostendat, audacter eum incibatum ad dies quatuor seruabimus. Presertim ubi corporis habitus talis fuerit ut non facile effluat. Quod si ægre ferre unius diei ieiunium dicat, huic non inediam sed uictum per pocula ministrabimus. Quod ad medicum spectat sciendum in arte medica, neque curatiuam indicationem neque victus rationem à vulgi opinione sumi. Vnde pius Medicus quod de se ipso Gal. scripsit, opinetur equum est. Nescio inquit quo numine inspiratus, aut furare percitus, & famam vulgi contempsi & solo veritatis studio scientiæque flagraui, nullam honestiorem possessionem esse ratus. Neque hoc extra mentem Hip. est. Qui ita scribit non igitur intempestiue neque fortes vasorum inanitiones moliri, neque cum morbi uigent, aut in flegmatia sunt, quicquam exhibere. &c. Cunque morbi vigor nihil aliud sit quàm morbi in symptomatib. summum. Vt à Gal. scriptum est, manifestum est peracutum morbum in quo ultima accidunt symptomata statim rigere, quapropter secundum senis mentem, mini-

9. de metho-
dodo me-
dendi.

2. de ratio-
ne uictus.

1. Aphor.

ministrandum non esse quicquam. Idem uoluit alibi cum dixit. Adiectioni autem ciborum intendendum multo minus, subtrahere vero sepe numero expedit cum aeger sufficere possit, donec morbus maturescat. In Apho. praeterea dixit. Ubi morbus peracutus est &c. Ultimo tenuissimo uictu quem omnimodam sumus interpretati abstinentiam, utendum esse monet: statim extremos habere labores intelligit, cum intra primos dies quatuor summus morbi futurus sit uigor, ut est sententia Galeni.

2. de ratio
ue uictus.

Aphor. 1.

CAP. XII.

NEC in ijs solum qui intra quartum diem terminantur morbis, virtus est inspicienda, sed in alijs qui ad septimum; quos potibus nutriendos supra diximus. Quae si imbecillis in presenti sit, aut in posterum ante diem status imbecillem fore speras, non solum poculis hunc, sed tenui sorbitione nutries. Primum ex pulsu cognosces. Secundum ex corporis habitu, an facile transpirabili & ex tenui succorum substantiam. Qua in re consentit Gal. in expositione illius. Postea si dolor quispiam &c. Idem dixit in commento illius. Tenuis & exquisiti victus &c. Quod si inquit naturae robori non fidamus, ptisanae utemur succo. Idem est in alijs iudiciu, semperque proxime crassiore victu ministrabis cum vitalis facultas eum uictu non ferat, quem morbi constitutio indicauit. Vitale autem robur cuius seruandi gratia nutrimus, ex pulsu cognoscendum diximus, quale in presenti hora est. Quale autem erit in posterum, ex corporis habitu, nempe an raro an denso, & ex di-

Lib. 1. de
uictu acu-
tarum.
1. Aphor.

spo=

DE VICTV FEBRICIT.

positione succorum, nempe an crassi an tenues, & ex consuetudine, id est an multum & multoties ædere si solitus aut modicum & raro. Hæc omnia imis reconde sensibus nā ægrotantibus salutem & tibi gloriā haud quaquam inanem parient.

CAP. XIII.

1. prædi-
ctionum.

1. prædi-
ctionum.

2. de ratio
ne uictus.

NUNC quos peracutos qui ad quartum termi-
nentur & quos acutos qui ad xiiij. & quos inter me-
dios dixeram, unde cognoscas audi. Morbum quē græ-
ci κατὰ τὸν dicunt nos uero peracutum interpretamur,
& qui ad diem quartum finitur per ultima discernes
symptomata. Talia autem sunt, cum alijs symptomati-
bus coniuncta est continua inquietatio. Quod nomen
ut autor est Gal. in expositione illius si uero nudos
habeat pedes &c. Indicat illos conflictari quouis iacen-
tis habitu. Nec non alium ex alio mutari. Cuius cau-
sa prauī humoris copiam in principe parte, esse scien-
dum est. Ob cuius causam breui admodum terminan-
tur ægritudines in quibus continua adest inquietatio,
maligni humoris lesionem principe parte diutius non
ferente. Ad hæc scire oportet ultima non posse dici
symptomata si ægrotans unum decubitus habitum ser-
uet. Significat enim principes partes haud grauiter
lædi. Gal. ob uentriculi oris malitiam, aut ob uirtutis
imbecillitatem inquietationem fieri scribit. Verum ali-
bi in expositione illius interdum autem & cruda tum
à capite &c. Ob multitudinem prauorum humorum
quos græci χυρὰς uocant in uentriculo accidere ait.
Verum quamobrem in prædictionibus αὐστηρ inque-
tationem

tationem appellet, in libro autem de victu acutorum
 διαπονηματα & an aliqua inter utrunque differentia sit
 presentis negotij non est referre. Nunc inud scito in-
 quietationem unum esse ex signis crisim indicantibus
 ut à Gal. scriptum est. Nisi ob ægrotantis teneram na-
 turam accadat, ita, ut à minimis præ delitijs se vinci
 ostendat. Inquietatio igitur continua coniuncta febre
 morbum ad quartum terminat. Precipue si tempera-
 tura, ætas, anni tempus, calida fuerint. Hunc peracu-
 tum esse morbum dices cum ultimis symptomatibus.
 Huic si vires constant nihil ministrabis. Quod si his
 non fidas, pocula exhibeto.

i. de crisi.

CAP. XIII.

HIS sic habitis signa precurrere oportet, quibus
 morborum singulos qui ad septimum, undecimum, &
 quartumdecimum terminentur cognoscas. Sed prius
 dicere qui proprie sint morti acuti oportebit. Et
 quo maxime deprehendantur signo, quod si omnibus
 acutis commune sit, manifestum est tale per se acu-
 torum omnium leuissimum morbum efficere. At quod
 nam tale signum esse dicemus, nam id scire maxime
 conducit ad intellectum eorum quæ ab Hyppo. scripta
 sunt, in eam artis partem quæ victus rationem docet,
 tum in eam maxime quæ prædicit. Hoc profectò si-
 cut, & reliqua ab Hip. querendū. Qui in primo de mor-
 bis vulgaribus comentario tertio acutissimos & ma-
 ximos grauissimosque morbos ac præ cæteris omnibus
 læthales incontinua febre esse scribit. Quo in loco Gal.
 scribit quoquomodo inquit febrem continuam acci-
 pias

DE VICTV FEBRICIT.

pias uerus est sermo. Acutissimi enim morbi & maxi-
mi & grauiissimi in ijs fiunt, qui proprie synochi hoc est
continentes dicuntur febres. Et nihil minus in alijs quæ
particularibus progrediuntur paroxysmis, principia
augmenta status & inclinationes manifestas efficien-
tes, neque ad integritatem desinentes, de quibus est sa-
tius hoc loco interpretari. Quoniam synochis proprie
dictis in ijs contineri cõtingit, & nõ in synochis has. In
quibus uerbis aperte nos docet Gal. febris continuitatẽ
acutos morbos efficere & hoc ipsum omnibus quæ acu-
te & graues sunt febribus cõmune esse. Vt pote cum fe-
bris continuitas omnibus coniuncta sit. Cũq; cõtina-
rum leuissima sit ea quæ periodice inuadit, principia
augmenta status inclinationes apertas efficiens, mani-
festum est febrem continuam periodicam, primam &
leuissimam acutorũ morborum esse. Cũq; acutorum
morborum terminũ intra dies quatuordecim posuerit.
Hypp. manifestum est febrem continuam periodicam
intra dies quatuordecim fore terminandam. Morbus
igitur qui ad quartumdecimũ terminatur, a continui-
tate febris cognosces, ut Gal. scripsit in expositione il-
lius. Secundum eandem rationem in mulieribus. Nec
obstiterit esse morbos cum febris continuitate qui ad
uigesimum terminentur, unde uerisimile non uidetur
esse limitem acutorum quartumdecimum esse sed uige-
simum. Vt Gal. tetigit loco proxime citato. Prætera
nec te perturbet, acutos morbos esse qui in quadragin-
ta diebus iudicentur ut Hyp. docuit in eo spirationis
facilitatem. Nam & si uerum sit febres acutas in ui-
ginti,

3. prædi-
tionum.

1. prædi-
tionum.

ginti, & quadraginta diebus iudicare posse, non tollit quod dictum est ab Hy. acutos morbos in quatuordecim diebus iudicari. Nam cum iudicationum modi quatuor sint, nempe ad salutem aut ad mortem ad melius aut ad peius ut à Gal. scriptum est in libris de crisis, manifestum est fieri posse, ut acutus morbus intra quatuordecim ad melius aut ad peius iudicetur, apud uigesimum, aut quadagesimum integra terminatione ad salutem aut ad mortem terminetur. Quare id uerum esse semper, morbos acutos intra quatuordecim dies aliqua quatuor terminationum iudicari. Ut Gal. asseruit in eo. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicatur. Vbi ita scribit nullus enim inuentus est unquam morbus qui ab initio uelociter moueretur hunc transgredi terminum, quin aliquam ex dictis non acciperet mutationem. De eo igitur nobis termino sermo est, in quo ad salutem aut ad mortem aut ad melius aut ad peius subito mutantur ægrotantes, Firmiterque cum Hyp. asserimus, febris continuam intra quatuordecim dies aliquam harum quatuor mutationum ostendere. Febrémq; continuam periodicam hunc non transgredi terminum, citra aliquam quatuor iam dictarum mutationum.

CAP. XV.

INTER medijs uero eadē sortiuntur nomina, nam qui ad septimum aut citius terminantur peracutos uocauit Gal. loco iam citato. Qui uero ad undecimum acutos, aut exquisitos acutos, qui ad quartumdecimum, simpliciter acutos dixit uerū ut ille ait disceptatio de nomine

DE VICTV FEBRICIT.

3. pærdi-
tionum.

mine est, modo scias quæ nã sint symptomata qua mor-
bum ad septimum, & quæ ad undecimum terminari
faciant. Quod si febris continuitati à primo die do-
lor capitis adsit, & die quarta magis ingrauescat, ad
septimũ terminabitur. Sic Hyp. si quibus, inquit horũ
capit dolor die primo, die quarto premũtur, maxime,
& quinto, ad septimum soluuntur. Idem asserit eo-
dem libro de acuto aurium dolore in febre cõtinnua ac
uehementi, quibus si natu minores afficiãtur, intra se-
ptimum aut morientur aut euadent. Natu tamen ma-
iores quia minns febre & delirio infestantur, & quia
minus acute dolent ob nerui duritiem, ultra septi-
mum iudicantur. Ex ijs uerbis Hyppocratis & ex ijs
quæ in libris de ratione uictus & inde morbis uulgari-
bus scripsit, colligimus tria esse sympmtomata, quæ cum
insignẽ adepta sunt uehementiam & cõtinnuatẽ, mor-
bum ad septimum terminant. Nempe dolor capitis, ui-
gilia & delirium, si febrem continuam continentur.
Ut melidia quæ decubuit iuxta ædem Iunonis contigit
de qua Hyp. In fine primi de morbis uulgaribus agit.
Cui caput collum & pectus magnopere doluisse cum
febre acuta scribit. Doloresque omnium horum per-
petuo fuisse. Quam ait die septimo sudasse, febrẽmq;
intermisisse. Vnde apparet indicatã fuisse, ad melius.
Item adolescentulum qui in mendacium foro decumbe-
bat igne correptum fuisse scribit Hypp. in tertio de
morbis uulgaribus, uigilias cũ pateretur aliaque exi-
tialia signa haberet, ad septimum obiit. In cuius
expositione Galenus refert hunc adolescentulum om-
nibus

nibus diebus nihil planè dormiuisse. Idem præterea mulieri abortione infantis à febre ardente correptæ & uigilias patienti accidit. Nec obstiterit quod in eodem tertio prædictionum libro doloris capitis uehementis meminit, continui cum febre de quo iudicium facit cum uigesimum diem transijt. Nam si Galenum in expositione legas, incondite locutum fuisse Hyp. audies. Sed recto ordine Hyp. sermonem textit in hunc modum. Capitis dolor uehemens & continuus cum febre si quod ex inditijs extiterit exitiosis integre lethalis est. Si uero ex ijs quæ didicisti de agro conualituro speres, à principio quidem ad septimum usque sanguinis enaribus fluorem expectato. Procedente uero tempore id etiam eueniet. Vnde fieri non potest ut dolor capitis uehemens & continuus cum febre, ultra septimum iudicium differat, quin aut ad Salutem, aut ad mortem, aut ad melius, aut ad peius mutationem faciat. Cum uero ultra septimum absque iudicio protrahitur, aut eius uehementiam, aut continuitatem deficere necesse est. Iis fidem præstat uersio in octoginta uolumina, quæ ita habet. Dum autem ualidus & recens dolor fuerit, sanguinis de naribus eruptionem apud septimum expectato &c. Ac si uelit post septimum iudicium si protrahatur, ob id esse, quod in ualidus dolor erat. Morbi autem qui ad undecimum iudicantur mediæ uehementiæ sunt, inter eos qui ad septimum terminantur & eos quos simpliciter acutos diximus, qui ad quartumdecimum finiuntur. Propria autem signa quibus discernere eos possis non dantur. Verum per ea quæ diximus

E sympto-

DE VICTV FEBRICIT.

3. Prædi-
ctionum.

In 1. de
morbis
uulgarib.
commen-
tario.

symptomata septem dierum terminum ostendentia si die tertio inceperint apud quintum uero uehementius molestantur, morbum discernes ad nouum aut undecimum terminandum. Quod ab Hyp. didicimus loco iam citato hoc modo, si quinto inceperit & undecimo magis fluctuauerit, terminum ad quartumdecimum designabit. Sed simul cum ijs temporis constitutionem considerare oportet. Quod si morbo conueniat, fiducia maiorem habebis, quod intra præscriptum finietur terminum. Quod si contrarie sit qualitatibus nempe frigidum & humidum, scito morbum ad ulteriorem protrahendum quaternarium. Huius autor est Gal. in expositione illius circa arcturum multis facta est iudicatio in statu tertio, simile est prima Apho. ubi æstatem dixit morbos breuiare hiemem producere. Considerationem etiam temperamenti egrotantis habitus & regionis non prætermittas ut singulorum morborum terminos artificiali possis coniectura conijcere. Quod de dolore capitis qui tertio inceperit & quinto magis fluctuauerit diximus, de uigilia & delirio intelligas oportet. Horum quodlibet si die tertio inceperint, & quinto uehementius affligant, apud undecimum morbus terminabitur. Verum quia symptomata quæ acutum aut peracutum morbum reddunt, cum febre continuæ coniunguntur à quibus terminum conijciendum supra docuimus, solent diuersimode in morbis mutari, ita ut nocte unam in somnem agat egrotans. Sequenti dormiat. Nunc deliret, modo mentis compos uideatur. Diebus accessionis caput doleat, intermissionis cesset, aut minus

nus torqueatur, quonā pacto ex ijs terminus cōiici possit forsan quis dubitabit. Verum si ea quæ supra diximus, recte quis percipiat, huic dubitationi locū non esse intelliget. Nam cum uigilia continua acute feбри coniungitur, aut dolor capitis uehemens cōtinuus affligit, morbū ad septimū terminandum diximus. Quod si uigiliarum aut doloris delirij ue continuitas cessent, intelliges horum symptomatū ratione, morbum ultra septimum terminandum. Alia obiter symptomata cōsules, & febris magnitudinem & eius motus uelocitatem, à quibus omnibus an ad undecimum, aut ad quartūdecimum terminari morbus debeat cōiicies. Sat tibi est ad uictus formam inueniēdam, quibus nam signis morbos qui ad quartum, & qui ad septimum, undecimum, & quartumdecimum terminantur cognoscas.

CAP. XVI.

VERVM ad uictus formam inueniendam parum referre an diebus intermedijs terminus accadat. Eadem enim uictus forma uteris, cum morbus ad diē nonum, aut ad undecimum, terminari debeat. Item eodem uictu cum ad tertiumdecimum, aut quartumdecimum finiendus sit. Nec hoc præter senis mentem est, qui eodem uictu utitur, nempe poculis, si septimo aut nono terminari morbus debeat. Cum dixit sed post septimum aut nonum si ualidus sit. Sentis ex ijs uerbis Hyp. eadem uictus forma usum fuisse cum morbus ad septimū, aut ad nonum terminū habiturus esset. Grauius autē errabis, si morbus ad quartum terminandus sit, egrotantem eo uictu nutrias qui morbis ad duas
E ij septimanas

In i. de uictu acutorum.

DE VICTV FEBRICIT.

septimanas finiendis conuenit. Minus autē lædes si e-
utaris quo ad undecim dierum morbos utimur. Multo
autem minus si eo qui septem dierum termino conue-
nit. Porro discernere morbum qui ad quartum termi-
nabitur, ab eo qui ad quartumdecimum, aut undecimū
facillimū est. Nō aliter quā si grauissima symptoma-
ta & febres ardentissimas ab ijs discernas, quæ mitio-
res multo sunt febres, & augmenta & decremēta ma-
nifesta habent. Et nullum sēuū sortiuntur symptoma.
Hæc autem ab ijs quæ morbum intra septimum termi-
nari faciunt symptomatibus, separare, facile ijs est qui
in artis operibus mentem exercitarunt.

CAP. XVII.

SED interim dum usum in ijs cōparas, febres tibi
indicabo quibus prædi termini adaptentur. Ut initium
huius meditationis habeas. Causus legitimus hoc est
febris ardens, quæ à bile impermixta ortum habet, fe-
bris præterea quam synocham recentiores nuncupant,
si cum inquietatione coniuncta sit, ad quartū termina-
bitur. Eadem uero si cum uigilijs, aut capitis dolore,
aut delirio, continuis fiant, intra septimum. Febres con-
tinuæ quarum in die quietiori symptomata ægrotantē
utcunq; molestant, ad undecimum. Quarū uero apud
inclinationem febris syptomata omnino euanescent,
ad quartumdecimum. Hæc nō sunt præter senis mentē,
ab ijs enim quæ dixit in libris de ratione uictus, & in-
de morbis uulgaribus colligere ea licet. Quibus igitur
ardentes febres cum inquietatione fiunt, si robusta
sint uirtute, & habitu denso, difficulter spirabili præ-
cipue

cipue si abstinentiam longam citra insignem incommo-
dum pati assueti sint, hos in omni seruabis inedia. Si
aliquod deficiat, nempe uirtus sit imbecillis, aut habi-
tus rarus, facilis resolutionis, aut humores nimium te-
nues, potibus hunc nutries. Quod si febris ardens ci-
tra inquietationem sit, & uigilijs torqueat, uirtuteque
ualenti & reliquis ut oportet habentibus, pocula, mini-
strato. Quod si illorum uirtuti non fidas, aut in præ-
senti aut in posterum, tenuem sorbitionē exhibeto. Fe-
bri autem cuius symptomata in die tranquilliori non
quiescunt, si cum robore uirtutis accidant, tenui sorbi-
tione. Quod si ob imbecillitatem præsentem aut ob ha-
bitum rarum in posterum illum non posse sufficere spe-
res, præcipue si multo sit cibo assuetus, & humores te-
nues fuerint, crassa sorbitione hunc nutries. Quod si
febris continua sit, cuius symptomata in die quietiori
omnino euanescent, crassa sorbitione ales. Quod si im-
becillis fuerit uirtus, aut habitus rarus aut tenues hu-
mores affuerint, aut multo cibo assuetus sit, præcipue si
hiems fuerit, huic comedendum dabis. Quod facilis sit
coctionis, quorum omnium infra latius meminero cum
de uictus singularum febrium sermonem fecero. Cæ-
terum cum in libris Hyp. de morbis uulgaribus lega-
mus, plures eorum quos describit egrotantes ab initio
morbo acuto laborare tali symptomatum uehemētia,
ut uideantur intra septimum terminum habituri. Rur-
susq; mitiores fiunt citra crīsim, aut intermittunt om-
nino, & cessant aliquot diebus, & rursus redeunt, &
uehementer affligunt. Horum aliquot ad uigesimū, nō

E iij nullos

DE VICTV FEBRICIT.

nullos ad quadragesimū, & sexagesimū, & ad octuagesimum absolute fuisse terminatos scribit, quoniam uictu hos nutrire oporteat forsā quis dubitabit. Dum morbus uehementiam peracuti seruat, uictū peracuti morbi ministrabis. Cūq; mitior est aut intermittit omnino, ab intermissione numeratis duobus diebus, uictū ei mediū exhibebis. Hūc intelligo qui inter duos extremos medius est, quorū alter est uictus qui incohāti morbo conueniebat, alter est quē secunda dispositio exigit. Ut exempli causa si morbus tali incepit uehemētia ut uictus per pocula ei conueniat, nunc uero citra crissim mitior factus est, ita ut præsenti remissioni crassa conueniat sorbitio, duos à remissione dies spectabis absque uictus immutatione, ab ijs tenui sorbitōe hūc nutrias. Quæ media est inter pocula & crassam sorbitionem. Quod si secundum accidat, ad duos similiter dies uictum non immutabis. Post uero, crassa sorbitione hominem nutries ad dies septem. Quod si in ijs non redierit morbus, crassiorem cibum huic ministrabis, creticos semper præcauens dies. Horum partem ab Hyp. didicimus, nempe illud, duos esse expectandos dies absque uictus immutatione, nempe parem & imparē, ut in pri. de ratione uictus in acutis scribitur. Vbi ait sed maxime duos ab iudicatione dies &c. In cuius expositione Gal. ita scribit, tutum igitur est etiam si morbus iudicatus fuerit, ad duos usque dies diligentem uictus rationem qua eger usus fuerit seruare. Præteritis autem ab iudicatione duobus diebus iam securum est plenius cibare &c. Cum ergo in ijs morbis in quibus iudicium est

est factum duos observare iubeat dies parem & impar
rem ob timorem accessionum, multo causatius illud ob
servandum fore in ijs qui citra iudicium intermiserunt.
Reliquum discimus monstrante ratione.

CAP. XVIII.

SIC igitur victus formam à duobus inuestigandam
diffiniimus. Nempe à uirtus robore & à morbi con-
stitutione in qua duo comprehendimus, nempe morbi
dispositionem an peracutus an acutus, aut qui medio
loco est, & quando ad statum peruenturus sit. Facul-
tatis autem vitalis seruandæ cuius gratia nutrimus,
prout est in hora præsentis expulsi conijciendum robur
fore. Quale vero erit in posterum, ex habitu denso,
aut raro & ex humorum tenuitate aut crassitie, & ex
assuetudine, Ceterum per morbi constitutionem, seu
dispositionem, an peracutus, an acutus, & quando
maxime ad statum peruenturus sit intelleximus. Ad
id cognoscendum præcepimus quæ nam symptomata,
morborum singuli afferant considerare. Vt ex ijs an
ad quartum, aut ad septimum, undecimum, aut quar-
tumdecimum morbus terminari debeat sciamus. Ab
huius distantia victus formam inuenire docuimus. Ad
secundum Hyp. doctrinam in Aphor. secundum quod
status prope aut longe est victus formam inuestigan-
dam docet. Status autem distantiam non ex sympto-
matibus quæ morbus comitantur, sed ex signis coctionis
præcognoscere docet Gal. in libris de Crisibus, Præ-
terea ipse Hyppoc. ab eisdem coctionis signis morbum
breuem aut longum fore dicit. Vt sputum subrubeum 1. Aphor
E iij si sta-

DE VICTV FEBRICIT.

1. de ratio
ne uictus.
in acutis.

In d mor
bis uulga-
ribus pri-
mo.

1. de ratio
ne uictus.

2. de crisi-
bus.

*si statim appareat inchoatē abreuiat. Idem dixit ali-
bi, nempe quæ citius magisque madescunt, iudicatio-
nis denunciant celeritatem. Quæ vero tardius minus-
que, tardiozem significat iudicationem. Et alibi coctio-
nem dixit, velocitatem crisis & salutem certam signifi-
care. Loca præterea quæ citauimus Hyp. ad cognoscē-
dam termini distantiam, omnia crīsim spectant, & nō
morbi statum. Quod autem hæc duo differant, manife-
stum est. Si ergo à crisis distantia victus formam sume-
res, necessum esset, ut quanto proprius ægotans crisis
horæ accesserit, tanto subtiliorem victum ei ministres.
Et quanto longius, crassiozem: vt doctrina est Hypp.
at huius contrarium inuenimus ab Hyp. scriptum in
hæc verba. Et quanto maior fuerit expurgatio, tanto
magis ad crīsim usque dare oportet. Præterea in textu
immediate quarto loco præcedente, ita ait, nempe si
morbus siccior quam ut quispiam existimet fuerit, non
multum dare oportet, sed ante sorbitionem vel mulsā
vel vinum propinare expedit. Manifestum est ex loco
immediate citato, quod quanto morbus est siccior, hoc
est magis crudus, tanto longius à crīse distat. Et quan-
to humidior hoc est coctiois magis recipit, tanto pro-
prius accedit. Vnde ex ijs apparet secundum mentem
Hyp. victus formā penes crisis distātiā inuestigandā
non esse. Symptomata vero quorū mentionē fecimus
nempe inquietatio, vigilia, dolor capitis, & delirium,
omnia sunt signa crīsim indicantia; ut à Gal. scriptum
est. Porro institueram ijs supersedere quæ maiori otio
ad eorum exactam speculationem indigent.*

CAP.

VERVM ne in hoc soluendo nodo agitandi mentē
alicui detur occasio. Hac in re quod intellectus meus
capit referam, ne quid speculationi desit, ut obiter stu-
diosos in hāc inuestigationem prouocemus. Multa qui-
dem in desceptatione inuoluuntur quæ dissimilis sunt ra-
tionis & diuersa indigent oratione. Sed ut recta pro-
cedat disceptatio, Ciceronis insequar præceptum. Tri-
a sunt quæ incontentionem vocauimus, nempe statum,
crisim, & terminum morborum quem ex symptoma-
tibus præcognoscendum diximus. Notiones singulo-
rum præmittemus, ut sciamus de quo desputare in-
tendimus. Statum siue vigorem qui Grace *εὐμνία* dicitur
tur triplicem esse nempe etatum quo ad symptomata,
& statum quo ad dispositionem, & quo ad coctionē
materiæ. Primum maximum esse morbi, ut in sympto-
matibus scripsit Gal. Quod autem addidit præpositio
nem ut uoluit significare superlatiuum non ad mor-
bi dispositionē sed ad symptomatum magnitudinem
referendum; ut ipse apertius scripsit in espositione il-
lius circa principia & fin. & c. ubi ita scribit. Sym-
ptomata omnia circa principia & fines dicit esse im-
becilliora, nempe paroxismos febrium, vigilas & do-
lores fastidium, & sitim sicuti ipsas dispositiones in
quibus hæc fiunt apud statum necesse est meliores es-
se, in ijs qui seruari debent. Ex ijs manifestum est
secundum Gal. mentem, illud maximum morbi, non
esse ad dispositionem referendum, sed ad symptoma-
tum magnitudinem. Habent præterea singula affe-
ctio-

1. Aphorif
simorum.

2. Aphor.

DE VICTV FEBRICIT.

Elionum secundum varias dispositiones, sua tempora nempe initium incrementum statum & declinationē ut si febris sit, cum primum in uehementiam in anticipa- tionem & durationem addit, augmentum manifestum est. Cunque omnia maxime auēta sunt, statum. Decla- natio cum iam dicta imminuntur. Hoc colligimus a Gal. multis in locis tum precipue in expositione illius parosismos & consistentias &c. Quod si inflammatio sit, distinguntur tempora penes tumoris magnitudinis incrementum. Diciturque hęc temporum distinctio, quo ad morti dispositionem; ut ex Gal. licet colligere, cum ait in hunc modum. Ponatur igitur primum prin- cipium inquiri, quis negauerit generationem ipsius to- to illo tempore esse quo pars sanguinolenta substantia repletur, siue enim propter coincidentiam huiusmodi contigit, siue propter obstructionem omnium vasorum siue ob circumstantiam quandam tumorum in poris, siue ut nos docuimus in libro de inequali temperie, & in cōmentarijs de tumoribus præter naturam, abundā- tia sanguinis in particula consistit oborta flegmone, hoc erit primū tempus in quo impletur particula, ma- gnitudini affectus subiecta. Quando autem in fluxus cessauerit, & quod in flegminante particula contine- tur putrefieri inceperit, calor quidam ob putredinem nascitur, & fusio implens propter calorem ob quem spiritus generatur, ob hęc ambo magis quàm antea di- stenditur etiam si nihil influat, hoc secundum tempus est augenti flegmone. Porro cum in pus iam vertitur maximi sanē dolores tunc apprehēdunt. Circa enim ge-
ne-

In lib. de
4. morbi
tēporibus

Lib. de to-
tius mor-
bi tempo.

nerationes saniei labores & febres magis accidunt q̄ fa-
 Eta. Vocatur status affectiōis huiusmodi tempus. Si au-
 tem in saniem uersa uel resoluta fuerit, minorem tumo-
 rem & tensionem ostendit, principiū inclinationis hoc
 ipsum est. Distinguuntur etiam tempora penes mate-
 riæ coctionē, ut cum cruda est principiū sit. Cū uero
 signū incipientis aut debilis coctionis fuerit, principiū
 transisse scies, augmentumq; principiū sumere, cunque
 maxime coctio completur, statum esse. Cūq; cōpletæ,
 signū iam appareat statū præterisse significatur. Hæc
 omnia sunt de mēte eius in libris de crisibus & in libro
 de totius morbi temporibus. Vbi principium dicit esse
 cruditatē molestantium humorum quando coqui inci-
 piunt, principiū finire, secundū tempus quod incremen-
 tum uocatur accedere. Quando autem coctio ipsa ma-
 xime completur, status tempus esse. Deinceps declina-
 tio in qua cessare iam magnitudinem symptomatum et
 abundantiam coctorum scribit. Coincidunt hæc aliquā-
 do, nempe status quo ad dispositionem & quo ad sym-
 ptomata, ut in morbo laterali, in quo antequam screa-
 re incipiant, maxima tunc uigent symptomata & in-
 flamationis tumor maximus. Cūq; screare inceperint,
 utraque imminuuntur, & tumor & symptomata. Vt
 à Gal. scriptum est in hæc uerba. Sæpius autem adinui-
 cem coaugētur & coniunguntur symptomatum ma-
 gnitudines & dispositiones, & fiunt in ijs flegmonis,
 in quibus puseffluit quod iam confectum est, ut in
 uulneribus quibusdam fieri consuevit, & in peri-
 pneumonis & in pleuritidibusque. Quandoque di-
 uersis

In fine ter-
 tij de ra-
 tione ui-
 ctus.

DE VICTV FEBRICIT.

uersis contingunt temporibus uterque status dispositio-
nis & symptomatum. Vt ab eodem sumitur loco cita-
to. Ubi ita scribit, sæpe quidem dispositio ipsa secundū
quā infirmantur facilius est. Symptomata uero augen-
tur, quēadmodum in flegminantibus particulis ut ipse
dixit circa generationes saniei dolores & febres coin-
cidunt magis quam facta. Hæc ille, in quibus uerbis
uult, circa saniei generationem augmentum fieri quo
ad symptomata, quo tēpore dispositionē iam imminui
uidetur innuere. Dispositio autē secundum quā ille in-
firmatur, cum tumor sit præter naturam, hunc apud sa-
niei generationem iam imminui ostendit. cuius contra-
rium dixisse uidetur in libro de Totius morbi temporibus
loco iam nobis supra citato, quod tu considera. Ha-
bes ergo ex omnibus ijs, quod penes tria distinguuntur
tempora morborum, nempe penes morbum, eius cau-
sam, & symptomata. Cæterum quomodo huiusmodi tē-
pora in morbis misceantur, & quibus in morbis singu-
læ mixtiones accidant, infra tangemus, quantum ad ui-
ctus inuentionē opus fuerit. Gal. igitur in libris de Cri-
sibus, & in libro de Totius morbi temporibus penes co-
ctionem & cruditatem materiæ, tempora distinguere
uidetur. In libro uero Aphorismorum penes sympto-
matum magnitudinem. In tertio de ratione uictus se-
cundum dispositionem.

CAP. XX.

CRISIMO ὁ θυρόπον ἐν νόσῳ μεταβολὴν πρὸς ὑγίαν ἢ
θάνατον εἶναι, hoc est crisim subito uergentem esse in
morbo mutationem ad salutem, aut ad mortem, dixit
Gal.

Gal. i libro secundo Aphorismorū. Verum per Crisim Hip. multoties subitam intellexit morbi solutionē. Vt in libro de ratione uictus primo. Vbi Gal. in expositione per Crisim dixit, uel perfectā morbi solutionem, uel mutationē eā, quæ usqueadeo insignis sit, ut aeger periculum omne euaserit. Accipitur crisis nomen nonnunquam, ut utrunq; complectatur, nempe subitam mutationē & morbi solutionem. Et est quæ præcipue crisis dicitur, quod Gal. scripsit in hæc uerba. Eas igitur quæ cum magno & repentino certamine fiunt morborum solutiones, quas præcipue crises nominare dicebamus &c. Cæterum hæc tertia crisis acceptio, in perfectam & in imperfectam diuiditur. Primam morbi esse subitam solutionem cum effatu digna excretionem, & non modica huic antecedente in ægotantis corpore perturbatione. Secundam, cui à iam dictis unum deest, quod non integre à morbo liberat. Ita ut crisis perfecta bona subita sit morbi solutio, imperfecta bona, subita morbi diminutio. Has duas crises, perturbationes in corpore ægotantiū non modice, & effatu dignæ excretionem committantur. Totidem diuisiones in bonas & crises malas efficere licet, nempe perfectam malam ad mortē, eandem rursus imperfectā ad peius. Hæc omnia scito esse secundum mentem Gal. Crisim igitur prout est subita mutatio ad salutem uel ad mortem fieri, uatura separante à bonis mala, & ad excernendum preparante. Rationabiliter igitur in tali perturbatione grauius se habent laborantes, & maximis tunc efficiuntur symptomatibus. Quorum cum tres sint causæ, nempe natura,

3. de crisi-
bus cap. 7.

DE VICTV FEBRICIT.

2. de ratio
ne uictus.

In fine
pri. prædi
ctionum
& 2. Apho
rismorū.

natura, morbus, uel eius causa, & natura & morbus simul. Quæ morbum insequuntur symptomata *παθο-
συμπτωτικά*, id est symptomata per quæ morbus cognoscitur. Hæc in crescente morbo augentur & inclināte im
minuuntur. Quæ uero ab ipsa fiunt natura, dicuntur *απὸ φύσεως*, hoc est crisis symptomata. Quorum meminit Hyp. uarijs in locis, quod uero à natura fiant, Gal. docet in expositione illius hæc si ab initio non apparuerint, ubi ita scribit. Ergo quoties natura ad excretionē properat, effatu digna in corpore fit permutatio, ob quæ symptomata huiusmodi cū manifestissimis coctiōis signis apparent. Quæ tertio sunt loco symptomata, pugnam insequuntur naturæ morbificas debellantis causas. Prout pugna acerbior est, uehementiora fiunt symptomata. Cunque natura sua maxima ui ultimoq; conatu contra morbum pugnat, maxime & ultima fieri. Ad hoc tertium symptomatū genus reduncuntur dolores & febres quæ apud generationē fiunt saniei. Nā hæc à duabus contrarijs generatur causis, nempe à calore naturali coquente, & à præter naturā calore putrefaciente. Ut à Gal. scriptum est. Quod si ob sanguinis incensionem, dolores & febres fieri quispiam asserat, cunque perfecte incensum est residuum ipsius saniei fieri, quemadmodum incensis lignis cinerem, ob idq; dolores & febres sedari. Cedo sed si res exacte consideretur, huius incensionis causam non solam humoris putredinem esse, sed pugnam inter naturam coquentem & morbum putrefacientem inueniet. Cunque altero uincente cessat conflictus & pugna, remittuntur et sympto-

Symptomata. Remanent autem ea quæ saniei acutam qualitatem & particulæ tensionem insequuntur. Ob hoc dixit circa generatione saniei dolores & febres accidunt magis quam facta. Non enim ob aliud addidit Hyp. illud verbum magis quàm facta, nisi ut ob naturæ pugnam contra morbi materiam prouenire symptomata ostenderet. An non huius validum est argumentum id quod ijs contingit qui exitialiter laborant. Quidum natura vires habet ut contra morbum pugnet & eius incurfibus obstat, grauissima ferunt symptomata & labores. Cumque natura ex certamine uincitur, uidentur ab eo tempore minus inquietari, & aut grauissimis conflictari. ut ijs contingit qui obscuris & blandis & contrastabilibus desipientis laborant. De quibus. Hip. agit in primo prorrhethici. Ad hoc item genus reducuntur ea quæ in salubri morbo apud statum sunt symptomata, & febrium uehementiores paroxysmi, cū manifestissimis coctionis signis. Talia ergo symptomata, & febres non ob maiorem materiæ putrefactionem, sed ob maiorem pugnam inter naturam & morbum in obtinendo materiæ apparatus. De ijs alibi latius.

CAP. XXI.

TERMINVM quem supra posuimus uictus formæ indicem esse. intelligo, illum dierum numerum quibus ægrotantis robur morbi acumen & eius symptomata ferre possit, citra aliquā quattuor crisium à nobis supra descriptarum. Ut exempli causa si quis aliqua continentium febrium cum uigilijs continuis laboret æstate, iuuenis, calidi temperamenti. Conijciasq; ægrotan-

DE VICT V FEBRICIT.

ægotantem ultra septimum ferre non posse prædicti morbi uehementiã, citra aliquã quattuor crisium, nepe ad salutem, aut mortem, aut ad melius, aut peius, ut li ægotanti dies septem terminũ esse uictus formã indicantem dicimus. Sed de qua nam triũ acceptionum status intellexisse Hyp. asseremus in Aphorismo, cui iubet ægotantem considerare si sufficiat ad statum usque cum uictu necne. Et primum inquiramus an d statu quo ad materiæ coctionem intelligat. Quod esse rationes negant, nam status quo ad materiæ coctionem in nullo morbo certum nec definitum tempus habet, ut præcognosci possit. Finge Socratem salubri ægotare febris ut continua tertiana, triplici de causa non dabitur tibi ut præcognoscas quando potissimum, morbus hic in statu quo ad materiæ coctionem erit. Primo ob materiam morbi si diuersæ substantiæ sit, nam primo secundo & tertio die in subtiliorem laborante natura partem, iudicium facies de reliquo consimile. Et decipieris in status præcognitione & uictu inueniendo. Secundo ob vires laborantis quæ initio ualide erant, procedente autẽ morbo ob aliquam causam ultra opinionem imbecilliores fiant. Vnde grauis committitur error. Nam inter initia æstimato ægotantis robore morbi coctionem ad talem dierum numerum coniecisti, frustraberis quæ ob naturæ insperatam imbecillitatem. Tertio ob tempus quo natura uacat humorum coctioni. Nam si Socrati multum & crasse substantiæ cibũ ut comedat ministres, diutius immorabitur coctio, quàm si sorbitionẽ crassam offeras. Citius autem

autē si tenui sorbitiuncula dummodo uirtus ab utro-
que seruetur Socratem alas. Nam cū minus natura
in ciborum coctionē temporis expendit in morbi ma-
teriam operabitur quod reliquum est. Id maius est si
tenuem cibum quā si crassum exhibeas. Alia prae-
terea accedit ratio quod crasso uictu diutius immorē
tur coctiones eo, quod in morbi materiā fiat additio,
cūq; singulis diebus eius augeatur copia, opus naturae
minus praeualere necessum est. Tenui autem uictu hoc
non datur. Cū ergo pro uictus forma tēpus coctionis
immutari possit, qualiter à statu coctionis uictus for-
mā recte cōiungere possumus. Tan si super rē instabilē
edificia firma construere uelles. Profecto ridiculum
uidetur esse quærere, a, per, b, quod quidē immutatur
secundum à dispositionem. Insuper si ita esset, ut de
statu quo ad materiā coctionē intelligeret, inepte pro-
fecto ab Hyp. dictum esset, contemplari oportet agro-
tantem si sufficiat cum uictu ad statū ægritudinis, hoc
est ad id temporis cū maxime complentur coctiones.
Ad talem enim statum potestatis uictus nō est, ægrū
ducere. Quantocunq; enim crasso nutrias uictu agro-
tantem, continget multoties ut ad statū, eum non per-
luas. Nam natura fortasse morbo inferior est. Quot
sunt præterea ægritudines quæ ante coctionem agro-
tantes occidunt. Qualiter igitur sollicitos nos reddit,
admonens ut conijciamus si cū uictu sufficiat ager ad
statum quo ad coctionē, cū eo usq; ægotantem dura-
re, uirtutis robori, & morbi materiæ dispositioni, tri-
uendum sit, & non uictui. Alium igitur in illis teti-
git

DE VICTV FEBRICIT.

1. de ratio
ne uictus.

git statum uerbis, ad quem usq; agrotantem ducere
in facultate sit uictus. Iis fidem præstant quæ ipse ali-
bi dixit, ubi crassiorē uictum & copiosiorē ministrat,
quanto morbus ad coctionem festinat, magis uero te-
nuem quanto ab hac longius distat. Iis quidem contra-
riū in Apho. dixisset si de statu quo ad coctionē uer-
ba eius intelligantur. Cæterū dispositionis statum non
tetigisse ostendere opus non esse arbitror. Cū disposi-
tio per se nullum præbeat iuditiū nisi quatenus actio-
nes ledat. Quæ quidem læsiones symptomata dicuntur.
Nō immerito igitur nec magnus nec paruus morbus
dici potest, si læsionē actionum tollas. Neque enim ui-
ctum, neq; remediorum ullum afferas nisi recuperan-
darū actionum gratia. Nec dispositio ipsa per se nec
noxam, aut periculum, nec mortem, agrotāti afferet,
nisi interuentu læsarum actionum. Ad hæc non est
medicorum antiquorum ullus qui penes dispositionis
status distantia, uictus formam inuestigandam pro-
nuntiet. De statu igitur symptomatū uerba Hyp. in-
telligenda fore manifestum est. Iis fidē præstant que-
cunq; Gal. de morbi temporibus in Aphorismis secū-
dum mentē Hyp. scripsit, nempe statum esse maximū
morbi ut in symptomatib. Præterea in eo circa princi-
pia & fines omnia imbecilliora. Ubi declarat per illud
uerbum omnia imbecilliora, symptomata esse intelli-
genda. De principio etiam quod ad symptomata locu-
tus est in Aphorismis, cocta medicari & mouere non
cruda neq; in principijs, ubi aperte ostendit, per prin-
cipium morborū, aliud quam cruditatem humoris in-
tellexisse

tellexisse. Videturq; solum tempora distinxisse Hyp.
 penes symptomatum magnitudinis incrementum, ubi
 cunq; de principio statuue morborum sermonē facit.
 Cui opinioni adhærebit quisquis diligenti lectione illi-
 us euoluat scripta. Cunque de materia dispositione lo-
 quitur, crudam, imperfecte coctam, & coctā dicit, ut
 de urinis, sputis, egestionib. Cum vero principiū, aut
 statum scribit symptomatū meminit. Verum multo-
 ties per principium tempus usque ad tertium egritu-
 dinis diem intelligit. Ut constat per Gal. in espositio-
 ne illius, si uero in morbo uetere &c. Significat aliquā
 do principiū primū morbi insultū, quod latitudine ca-
 ret. Cuius meminit Gal. loco citato & in espositione il-
 lius, paroxismos & consistentias. Verum prout est
 unum ex quatuor morbi temporibus, symptomatum
 certam magnitudinem significat, prout incrementū
 potest suscipere. Verum uno loco videtur per morbi
 principium illud intellexisse tempus, in quo nondum
 existunt coctionis notæ, ut apparet in espositione il-
 lius hæc si ab initio morbi appareant &c.

C A P. X X I I.

CUM igitur ostensum sit per morbi vigorem, sta-
 tum quo ad symptomata intellexisse, superest conside-
 rare de quo nam symptomatum genere maxime sit in-
 telligendum. Quod nec de ijs quæ accepta feruntur
 naturæ quæ *ϕύση* dicuntur, nec de ijs, quæ a mor-
 bo & natura citra materiæ apparatus pugnantibus
 proueniunt, ab Hyppocra. licet elicere in expositio-
 ne illius, modi autem & constitutiones &c. Ubi mor-
 borum

i. prædi-
ctionum.

i. Aphor.

i. de ratio-
ne uictus.Lib. de ra-
tione vict.i. de mor-
bis uulg.

F ij

borum

DE VICTV FEBRICIT.

In de mor-
bis uulga-
ribus pri-
mo comē.
3.

borum modo refert, ab initio uehementissime incipiē-
tium. Quos Hip. ab initio florere ait, & uigere, pau-
latimque remitti ad iudicationem usque. Manifestū
autem st, quod ea quæ in morbis ab initio fiunt sym-
ptomata, non ob pugnam naturæ cum morbo ob com-
plendam coctionem proueuire, aut ob maximos eius
conatus cum materiam morbi extra corpus pellere ni-
titur, sed de ijs symptomatibus quæ morbum insequun-
tur, cum ad maximam perueniunt magnitudinem sta-
tum esse intelligere oportet in doctrina Hyppo. Qua
via haberi possit præcognitio maxime eorum magni-
tudinis consideremus oportet.

C A P. XXIII.

3. Prædi-
ctionum.

PROINDE duo sunt, quæ maxime finem magni-
tudini symptomatum imponant, ultimum resistentiæ
naturæ, & præfecta morbi materiæ coctiones. Causæ
si quidem, vigiliæ tanto durabunt tempore, quanto la-
borantis virtus ferre possit. Cum uero ultra non pos-
sit succumbit. Et sic fuit ea hora status quo ad sym-
ptomata, ob ultimam resistentiam naturæ. Quandoq;
increscunt, quousque natura, perfecta morbi coctione
crisim faciat. Ultima ergo naturæ resistentia, & mor-
bi coctio, symptomatum incremento finem imponunt.
verum cum multæ sint ægrotudines, quæ citra coctio-
nē in abscessus terminentur. ut Hy. ait in expositione
illius, qui tenuē crudāq; urinam diutius mingūt. &c.
Rationi consentaneum non est, ut per coctionis notas,
statū quo ad symptomata prænoscamus. Præterea cū
in superiorib. ostensum sit, tēpus cōpletæ coctionis in-
cer-

certum esse ob triplicē causam, æquum non est ab eo quod in se indefinitum est, uictus formam diffinire. A robore igitur ægrotantis, & à symptomatū magnitudine & uehemētia, statū cōiūciēdū esse putamus. Exēpligratia. Socrate laborante, mediocri febre acuta cū uiriū robore, cuius symptomata nō cessant, sed cōtinēter capitis dolore, uigilia, et siti, torquetur, morbi statum ad septimū fore diffiniam. Nam ad id temporis, Socratis uirtus feret prædicti morbi symptomata. Et non ultra, citra aliquam quatuor crisiū, ob quarum singulas symptomatū magnitudo imminuetur. Sis modo mecū, & perpende quā sit utilissima huius termini præcognitio. Cum sciam Socratis morbum ad septimum usque statum habiturum, & non ultra, talem uictus formā ordinabo ut Socratem ad septimum seruari possit. Præterea dabo operā, ut cōtiones ad id temporis compleantur, minus naturam cibo impediendo. Hoc enim scire magni est momenti, & tempus simul quo cōpleri oportet. Sic enim artificis cuiuscunq; artis cū aliquod agrediuntur opus, quod cito compleri oporteat, statim querunt quid agendum sit, et quāto tēporis interuallo. Iuxta quod totum in partes diuidunt opus, in totidemque temporis spatium, ita ut In diarias partes operam diuidant. Cūq; aliquid in diuisione errauerint, aut ob quamcunq; aliam causam minus cōpleuerint, id expeditiori diligētia ante præfinitum terminum suppleunt. Sic profectō in arte medica maxime necessariū est, præcognoscere terminum ad quem usq; ægrotantis uirtus morbi acumen ferre possit.

F iiij sit.

DE VICTV FEBRICIT.

fit. Ad quē terminum dirigendi sunt uictus. Talemq; præstabis, ut laborantē eo usq; seruare possit. Tum ut spatiū sit naturæ consciendi coctiones ad præfinitum terminum. Cūq; ex opera naturæ in primis quatuor diebus cōieceris, naturā posse ad septimum coctiones complere hominem seruandum esse scies. Quod si contrarium eueniat, moriturū in acuta ægritudine. Non solum igitur ad uictus intentionem utilissima est huius termini præcognitio, uerum ad partem artis, quæ prædicat, ualidissimus est totius prædictionis scientiæ neruus. Absq; quo nihil certo posses prædicere.

C A P. XXIIII.

U N D E nā cōiicias inquires quot dies is qui ægrotat morbi acumen ferre poterit. Diuinus nos docuit Hypp. in scriptis suis post longas, & diligentissimas, apud ægrotantes obseruationes adinuestigans. Acutas ægritudines dixit Hyp. in quatuordecim diebus iudicari, nō quod omnium acutarū crīsim in quartadecima die fieri uelit, sed crīsim acutarum ad usq; quartadecimā diem protrahi posse. Hunc terminū in acutis signauit. Non quia eo temporis interuallo coctiones perficere necessum sit naturam. Sed quia obseruauit quantūcūq; robusti hominis naturam labores acuti morbi ultra dies quatuordecim citra aliquā quatuor crīsim ferre non posse. Ob quā causam crīsim hunc terminū uocauit, ac si diceret crīsis futuræ terminū. Nec ob prætermentē Gal. est qui ita in eodē scribit. Quod sit necessarium ob morborum magnitudinē, ac symptomatum uehementiam, uel cito uires prosterne adeo

adeo ut homo moriatur, uel si ad excretionē humorū impetum faciat, & quos inuasit exuperet bonā sequi crīsim, si uero exuperetur malam. Propterea igitur inquit est impossibile, ut in longum tempus indicatio differatur in morbis acutis. Terminum igitur in hisce omnibus Hyp. posuit duarū septimanarum, tanquam nullus eorū ulterius progrediatur. Verū ante quartā decimā diem multi iudicari possunt. In quibus uerbis Hyp. dicto promotus Gal. terminū attigit, quē morbi acumen & uirtutis tolerantia diffiniunt. Quid aliud præterea uult cum in hunc modum scribit si quibus, inquit horū cæpit dolor die primo, die quarto præmūtur maxime, & quinto, ad septimū soluuntur. Quid nam aliud intelligit per dicta uerba, q̄ quod dictū est? nempe dolorem capitis uehementē & continuum, naturam ultra septimum citra aliquam quatuor crīsim ferre non posse. Ut melidia contigisse scribit. Ipse præterea deterrimas dixit febres ac signis affligentes difficilimis, quarta die aut citius interimere. Quantum autem ad prædictionem inuet, iam dicti termini præcognitio. Hypp. ostendit in hæc uerba. Screatione flaua non multo permixta sanguini in pulmonis morbo, si iter initia excernitur, salutaris admodū est, si septimo die uel tardius minus secura est. In cuius expositiōe, Gal. ita scribit, si uero screatione talis persistat qualis ab initio erat ad diem septimum, periculum imminet exolutionis uirium antequam morbus coquatur. Ob eam rem minus securum uideri dixit pluribus diebus permanere talem screationem. Idem adhuc aper

3. prædictionum.

In libro de morbis uulgaribus.

2. prædictionum.

F iiij tius

DE VICTV FEBRICIT.

tius de urina cruda, transactis aliquib. morbi diebus, persistente. De qua ita scripsit eodem libro. Si inquit multi tēporis sit morbus & urina talis persistat, subintellige cruda, periculū est, quod nō possit homo sufficere, quousq; coquatur urina. vides ne ex uerbis hyp. necessarium esse ad prædictionis scientiam, præcognoscere terminum ad quem usque, ferre possit natura laborantis, morbū & eius acumen. Et postea adhuc conferre coctiones, ut quod futurū sit præcognoscamus.

CAP. XXV.

MANIFESTUM igitur ex dictis est, statum de quo locutus est Hyp. in Apho. A quo uictus formam inuestigandam diximus, terminum esse ad quem usque, laborantis uirtus morbi acumen, citra aliquam quatuor crisiū ferre possit. Quia uero terminus hic symptomatum incremento finem imponit, status ab Hyp. nuncupatur. Et quia tempus futurae crisis longissimū complectitur, terminus crisis dicitur. Fiunt apud iam dictum terminum, maxima symptomata ob dictā causam, tum ob ultimos naturæ conatus. Potentiæ enim naturales necessitatem assumentes, fortius operantur, ut ostensum est in libris de facultatibus naturalibus. Multoties accidit ut morbi coctiones ad præfinitū compleantur terminū, tunc triplici ratione symptomata augentur. Nempe hoc statum symptomatum, tum ob uigentis coctionis rationē, tum ob crisiū. Simulq; tūc omnia tria symptomatum genera coincidere. Hoc in febribus continuis usu uenire cōperimus. Aliquando contingit ut fiant & compleantur ante dictum terminum

num coctiones, & solvatur morbus. Acciditq; hoc ob
materie morigerationē, aut ob uictum iusto magis te-
nuem. Ad primum spectat modum, quod dixit, simpli-
cissimas febres, ac signis firmatas securissimis, quarta
die aut citius desinere. Secundū attigit in Apho. ubi di-
xit contēplari igitur oportet ægrotantē, si sufficiat cū
uictu ad statū, et nunquid prius ille deficiat, nec possit
cum uictu perdurare, uel morbus ante deficiat, atque
obtūdatur. De laborantis robore, & morbi acumine,
facto iudicio, terminū coniecimus, ad quem usq; ægro-
tans morbi acumen citra aliquā quatuor crisiū fer-
re poterat, eo usq; ducere, uictum posse ægrotantem.
Quod si huic tenuem magis quam oporteat uictum
exhibeas, alterum duorum accidet. Aut ægrotantis
natura ob tenuitatē cibi allenata, diutius morbi cau-
sæ uacans, citius hoc est ante præfinitum terminum
coctiones complebit, & sic morbus soluetur ante sta-
tum, in quo maxima futura erant symptomata, mor-
busq; obtundetur, quod idem est ac hebetescat, hoc est
non perueniat ad ultimam incrementi magnitudinē.
Aut eueniet, ut coctiones cōplere nō potens natura,
imbecillis facta ob cibi tenuitatē, deficiat ante dictū
terminū. Quapropter, cum anceps sit euentus, cauen-
dum est ne magis tenuem exhibeamus uictum eo, qui
ægrotantem ualeat ap præfinitum terminum ducere.
Vocemus hunc uictum medium clarioris sermonis gra-
tia. Duo igitur cōsiderare oportet, quisquis tenuiorē
uictum medio exhibiturus sit, nempe utrum morbus,
an æger prius deficiat. In bene morigeratis morbis,
quorum

3. prædi-
ctionum.

DE VICTV FEBRICIT.

quorū materia parū à naturali symetria discesserit credendū est tenui uictu morbum & non uirtutem defecturam, ut infra latius ostendemus cū de febre flegmatica à dulci aut naturali pituita eueniente nobis sermo fuerit. In ijs enim natura ob cibi tenuitatē magis morbo incumbente, futuras coctiones ante præfinitum terminū sperabimus, ob materiæ morigerantiā. At in male morigeratis morbis quorū materiæ ualentis sunt affecta putredine, tenuiorē uictum medio ministrare caueto. Nam uirtus potius quam morbus ante terminum præfinitum quem deinceps statum uocabimus deficiet, materia nō cedente. Verum hoc tanquā uniuersale habeto dogma, uictū exhibere qui seruare ægotantem ad statum possit. Hoc tenuiorē non dabis nisi cum morbum defecturum, & non uirtutem ægotantis ante statum conieceris, hoc fiet si ante statū coquatur morbus. Hoc est quod Hyp. dixit cōtemplari igitur oportet ægotantem si sufficiat cum uictu usq; ad statum, et non quid prius ille deficiat nec possit cū uictu perdurare, uel morbus ante deficiat & hebetescat. Et dictis licet colligere, morbi statum, & terminum quem morbi acumen & uirtutis tolerantia definiunt & crisis terminum idem indicare. Hunc præcognoscendū ex ijs quæ morbus affert symptomata, & non ex signis coctionis. Nec id cū dictis Hyp. pugnat, cum dixit coctionē uelocitatem crisis & signum salutis certum portendere, neq; cum scripsit alibi, quæ citius magisq; madescunt iudicationis denuntiant celeritatē, neq; ijs quæ Gal. in tertio de Crisibus scripsit.

Aliud

In 1. de
morbis
uulgari-
bus.
1. de ratio-
ne uictus.

*Aliud. n. est crīsim ipsam inquirere, & crīsis terminū
nam crīsim utrū bona futura sit, & quando maxime,
ex coctionis signis conijciendam esse opinamur. Quia
naturalī ordine coctio semper expulsionem præcedit.
Terminus uero crīsis nō ex ijs, sed ex morbi ui & uir-
utis resistētia præcognoscitur. Primū per morbi sym-
ptomata, secundū per uirtutis robur cōijciemus. Hūc
ergo terminū tanquam immobilem & firmum, præco-
gnitione dignū esse, ut ab eo exhibendi uictus, & præ-
dictiōis scientia sumatur. Quod utrunq; adipisci po-
test facilius, cōiectura habita huius termini, ex dictis
manifestum est. Adhuc apertius illi fiet quisquis in
lectiōe Hyp. exercitatus fuerit.*

CAP. XXVI.

NEQVE obstiterit, si ab eo quod diximus termi-
no uictus formam summi conualituris pariter & mo-
rituris uictus rationem diffiniret Hyp. Cū tamen hu-
ius contrarium asserat Gal. cum ita scribit Apho. pri-
mo, quorū, inquit summū uigorem excipit mors, in his
ea solum artis parte quæ prædicat utemur &c. Neq;
igitur curationem, neq; uictus rationem ijs adhibere
consulit qui morituri sunt. Nōne hoc idem sequitur si
penes statum quo ad coctiones uictū diffinias, quot. n.
sunt, qui eo tempore quo maxime coctionis opus com-
plementum recepturum sit, e uita discedunt. Verum
si rem altius consideremus, haud quaquam profe-
ctō sapientissimi uiri autoritate dignum uidetur es-
se putare, solum hæc dogmata de ratione uictus scri-
psisse Hyp. ad eos quos seruandos esse certo sciamus.

Nam

DE VICTV FEBRICIT.

Nam cū ars medica nil certi prestare possit, cōtingit multoties ut felicia promittēte medico, moriatur infirmus, et aliquoties sanetur præter medici opinionē. Nōne hæc facile credibilia sunt, utpote cū nostra ætate plura horum exempla inter hominū conuentus adducātur. In quibus male audiunt medici. Quare crudelis hominis officio & nō medici fungeretur, si arti opem seruandis negaret. Prauā præterea concipiendi de arte medica opinionē hominibus ansam præberemus, cum ij quos sanandos artis remedijs sumpserimus moriantur, quibus uero de eorum salute desperātes nil remedij attulerimus, sponte sanentur. Quare Hypp. autoritate dignius est putare, hæc dogmata de uictus ratione, oībus tā qui euasuri sint, q̄ qui morituri tradidisse ægrotantibus. Atq; eo magis quod hæc artis medice pars, quæ uictū docet medicum ad quemcunq; euentū solet infontem reddere. Non si ea quæ de pharmacis agit, aut manualet docet operationē. Diximus in ijs quæ præcesserunt, à duobus uictus formā accipiendam, nempe à morbi cōstitutione, in qua status distantia cōprehenditur, et ab ægrotantis robore. Per statū terminū intelleximus, ad quē usq; ægrotantis uires morbi acūmē citra aliquā quatuor crisiū ferre possint. Principiūq; huius termini inuentionis dedisse Hyp. nēpe, cū per symptomatū differentias, et eorundē uehementias, singulis morbis suū diffiniūt terminum, ad quem usque incrementibus symptomatibus statum morbi esse, nisi cōtiones præueniant. Ob quarū causam morbum solui ante statum intellexisse Hyp.

Hyp. diximus. A dicto termino præcognito, victus formam inueniendam esse. Vnde si morbus ad quartum terminari debeat, sola aſtinentia, ſi ad ſeptimum potius, ſi ad undecimum tenui ſorbitione, ſi ad quartumdecimum crassa nutriendos eſſe ægrotantes. Ab ijs robor laborantium conſulendum, an prædicta victus formali ad præſinitum terminum citra magnū uirium detrimentum durare poſſit. Quod ſi tenui ſorbitione eo ſeruari non poſſe exiſtimemus, crassam miniſtrabimus; qua durare poſſit, eritq; hæc ægrotati medius victus. Tenui autem ſorbitione qua æger durare non valet non utemur, niſi cum ſenſerimus morbum defecturum ante terminum, & non virtutem ægrotantis. Idque contingere in bene morigeratis morbis, quorum materia parum à naturali ſymetria diſceſerit. In male morigeratis morbis, quorum materia valenti ſunt affecta putredine, tenuiorē victum miniſtrare eo, qui ægrotantem ad præſinitum terminum ducat, summæ cauendum eſt.

CAP. XXVII.

NEQVE ſilentio præter eundem, omniâque dicta ſunt, in ijs ſolummodo intelligenda eſſe morbis, qui poſteriorius ſtatum habituri ſint. Quique leuiter, & ſumiſſim incipiunt, ſub increſcunt vero, & exacerbantur ſecundum ſingulos dies, aut alternos, circa criſim uero abunde lucent. In ijs diximus a conſtitutione morbi, & robore ægrotantis, una cū ſtatus diſtancia, victus formam inueniendam eſſe. Verum ſcire oportet, morborum

DE VICTV FEBRICIT.

borum esse duos alios modos, qui diuersam victus rationem indicant, ac longe illi dissimilem quam hucusque tradidimus. Quam ob rem animum huc reuocato studio lector, quæ enim tibi dicenda paro, ad intellectum eorum quæ ab Hippoc. in libris de ratione victus, & in libro aphorismorum scripta sunt, maxime conducent. Ut aperte senis mentem percipias in ijs, quæ ad victus rationem attinent. Quæ quantam secum in artis opere utilitatem afferant, vel tu ipse indicare poteris. Status quantum ad symptomata attinet, tribus ægritudinis temporibus haberi posse scito, ut in morbi principio, nempe cum materia cruda est. Aliquando posterius, ut cum maxime complentur coctiones. Sunt & morbi qui inter medio tempore vigeant. Huius speculationis primus autor Hyp. fuit. Vir sanè intellectum maxime philosophico, diligentissimusque scrutator eorum quæ humano corpori accidunt. Hic igitur in primo de morbis vulgaribus tertio commentario ita scribit. Εἰσὶ δὲ τρεῖς καὶ κατὰ φύσιν καὶ παροξυσμοὶ τῶν τεύων ἐκάστη τῶν πυρετῶν ὁμῶς ξυνεχέων διαλείποντες. αὐτὰ γὰρ συνεχὲς ἐστὶν οἷσιν ἀρκόμενος ἀντὶ καὶ ἀκμάζει μάλιτα, καὶ ἀνάγει ἐπὶ τὸ χαλεπώτερον, περὶ δὲ κρίσιν καὶ αἷμα κρίσιν ἀμολιπύνηται ἐπὶ δὲ οἷσιν ἀρχεται μαλακῶς καὶ ὑποβρύχιος ἐπαναδιδόει δὲ καὶ παροξύνεται καθ' ἡμέραν ἐκάστῳ περὶ δὲ κρίσιν καὶ ἀμακρίσει αἷλις ἐξέλαμψεν ἐπὶ δὲ οἷσιν ἀρχόμενος πρὸς ἐπιδιδόει καὶ ἐπιδόει καὶ παροξύνεται καὶ μέχρι τινὸς ἀκμάσας πάλιν ὑφίπτοι μέχρι κρίσεως καὶ περὶ κρίσιν συμπίπτει δὲ ταῦτα καὶ γίνεται ἐπὶ παντὸς πυρετῆος καὶ ἐπὶ παντὸς νοσήματος, hoc est secundum veram uersionem, sunt modi, & constitutiones, et paroxysmi cuiuslibet harum febrium, similiter

ter continuarum, intermittentium, statim enim continua est quibus incipit floret, & uiget maxime, & d' difficilius ducit, circa crīsim uero & simul in crīsi minuitur. Sunt quæ, incipiunt leuiter, & summissim, subincrescunt uero & exacerbantur secundum singulos dies, circa crīsim uero, & simul in crīsi bunde lucent. Sunt quæ incipiunt leuiter, augentur uero, & exacerbantur ad certum augentes terminum, rursus remittunt ad crīsim usque, & circa crīsim. Accidunt hæc, & fiunt in omni febre, & in omni morbo. Hæc sunt Hyppoc. uerba, quæ ob id maxime expositione digna esse duxi. Propter, id quod statim subiungit, oportet, inquit ex horum consideratione offerre uictum. Triplicem in ijs uerbis designauit Hyppocra. modum aut differentiam quæ contingere possunt singulis morbis, & febribus. Aliquando symptomata, quæ morbum sequuntur, statim ab initio molestant, & grauiter torquent aegrotantem, augentur & increscunt et difficiliora fiunt, circa crīsim uero & simul in crīsi imminuuntur, hoc est cum morbi materia ferè cocta est, & perfecta cocta, quo maxime in tempore crīsis fieri solet. Hoc accidit in pleuritide, & peripneumonia, & in omni inflammatione, quæ in ijs corporis partibus fit, quæ ad motum à natura ordinata sunt. Hæc inquam à naturali motu magis perturbantur ob multitudinem materiæ & eius cruditatem. Quapropter huiusmodi partes cū inflammationibus corripuntur, inter initia, materia cruda existente, grauiora patiuntur laborantes,

DE VICTV FEBRICIT.

a. de ratio
de uictus.

tes, symptomata, & periculosa, quàm cum morbus
coctionem recipit. In omni præterea febre secundum
accessiones aut exacerbationes inuadente, cū à multa
ortum habet materia, aut nimis crassa, deteriora sūt
morbi principia. Cuius signum est illud quod Gal. ter
tio libro de Crisibus cap. ix. scripsit. Nempe in princi
pijs accessionū contingere mori ægrotantes ob multitu
dinem materiæ, & ob eius crassitiē, aut inflātionis
magnitudinem. Scis enim mortē semper in deteriori
parte paroxysmi fieri. Cū igitur ob dictas causas gra
uiores fiant accessionū principia particularia, manife
stum est, eadē ratione totius morbi uniuersale princi
pium fore deterius. Cūq; in pleuritide, aut peripneu
monia, morbus coqui incipit, minus grauat inflamma
tio mēbra spiritus, tū quia coctione leuior fit, tū quia
materia per habitū & per sreatū imminuitur. Quæ
causa sunt imminutionis symptomatum, et dolorū, ut
scribit Hyp. dolores, inquit pleuriticorū cōfestim spō
te designunt, ubi aliquid effatu dignū tum expui, tū
expurgari cæperit. In febribus similiter quæ ratione
multitudinis, aut crassitiei, deteriora sūt pricipia, cū
coctionis uestigiū in materia cōspicitur, & multitudo
imminui incipit, et crassities materiæ attenuari. Vt à
Galeno in libro de Totius morbi tēporibus scriptum
est. Aliquādo symptomata in initijs morborū debilia
sunt & parua, augentur indies et exacerbātur, circa
crisim uero et in crisi abūde elucē, hoc est eo tpe quo
maxime cōplentur coctiōes, in maxima sunt uehemē
tia. Fiuntq; tūc temporis grauissima symptomata, ob
duplicem

duplicem causam, ob materiae putredinē, & ob maximum certamen naturae cum morbo circa materiae dispositionē. Ad hunc modum reducitur quod dixit circa generationē saniei doloros & febres accidunt magis quam facta, accidit hoc in omni inflammatione, quae ad suppurationē peruētura sit, cuius materia multitudinis, & qualitate, mediae sit dispositiōis, ut in flegmone euenit cū ad suppurationem peruenit, grauiora tunc accidunt symptomata cū maxime complentur coctiones & fit sanies, quam ante actis morbi tēporibus. In febribus similiter quarū materia ad unam creticam seruatur expulsionē ut incontinuis, tūc grauiora fiūt symptomata cū maxime cōplentur coctiones. In summa ut iterū repetam, in omni morbo, in omni febre, ubi materia multitudine, aut crassitie, aut acri qualitate, & grotātis naturā grauiter molestat, inter initia grauiora fiūt symptomata. Et prout morbus coctionē recipit ita mitiora fiūt. Hoc modo plures febrium flegmaticarū & tertianarum & quartanarū multo magis quintanarū, inter initia grauius affligunt, & periculosiora sunt. Priuatim hoc accidit thoracis morbis ob partiū motum. Cum autem morbi à materia mitiori ortū habent, ut est sanguis, dulcis priuati naturalis melancholia, tū qui ex bile & pituita miscentur adinuicē humores, circa morbi initia omnia mediocriter se habent. Procedēte morbo augētur symptomata, tū ob qualitātē putredinalem magis auctam, tū ob maiorem pugnam inter naturā & morbum. Ita ut circa crisin & simul in crisi maxima fiāt ob dictas causas.

G

Tum

DE VICTU FEBRICIT.

Tum ultimo ob ea quæ crisis subitam mutationē insequuntur symptomata. Unde fit, ut omnia tria genera symptomatum in unū tempus coincidant. Nempe quæ à morbo, & quæ à natura, et quæ ab utroq; simul proveniunt. De hoc igitur statu in quo tria symptomatum genera coincidunt. Intelligendum esse Apho. nempe. Quando morbus in suo uigore constiterit, tum victu tenuissimo necessariū est uti. Ob id dixit Hip. circa crīsim & simul in crisi abunde elucet. Qualem victū in morbis qui huiusmodi statum sortiuntur ministrare debeamus, in superioribus diximus. Quādoq; contingit ut intermedio tēpore graviora accidunt symptomata cōmotionis humorū causa, hæc sæpius in augmento morborū fieri contingit, quā in principio, in quo immoti præstant in proprijs locis humores. Et q̄ in statu, utpote iam ferè facta separatione. Quæ ergo à vi morbi cōmotio fit, in augmento magis accidit, in quo adhuc pravi cum bonis mixti sunt, at quæ à natura fit commotio nō similiter est, nam facta coctione natura ut trīstantes expellat humores cōmotionem in corpore excitat. Secundū igitur hanc triplicē considerationē, nempe an status quo ad symptomata, inter morbi initia, materia adhuc cruda existente eueniat, aut cū maxime cōplentur coctiones, aut intermedio tēpore, inquiredo victus fore laborantibus salubres. Quare à triplici status consideratione, triplex victus eliciendā est ratio. Alia enim habenda est, cum morbus inter initia statum habet. Alia cū eo tempore quo maxime complentur coctiones. Et demum alia cū intermedio tempore

tempore viget. Longe enim differunt victus qui horū singulis conueniunt. Horum trium modorū considerationem ad victum maxime necessariam, primus Hyp. tradidit. Primi modi meminit in libris de ratione victus. Vbi sub exemplo pleuritidis & peripneumoniæ de omnibus qui à principio florent, & statim vigent morbis, ad crīsim vero mitiores fiunt, agit.

CAP. XXVIII.

IN ijs igitur morbis, victus formā non à distantia status ut supra diximus, sed à coctione morbi summandam esse. Ita ut cum morbus crudus omnino est, tenui aut tenuissimo uti victu oporteat. Cum autem coquitur plus concedendū, & iusta maiorē coctionem, magis ministrandum. Primum ostendit Hyp. cum dixit nempe si morbus siccior quā ut quispiam existimet fuerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitionem uel mulsam uel uinum, utrum magis auxiliaturum putaueris propinare conuenit. Manifestum autem tibi est ex ijs quæ supradicta sunt, pocula, victum tenuissimum constituere. Secundum ostendit in ijs quæ sequuntur verbis, ubi ita ait. At si os madescat, & quæ à pulmone expuuntur, talia sint qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem ut dicam summatim augere cōuenit. Nempe quæ citius magisque madescent indicationis denuntiant celeritatem. Tertium similiter ostendit cū statim scribit, & quanto fuerit expurgatio maior, tanto magis ad indicationem usque dare oportet. Neque id præter rationem est, nā in huiusmodi morbis qui ab initio uigent, grauiora inter initia accidunt symptoma

r. de ratione victus.

G ij ta.

DE VICTV FEBRICIT.

ta. Ob materiae cruditatē, aut multitudinē, aut a crem
 qualitātē, utrunq; autem coctione cum euanescat, ut
 supra ostendimus de mente Gal. in libro de totius mor
 bi tēporibus, fit, ut à coctione materiae, uictus formā,
 & quantitātē mutandas fore nemo nō arbitretur. Id
 quod ipse Hip. ostendit statim, ac si formae uictus mu
 tationis rationē reddat. Dolores siquidem, inquit pleu
 riticorum confestim sponte desinunt, ubi aliquid effa
 tu dignū tum expui, tum expurgari cœperit, nempe
 & purgationes longe perfectiores existunt, minusq;
 purulenti ita fiunt, quā si quis aliter cibaret. In omnē
 ergo morbo in quo procedens coctio symptomata mi
 tiora reddit, ab ea uictus ratio summenda est. Item ui
 ctus forma & quantitas ad maius mutandae sunt. Ita
 ut toto eo tempore quo materia cruda est, una uictus
 forma nempe tenui aut tenuissima alendus sit æger.
 Cūq; in materia coctionis manifestū signū appareat
 crassior uictus exhibendus est. Secundi aut modi me
 minit in Apho. ubi docet uictū inuestigandum secun
 dum status distantia, & morbi constitutionē, de quo
 diffuse in superioribus dictū est. Hac igitur de causa
 Hip. in libris de ratione uictus, coctionis meminit ad
 uictus formā inueniendam. Meminit & quandoq; sta
 tus, ut in Apho. libro obscure nimis prædictos modos
 attingens, ut scopos ad uictus inuentionem. Quod ma
 nifeste apparet ex ijs quæ Gal. scripsit, omnia quæ ab
 Hip. dicta erant de ratione uictus repetens sub com
 pēdio, ubi ita scribit, meminit quoq; & coctionis mor
 bi sæpe, non parū scopum uniuerſi uictus & quæ in
 ipso

In fine
 tertij de
 ratione ui
 ctus.

ipso fiunt mutatiouum hunc faciens. Pari modo & de morbi uigore quippiam dixit, ad quem respiciēs neq; tanquam ad abiectissimum in uictus ratione scopum, alimoniā ministrat. Hæc quidē scripsit Gal. de coctio- nis scopo, non ostendens in quibus morbus ad uictū in ueniendum respicere eam debeamus, & quibus morbi statū. Hæc igitur omnia & singula diligenter in mor- bis aduertere oportet. Et has tres morborum differē- tias, aut modos, in singulis morbis à natura & habitu nostro fieri posse. Vt prudentissima tetigit Hip. in eo neq; n. horum uideo, ita expertos medicos &c. Qua- propter considerandā esse ægrotātis naturā, & habi- tum, nā picro cholorum natura talis est ut febrīū ini- tia deteriora efficiat. Qui etiam natura frigidi sunt, exilium uenarū, crasso habitu, pingui ab domine, pr æ- terea corporis nostri partes ut septū, pulmo, & gut- tur similiter habent. Biliosi mediocri habitu quicūq; sunt & sanguinei & hepar, hæc magis propè crīsim exaciūt. Hoc est profectō qđ Hip. loco citato dixit, quæcunq; nostra natura et habitus singulis in morbis fabrefaciat affectus & species omnigenas quæ cogni- ta salutē & mortē, ignorata ferant. Sed forsā quis dubitabit causam ob quā in Aphorismorum libro in quo uniuersalia uictus dogmata collegit, secundæ mor- borū dispositionis qui inter initia uigent nō meminit. Vt in ijs suā uictus rationē doceret. Quinimmo quicū- que scripta Hip. peruigili & nō tumultuaria lectione euoluat, sex de uictus ratione Aphorismos consequē- ter scriptos inueniet. Ab ijs septimus sic habet qui-
G iij buscunq;

In 2. de ra-
tione ui-
ctus.

DE VICTV FEBRICIT.

buscunq; quidem igitur statim status est tenuiter dictare conuenit. Quibuscunq; status postea ad illud & ante illud parū, auferendum, prius uero uberius reficiendum ut sufficiat ægrotans. Cū attente legeris eos qui hūc præcedunt Apho. de uictus ratione inuenies, breuitatē sermonis Hip. & eiusdem sententiatū grauitatē septimum Aphorismum tanquam superfluum nō admittere. Si de ijs quæ dixerat intelligatur. Præterea si de ijs morbis ageret qui ob ultimos labores statim uigēt & crisim habent, tenuissimo eos uictu ut antea dixerat & non tenui scripsisset indigere. Aliū igitur tetigit statū, qui ita uehemens nō sit, quē plurimi morborū inter initia obtinēt, quiq; durat donec materia morbi cruda est. Nam cum symptomata quæ inter morbi fiunt, ob solam materiæ multitudinē, aut crassitiem, aut humoris acrem qualitātē eueniat, & non ob cōmotionem naturæ ad expulsionem parantis tristantes humores, neq; ob maximam pugnam naturæ coquentis cum morbo putrefaciēte, ut eo fit maxime tempore quo cōplentur coctiones, fieri nequit ut sint uehementissima & ultima. Prout ijs contingit morbis qui tūc maxime uigent, cū duo aut tria symptomatū genera coincidunt. Verū quia in morbis ijs qui inter initia uigent, quibusdā uehementiora contingunt symptomata & periculosiora, ita ut eorū ratione tenuissimus uictus adhibendus esset, quibusdam uero minus uehementia & periculosa, ita ut tenuis uictus ijs cōueniens esset, prudentissime Hip. ijs morbis tenuē uictū ministrandum docuit in Apho. cum ait
qui-

quibuscunq; igitur statim uigor est tenuiter diutare
conuenit. Quibus uero posterius debet consistere, in ipso
consistendi tempore & parum ante illud cibus subtra
hendus. Prius uero uberius reficiendum, ut æger suffi
ciat. Quibus uerbis de eo morborum statu agit, qui in
eo maxime fit tempore quo conficiuntur coctiones.
Duos ergo prædictos modos tetigit morborum Hipp. in
dicto Apho. à quibus uictus rationem inuestigare do
cuit, breuissime quidē ut solet. Cum ergo symptomata
periculosa & uehementia inter initia sunt, ut in an
gina, & pleuritide morosa, tenuissimo uictu dum ma
teria cruda est utemur. Prout ipse monuit in libro de
ratione uictus. Quod si aliter eueniāt tenui uictu uti
sat erit. Nam cum talia symptomata eo usque durēt
quo ad coctionem materia recipiat, idq; non una die
sed multis fortassis fiat, cōsulte non ageretur, si tenuis
simo uictu toto eo uteremur tēpore, quo materia cru
da permanet. Repentinas præterea mutationes dete
statur Hip. sub ijs uerbis, nec repente quicquam huc,
uel illuc, mutare in toto negotio licet. Quapropter
homine hesternæ die, solido cibo uso, omnimodam ine
diam hodie iniungere, conueniens non est, ubi corpo
ris dispositio maximo interuallo, à naturali non disces
serit symmetria. Quod in solis peracutis & ultimis ac
cidit morbis. In ijs rationabile est ut uictus similiter
maxime distet ab eo, quo bona usus est ualitudine. Ob
id prudenter dixit senex mutare quidem bene habet,
si recte transferatur.

2. de ratio
ne uictus.

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. XXIX.

Cæterum quia non facile est cuilibet ea quæ dicta sunt percipere, neque percepta ad opus deducere, omnes de statu, quas hucusque percurrimus speculationes. Ad indicationem unam in maximum studiosorum commodum reduximus. Scimus enim hominum mentem paucis satiari. Qua propter omnia quæ hucusque de victus forma diximus, secundum mentem Hyp. faciliori, magisque compendiosa via trademus Paruo siquidem pondere gaudet hylas. Totum ergo huc studiosè lector animum reuocato. Scire aut oportet, virtutem & morbum aliquando non, & quandoq; parum, nonnunquam multum, aut quam maxime urgere. Horum singula cognoscere medicū oportet, hoc modo. Virtus tunc maxime urget, cum prope syncopin est. Quod ex pulsu, & facie certissime deprehendere poteris. Multū urget, cū egrotans ijs perturbatur symptomatibus, quæ syncopin solent inducere. Talia sunt ventris crebra deiectio corpus absumēs, sanguinis fluxor immodicus, incessantes sudores. Multū præterea tūc dicimus urgere uirtutē, cū in ijs quæ a uoluntate fiūt actionibus multū deficere egrotans videtur. Sed diligenter considerare oportet, cum ab ijs iudicium imbecillitatis naturæ simus facturi, ne ob morbi acumen in huiusmodi imbecillitates deueniant laborantes, & non ob venarū inanitionem. Quod à rationaliū medicorū principe Hyp. scriptum est, in hæc verba. Ingens si quidem malū est, si ob laborem, morbiq; acumen, imbecillitato, porrexerit quis potum vel sorbitionē copio-

Li. 2. de ratione vict.

piofiozem, uel efculentum, imbecillitatem eam ex va-
forum inanitione contigiffe arbitratus. Neque fanè ca-
lumniam effugere poteft, qui ægre ualentem ex uafò
rũ inanitione, non cognofcit, torquetque diætã. Diligẽ-
ter ergo obferuare oportet; naturæ imbecillitates, an
ob inanitionẽ uenarũ fenfibilẽ, aut fenfui occultã, aut
ob morbi acumen eueniant. Cum ob uenarũ inanitionem
fenfu perceptã, aut occultã, imbecillitates fiunt,
multum tunc uirtutem urgere putãdum eft, nõ ita ue-
ro ob morbi acumen. Vtrunque autem difcernere à
nullo alio quàm à pulſu certius poſſis. Non ex eius
magnitudine, utraque enim diſpoſitio paruum efficit
pulſum, uerum ex diſtentione & contractione, id per-
cipi licet. Pulſus ſiquidem eorum qui ob morbi acu-
men imbecillantur, parum diſtenduntur, quaſi pun-
cto digitiũ feriant, feſtineq; contrahuntur, ac ſi intro
ſurripiantur. Eorum uero qui ob inanitionem uenarũ
inualidi fiunt, longe aliter habent, ita ut qui uis illud
diſcognoscere poſſit, ſi incognitione pulſuum mediocriter
ſit exercitatus. Aut. n. & quales faciunt contractioni-
bus diſtentiones, aut has quidem maiores. Hoc quidẽ
magni facere oportet. Nam non ſolum ad uictus inuẽ-
tionem, uerum ad eam artis partem, quæ morbos cu-
rat maxime ualet. Parum uirtus urget, aut ratione
ætatis, ut cum puerulus, aut ſenex inſirmantur. Aut
cum corpora rara, & tenuium ſuccorum, febris cor-
ripiuntur. Vbi præterea irritantia adſunt ſymptoma-
ta, ut pruritus ingens, tenaſmon, morſus quẽ acris hu-
mor in vētriculo, aut inteſtinis parit. Vigilia, ira intus
com-

DE VICTV FEBRICIT.

In 2. de ra-
tione ui-
ctus.

compressa, mæror, & similia quæ cōmuni proritatio-
nis nomine comprehenduntur, Ut in expositione illius
de mutatione, quæ in hæc uel illa &c.

CAP. XXX.

MAXIME urgere morbum dicimus cum ultimos
affert labores. Hos esse intelliges cum symptomatibus
coniuncta est inquietatio, & angustia. Tunc multum ur-
get, cum aliquod affert seuum symptoma, ut continuas
uigilias, aut perpetuum soporem, aut comam, aut fortem
capitis dolorem continuum, aut difficilem anhelitum, de-
lirium, aut cum urina supprimitur, aut aluus nimis ciet.
Parum urget, ut cum sitim patiatur, aut cibos ualde fasti-
diat, aut si præter modum astricta sit aluus. Aut cum
ea successiuis temporibus patiatur symptomata, quæ
morbum multum urgentem reddere diximus. Quando
igitur maxime urget uirtus, id exhibendum fore præ-
cipimus, quo maxime laborantis natura seruari pos-
sit, quamuis illud morbus prohibeat. Nam uirtutis ma-
xime urgentis indicatio, eam quæ à morbo suppedita-
tur, obscurat indicationem, quanquam morbus maxime
tunc urgeat. Nonne hoc à Gal. rationalium medicorum
summo concessum est? in Aphorismis. Vbi ita scribit,
quo circa aliquando in ipso morbi uigore, ubi sympto-
ma aliquod interuenerit robur naturæ dissoluens, nu-
trire cogimur. Sciendum præterea has uictus formas sibi
proximas esse. Nempe quæ comeduntur, sorbentur, et
bibuntur, & in mediam. Ita ut inter has aliam intermediam
uictus formam inuenire nequeas. Præterea, uirtus pro
sui custodia illum maxime cibum indicat, quæ coque-
re, &

re, & digerere & (ut oportet) apparare possit. Quo
fit ut cū uirtus multum imbecillis est, uictū per ea quę
comeduntur non indicet, quandoquidē difficilioris co-
tionis est. Sed sorbitiones aut potus. Morbus præter-
ea maxime urgens ex sui ratione omnē cibum probi-
bet. Manifesta hæc omnia sunt & à rationalibus con-
cessa medicis præcipue Hip. & Gal. Ponamus igitur
primū, maxime morbo urgente, non urgere ægrotātis
uirtutem, quænam uictus forma huic conueniet, sola
inquā inedia. Nā uirtus nō dissuadet id quod morbus
maxime urgēs indicauit. Tandiuq; hæc uictus forma
seruanda est, quādiu uirtus & morbus ita habuerint.
Secundum, quòd si idem uirtutis robur cū morbo mul-
tum urgente coniungatur, uictū per pocula exhibebi-
mus. Nam si uehementissimo morbo aut maxime ur-
gente ad proximā differentiā, quæ sensu percipi pos-
sit, descendas, quem alium quàm ualde acutum mor-
bum, aut multum urgentē intelliges. Quod si consimi-
liter ab inedia ad uictum, qui eidem tenuitate sit pro-
ximus, ascendas, quem alium quàm per pocula uictū,
magis tenuem inuenias? cum ergo morbo maxime ur-
gente inediam solam ministremus, uirtute non dissua-
dente, manifestum est, quod cum morbus proxime à
uehementissimo degenerat, uictum inediæ proximū,
ministrandū fore. Nec ad id recte inueniendum opus
est similes seruare proportionēs, inter uictus, ac inter
morbos. Ars enim medica, res nō prout à natura sunt
considerat, sed ut sensum immutant, Cū ergo à morbo
maxime urgente morbus multum urgēs, & inediæ ui-
ctus

DE VICTV FEBRICIT.

Etus per pocula proxime abesse sensu percipiantur, re-
 te colligitur uictū per pocula morbo multum urgen-
 ti, uirtute nō dissuadente conuenire. Simili ratiōe col-
 liges, uirtute similiter habente & morbo parū urgen-
 te, sorbitione exhibendas esse, uerū cum inter sympto-
 mata, quæ morbum multū urgentem reddunt, & ea
 quæ parū, medio sint loco symptomata sensu perce-
 ptibilia, quæ manifesta ab alijs discerni possint, nō im-
 merito inter morbos parū & multum urgentes, me-
 dia uehementiæ morbus collocabitur. Diximus autem
 supra fortē capitis dolorem continuum, delirium, dif-
 ficilem anhelitum, uigilias pepetuas, aut soporem, cō-
 mata, urinæ suppressionē, & similia, cum una perma-
 nent uehementia symptomata esse quæ morbū multū
 urgentē efficiant. Hæc eadem si successiuis fiant tem-
 poribus, ita ut modo sint, in crastinum omnino euane-
 scant, morbum parum urgentem constituunt. Quod si
 hæc eadem cum à sua desistunt uehementia nō omni-
 no euanescere intelligas sed solum remitti, medij acu-
 minis morbum constituent, & mediocriter urgentē.
 Cum ergo morbo multum urgenti, nihil quæ urgente
 uirtute pocula exhibenda fore ostenderimus, fit, ut si
 ab huius uehementia proxime morbus degeneret, diffe-
 rentia sensu perceptibili, morbus quē nūc diximus, me-
 dij acuminis succedat. A poculis similiter si abscedas
 ad proxime crassiorē, tennes esse sorbitiones, indicāte
 sensu, comperies. Ostensum igitur tertio est, quod cū
 uirtus similiter habet, et mediocriter morbus urgeat.
 sorbitiones fore ministrandas tennes. Tum quarto,
 quod

quo d cū parum urgeat, crassas. Simili rōe quinto, cū morbus omnino nō urgeat, uirtute similiter habente, uictū exhibendum fore per ea quæ comeduntur. Ponas rursus sexto, quod uirtus parū, & morbus maxime urgeant, quem nā alium huic ministrabis uictū, q̄ uocula, si recte ea quæ dicta sunt percepisti. Nā ab eo quod primo ostendimus, simili uia deduci potest. Septimo, stante eadē morbi uehementia, uirtus si multū urgeat, tenues sorbitiones fore ministrandas. Sciendū plures horum qui ita habent interire. Octauo, morbo multū urgente, uirtus si parū urgeat, tenues dandas esse sorbitiones. Simili modo ab eo quod secūdo ostendimus loco, manifestū est. Nono, uirtute multū urgente, stante eadem morbi uehementia, crassas. Decimo, morbo mediocriter urgente, uirtus parū si urgeat, crassas quoq; ministrādas fore sorbitiones. Undecimo, qđ si multū nrgeat uirtus, stante eadē morbi uehemētia, quæ comeduntur, si ea coquere laborantis natura possit. Cum. n. uirtus multū urget, nō solum tunc morbus tenuē uictū indicat, sed uirtutis imbecillitas tanquam secūda causa tenuitatis accedit. Duodecimo, cū morbo & uirtus parū urgeant, uictus per quæ comeduntur exhibendus est. Quod ex ijs quæ quarto ostendimus loco perspicuū est. Tertiodecimo, morbo parum urgente, uirtus si multum urgeat ea quæ comeduntur.

CAP. XXXI.

ET ut in promptu horum singula lectori fiant, in tabellam ea hic reduximus, ut facilius memoria teneri possunt.

uirtus

DE VICTV FEBRICIT.

f g h i

		virtus non urgens	virtus pa- rum ur- gens.	virtus mul- tum.	virtus ma- xime ur- gens.
a	morbis maxime	obstinen- tia. ⋈	pocula	tenuēs sor- bitiones.	victus quo maxime seruare possit.
b	morbis multum	pocula	tenuēs sorbition- es	Crassas sorbition- es	quo maxi- me seruari possit
c	morbis mediocri- ter	tenuēs sor- bitiones	crassas sor- bitiones △	quæ come- duntur	quo maxi- me seruari possit.
d	morbis parum	crassas sor- bitiones	quæ come- duntur ☀	quæ come- duntur	quo maxi- me seruari possit.
e	morbis non urgēs	quæ come- duntur	quæ come- duntur	quæ come- duntur	quo maxi- me serua- ri possit.

Cæterum

Ceterum nosse oportet, eorū quæ comeduntur multiplicem esse differentiā, ita ut hæc difficilis sint coctionis, facilis illa, uirtute igitur multū imbecilli existente, si uictū per ea quæ comeduntur exhibeamus, danda est opera ut ea quæ leuioris sint coctionis, ministremus. Finge igitur hominem continua febre laborare, quæ singulis alternis diebus fortior euadit. Ita ut & capitis dolorē et uigilias accessionis die patiatur. Die uero intermissionis omnino cessent. Laborās ipse adolescens, gracili habitu, calida & sicca tēperatura sit, tenuiū succorū, qui citra læsionē una die abstinere nō possit. Morbum ex notarū concursu parū urgere scito. Similiter & uirtutē ob rarū habitū. Nam hmōi hominum cōpagines facile à morbificis causis soluuntur. Morbum igitur sub signo, d, uirtutē uero in, g, inuenias. Quare cōmunem angulum utriusq; lineæ coincidentis quærito, sub hoc signo \odot , ubi scriptum inuenias, uictū per ea quæ comeduntur huic fore cōuenientem. Talemque tandiu exhibebis, donec & uirtus & morbus ita habuerint. Sed finge post dies tres, prædicto iuueni symptomata et febres auctata fuisse, ita ut die intermissionis non euanescent, sed utcunq; remittantur, uirtus uero ut ante sit morbum sub, c, quærito, locumq; cōmunem sub signo Δ , ubi crassas reperiēs forbitiones, quas iuueni ministrabis. Sed non solum hoc modo uictus ratio prout toti morbo conuenit habetur. Verum prout particulari accessioni. Nam ut plurimū ab initio paroxysmorum ad inclinationem inchoantem, anguntur laborantes et inquietantur. Nō seruantes

DE VICTV FEBRICIT.

seruantes unā decubitus formam. Cū uero declinatio incipit, & uno permanēt loco, malum tolerabilius ferunt. Cū igitur hac ita habeant, maxime urgent morbi ab accessionum initijs ad statum usq; Virtutes uero laboratiū ut plurimū nō urgēt per id tēporis. Paruo siquidem tēporis interuallo exolui uirtus non potest. Quapropter cū toto tēpore ab initio ad statum morbus sit sub, a, laborantis uirtus sub, f, locus cōmunis sub signo Ψ, ubi scriptā omnimodam abstinentiā inuenies. Qua, rationabiliter in initijs paroxysmorum ad declinationē usq; rationalium medicorū summus Hip. utendū fore in accessionibus monuit. Verū quod ad particulares accessiones spectat. Sciendū uirtutem nisi cū maxime urgeat, nihil urgere. Nam & si multum urgeat, pro eo tamen tempore quod ad paroxysmi inclinationis initium finitur, uirtus non urget, nisi cum maxime urgeat. Vnde fit, ut cum prope sincopin fuerit, aut iam animi deliquio capiatur egrotans, cibum ei ministrandum fore. Quo uirtus seruetur, & si hora scūientis sit paroxysmi. Sed singulas nostræ tabellæ partes secundum senis sententiam esse ostendamus. Morbum maxime urgentem omnimodam exposcere inedia, uirtute non dissuadente, quod ostendit in eo Apho. quem supra citauimus, ubi igitur peracutitas morbus est, & statim ultimos labores habet, extremo tenuissimo uictu, necessarium est uti. Quem aliū rationabilius maxime urgere morbum dixeris, quam eum qui ultimos affert labores, cui extremo tenuissimum uictum conuenire ait, quem supra cum Gal. omnimodam

omnimodam sumus in eadem interpretati. Idem apertius scripsit commentario secundo de ratione uictus, ubi ait, nec cum morbi uigent feruoremque habent cibum dare. Secundum: morbo multum urgente, pocula fore ministranda. Quod in primo de uictu acutorum scripsit in eo, postea si dolor, uel periculum aliquo comparuerit, sorbitionem dare oportet, nec multam, nec crassam, sed post septimum, aut nonum si ualidius sit. Vbi per id uerbum si ualidus sit, uirtus nihil urgentis indicationem addidit. Idem paulo ante apertius dixit, ubi dolor aliquis uexauerit, oximeli bibendum dabis. Manifestum est per hos dolores, non esse eos intelligendos, qui secundum accessiones ægrotantes torquent, sed de ijs qui assidui sunt, & ab inflammationibus ortum habent, qui morbum multum urgentem reddunt. Vt manifestum ijs est, qui in libris de ratione uictus exercitati sunt. Sed ne tempus teratur in singulis locis citandis commodius fuerit ita rem ostendisse, ut facile cui uis sit, reliqua ab ijs quæ dicta sunt colligere. Ostensum est secundum Hip. mentem, morbo maxime urgente, inedia, multum uero urgenti, pocula competere. Cum ergo ab eodem tantum fore condescendendum uersus crassiorem uictum, quantum morbus mollior fuerit ultimis. Morbo igitur mediocriter urgente, crassiorem competere uictum, quam multum urgenti, cunque uterq; morbus, & qui multum, & qui mediocriter urget sibi proximi sint uicinitate, manifestum est tenues huic sorbitiones exhibendas fore secundum Hip. mentem. Nam post pocula, crassior proxime uictus tenuis sorbitio est. Pa-

H


rum uero urgenti crassas, non urgenti uero ea quæ comeduntur. Quapropter eos qui morbo non urgente laborant, si sorbitionibus aut poculis nutrire uelis, non leuiter peccabis. Quod à sene aperte scriptum est, in eo Apho. qui incipit, uictus tenuis atq; exquisitus, in morbis quidem chronicis semper, & in acutis quibus non conuenit, falax. Manifestum est, morbos quos chronicos uocat symptomata non adducere quorum ratione morbus urgeat. Sed nec febris continuitatem chronicum morbum admittere. Nam hæc eadem continuitas febris morbum acutum constituit, ut autor est Hip. & Gal. in libro prædictionum. Tenuem ergo uictum quæ supra secundum Hip. sententiam in libro de prisca medicina sorbitiones crassas interpretati suimus, & per exquisite tenuem tenues, morbo chronico tanquã nõ urgenti non competere manifestum est. Hucusque ostendimus, secundum senis sententiam qui conueniant uictus, ijs qui maxime, multum, mediocriter, parumque, & nihil, urgent morbis. Verum in ijs uirtutis tanquã non urgentis scopũ non adduximus. Diximusque cum uirtus parum urgere incipiat, proxime crassiores uictus, eo quem morbi dispositio indicauit exhibendum. Quod si multum, uictum qui secundo loco est, fore minime strandum. Ita ut cum uirtus multum, & morbus maxime urgent, tenues sorbitiones competant. Quod asseruit Hip. in tertio comentario libro de ratione uictus, cum de colliquatibus febribus sermonem facit, in hunc modum. Deiectiones (inquit) huiusmodi habent quidem, & alias, quæ graues sunt, offensas, neque enim

In de
morbis
uulgari
bus pri
mo. cõ-
ment. 3


Hippocundriorū extinguunt ardorem, sed excitant inquietationemque, et membrorum iactationem faciunt. Intestina etiam sedemque exulcerant. Quibus uerbis Hip. morbum maxime urgentem depinxerit, uirtutem quæ ob maleficas deiectiones multum urgere. Sed audi quæ statim scribit. Qui ergo in morbis huiusmodi, relietis sorbitionibus, mulsæ potius alterius uice utetur, ijs ut multa fœliciter consequetur, sic ei nequaquam præter animi sententiam succedent multa. Sed quas nam an tenues aut crassas intellexerit, Gal. in expositione recte in hunc modum expressit, nempe in solis inquit qui colliquefaciunt morbis, uel in quibus hominum uirtus ad morbi usque iudicationem sufficere non possit, ad ptisanæ cremorem perueniemus. Cremorem ptisanæ, tenuem esse sorbitionem supradiximus. Rursus ponamus morbum, & uirtutem multum urgere, crassam sorbitionem ijs cōuenientem uictum esse diximus. Quod similiter secundum senis sententiam esse ostendimus, qui ita scribit, quibus inquit per febres alius liquidus est, et mens turbatur, horumque multi floccos uelunt, naresque fodiunt, & parum quidem interrogatis respondent, sed ex se nihil quod compositum sit dicunt &c. Et statim ita scribit his igitur ita habentibus, si uenter liquidus fuerit, absumensque, & contabefaciens, sorbitiones crassiores frigidiores, exhibendas esse. Percepisti ne, ex signis morbum, & uirtutem multum urgentes descripsisse, crassasque sorbitiones tali concursu ministraffe. Sed abunde de uictus forma dictum est.

Lib. 4.
de rōe
uictus.

BRVDI LVSITANI
DIONYSII MEDICI FILII
DE VICTV FEBRICITANTIVM
AD ANGLIOS.



LIBER SECVNDVS
CAP. I.



VNC DE QVANTITA-
te uictus, tempestiuum est agere.
Nisi enim potus, aut sorbitionis
quantitatem nouerimus, aut
naturam minus iusto exhiben-
tes laedimus, aut morbum si plus
ministrauerimus, augebimus.

Primo
de rōe
uictus:

Victus quantitatis, à consuetudine, & morbi constitu-
tione, indicatio summitur. Consuetudo eā uictus quan-
tatem designat, quam egrotans solidioris cibi bona in-
gerebat ualitudine. Sunt enim qui multum uoraces
sunt cum sanitate fruuntur, ijs multum sorbitionis,
aut potus concedendum est, parum ijs qui parce uiuūt.
Hoc nos docuit Hip. in hac uerba uerum inter initia,
neque multam, neque crassam admodum dare oportet,
sed quantum ob consuetudinem, & ne multa uasorum
inanitio fiat. Morbi proinde constitutio ab ea quam

consuetudo indicauit quantitate detrahit. Vt si uictus
quantitatem laborantis naturam ferre non posse conie
ceris, aut ob temporis breuitatem, ad sequentem accessio
nem, aut ob morbi molestationem, aut quia sorbitioni
bus aeger usus non est, ab ea, quā nobis quātitate consue
tudo indicauit, detrahemus. Subtractionis autē modus
erit, ut non multa fiat uasorum inanitio, cōsuetudo igitur
maximam designat quātitatem, quam inter initia
morbi offeremus. Vt si Socrati laboranti, uictus formā
tenuēs sorbitiones esse diffinieris, tamē earū offeres in
ter initia quātū solidiori cibo bona utebatur ualitudi
ne. Proinde prout morbus, & eius symptomata aucta
fuerint, ita ab ea quā consuetudo indicauit quantita
te detrahendum est. Vt si manifesto incremento morbi
symptomata aucta fuerint penes uehementiā, & dura
tionē, sensibiliter ab ea uictus quātitate, quam primis
obtulimus diebus minuemus. Nec hoc prater senis men
tem est, loco citato, ubi ita scribit. Postea si dolor quis
piam, uel periculum comparuerit, sorbitionē dare oportet,
nec multam, nec crassam &c. Rationi praterea cō
sentaneum uidetur, ut eo minus exhibeatur tēpore, cū
laborans magis morbo molestatur, quam cum mediocri
ter habet. In initio cū egrotantes utcunq; moderatius
habeant, tantum exhibendū, quantum consuetudo in
dicauerit. Apud statum uero quia morbi symptomata
in maxima sunt uehementia, nihil esse exhibendum, ab
eodem didicimus. Inter medio uero tempore mediocrē
ministrabimus quantitatē, sed cum non ex aequo sin
gulis diebus, aut alternis, nec morbus, nec eius sympto

H iij

DE VICTV FEBRICIT.

In.2.de
rōe ui-
ctus in
acutis.

nata augeantur, non iusta dierum numerum à princi-
pio, quantitatem minuendam, sed prout morbus, et sym-
ptomata increscunt. Ex ijs tamen ad exactam uictus
quantitatem te posse peruenire haud quaquam speres.
Nam quantum a quantitate quam consuetudo indica-
uit, demere oporteat ob morbi, & symptomatum incre-
mentum, exacte non scimus. Ob id igitur prudentissi-
mus Hip. ciborum adiectioni intendendum multo mi-
nus ait, &c. In cuius expositione Gal. ita scribit, ad scri-
psit in quantitate ipsa ad id quod minus est, proceden-
dum esse magis, quam ad id quod exuperat, ubi quis à
iusto modo abscedit, nempe quod plus est exuperatque,
noxas interdum inemendabiles facit. Verum quod mi-
nus est, facile emendatur, nempe si uirtus elabi uidea-
tur cibi exiguum ministrare possumus. Verum si in uen-
trem absorptus fuerit cibus, quod redundat superfluit-
que, si alias multo magis in acutis tollere est difficile.
In quibus uerbis aperte ostendit cum ab exacta erran-
dum sit quantitate, melius esse, ad id quod minus est ac-
cedere. Nam error hic minus lēisionis afferet.

C A P. II.

2. derōe
uictus
in acu-
tis.

AT alicui forsā contrarium uidebitur. Nam id
certum est grauioribus aegrotantes offensis affici, cum
propē statum erratum sit, quā si in morborum princi-
pijs quippiam delinquatur. Vt ab Hip. & Gal. scriptū
est, illo loco nempe, hoc autem uerius efficaciusque,
&c. Cunque inter initia minus quam iustum est offe-
rimus, sic agentes uirtutem imbecilliolem reddemus,
ita ut apud morbi statum, omnimodam sustinere ine-

tiam non possit. Quare cibum tunc temporis offerre
 rogemur, quod multo grauius est, quàm si inter initia
 uberius ægrum reficeremus. Nec putandum est fieri
 posse, ut minus inter initia quàm iustum est exhiben-
 tibus, uirtus ad statum peruenire possit tanto iuium
 robore, ut totum uigoris tempus omnimoda transire
 queat inedia. Nam si id possit, non minus quàm quod iu-
 stum est exhibuisti, sed quod mediocre, & conueniens
 erat. Præterea Hip. ipse parè confessus est errorem esse
 postquam enim de forma uictus sermonem fecisset, de
 quantitate agens ita scribit. Præterea inquit nõ minor
 est error, nec minus hominem lædit, si quis det, propi-
 net ue, minus tardius ue, quàm satis est, & expediat.
 Pars enim famis, & inedia, plurimum in hominis na-
 tura, & ualentem facere, & infirmum, ac primere, po-
 test. Multa etiam alia mala illis non similia ex plenu-
 dine proficiscuntur, quæ non minus etiam graua, & pe-
 riculosa sunt. Vera ita res habet, grauiorem esse erro-
 rem, qui in id quod magis urget addit. Cumque mor-
 bus ob eius uehementiam magis urget, potiorè præbet
 indicationem, unde minus lædemus minus exhibentes,
 magis uero plus ministrantes. Nam sic in id quod ma-
 gis urget addimus. Quod si uirtutis, ob eius imbecillita-
 tem magis simus solliciti, cauendum esse errorem eū, quo
 uirtus imbecillior reddatur, quare tunc temporis ad id
 quod magis est accedimus. Dummodo quantitas pro
 uirtute sit. Morbis autem acutis cum ut plurimum ca-
 piantur iuuenes, aut consistentes, quorum uires ualidæ
 sunt, minimeque in longum morbus protrahatur ma-

In lib.
 de pri-
 sca me:

H iij

Lib. 2.
de ui-
ctu acu-
torum.

gis urgere morbum, quàm uirtutis imbecillitatem, rationabile est. Quare ad id quod minus est accedemus. magis uerētes, ne plus exhibentes, in id quod magis urget addamus. Recte igitur Hip. dixit ciborum adiectioni intendendum multo minus, magis nos sollicitos esse oportere morbi acuminis, quàm uirtutis docens, præcipue in morbis ijs qui breui terminantur. In quibus sepe numero omnino subtrahere expedit, cum æger sufficere possit donec morbus mature scat. At in libro de prisca medicina, uniuersalē faciens sermonem, utrunq; errorem grauem esse dixit. Ac si æque urgentes uirtutem, & morbum finxisset. Neque ratio quicquam eorum quæ diximus tollit, nam errorem quem prima exhibitione committimus, minus exhibentes, non apud statum. corrigimus, sed secunda, aut tertia oblatione emendamus. Quod quia ad opus apprime utile erit, explicabimus. Si Socrati febre continua laboranti, sorbitionem dare decreueris, in primis modum, secundum quem bona ualitudine, cibo, & potu utebatur, inquires iusta quem, sorbitionis quantitatem diffinies. A qua postea iusta morbi incrementum detrahes. Talemque offeres primum quantitatem, ut commodè apparare possit, citra additionem uehementiæ, aut durationis accessionis febrilis. Quod si ab eo cibo quem primo exhibuisti nullum horum sequatur, ægotansque plus ferre posset, aut uoluisset, parum addes sequenti oblatione, quia quod minus est exhibuisti. Et ita id quod minus est, facile emendatur. Quod si plus exhiberemus quàm ægotantis natura citra læsionem ferre pos-

et, noxam emendari ita facile non est. Errorem quidē hunc, hæc sequuntur, incommoda, nempe grauitas hippocundriorum, frequētia anhelitus, febriles incensiones, sitis, capitis dolores, &c. Hæc omnia in morbis acutis eueniunt ex immodica cibi quantitate, et ex intēpestiua eius oblatione, ut ab Hip. scriptum est in libris de ratione uictus. Nulla ergo alia melior mēsurā dari potest, qua uictus quantitatem diffiniamus, quā sensus ægrotantis, qui magis & minus indicat citra errorem. Prima autem oblatione, ut ab ea iudicium capiamus in posterū, minus quā consuetudo indicat offerri melius esse diximus. Nec hoc est præter senis mentem, qui in eodem de prisca medicina libro, ita ait. Præterea, uaria multo magis est, ac maioris diligentiae eget hæc res, mēsurā enim cuiusdam animo considerare oportet. Mensuram dico non quæ pondere, numero uel ullo constet, quā si quis respiciat, quod expediat, exactum uel sit, possit cognoscere. Nihil. n. aliud inuenires quā corporis sensum. Quā ob rē tā exacte rē nouisse uti parū utrinque erret quis difficillimū est. Tam et si hunc ego medicum ualde laudo, qui paululū in ijs rebus aberret peccet uel. Quod autem exactum & uero proximum est, raro admodum scire & uidere est. Siquidem plurimi medici in ijs mihi similes esse uidentur, prauis nauium rectoribus. Nam cum illi in tranquillitate regendo peccant, errant uel, eorum error non patet, cum autem eos magnus uentus, atque aduersa tempesta, deprehēdit, liquido iam & aperte cunctis hominibus qui in ea sunt patet, per eorum ignorantiam & errorem peccatum uel.

nauem nisi succurratur perditum iri. Sic mali, & pluri
mi medici, cū homines qui nihil graue & periculosum
habēt curātur, si quis in ijs maxime peccet, erret ue, ni
hil admodū graue & periculosum admittat. Nam mul
to plura & sēpius leuiuscula hominibus mala sunt,
quā graua & periculosa. In quibus si peccent, er
rent ue, rudibus et ignaris non patet, cū autē magnum
& uehementem fallacemq; morbū nanciscuntur, tunc
eorum error, & peccatum, arsq;, cunctis patet.

C A P. III.

S E D forsā quis obijciat, ex ijs quæ dicta sunt ap
paret, una uictus forma, nutriendos esse agrotantes, a
morbi initio ad statum usque incedendo. Quantitatem
autem secundum morbi incrementum mutandam. In
ter initia, iusta consuetudinem, uictus quantitātē, men
surandam, crescente uero sensibilibiter morbo, minuen
dam. At uidetur magis ex usu fore agrotantibus, si
semper quantitatem seruemus quam consuetudo indi
cat, formam uero mutemus. Vt si inter initia morbi,
crassa sorbitione agrotantem alere nobis usum fuerit,
crescente morbo tenuem offeramus, ea qua usus est
quantitate. Naturam siquidem semper gaudere con
suetis, asseruit Galenus ex auctoritate Hipp. Præte
rea hoc idem in Aphorismis sentire uidetur, cum ait
ἐμπροσθεν δὲ ἡπιωτέρας διαίτης ὥς αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς οἰεῖ ὁ νοσῶν hoc est;
ante uero uberius reficiendum, ut sufficiat agrotans,
per illud uerbum ἡπιωτέρας διαίτης non quantitatem, sed
uictus formam intellexit. Præterea in loco quem cita
sti, non magis quātitatem mutandam esse docet, quā

8. de me
thodo
meden
di.

In 1. de
uictu a
ctorū.

formam, cum ait. Neque multam, neque crassam dare
oportet. Sicut enim multitudo ad quantitatem attinet,
sic crassities, & tenuitas, formam uictus respiciunt. Ve-
rum ubi ut quicquam asseras, deest recta ratio, dicta
insequere antiquissimi uiri Hipp. qui multorum sapien-
tium unus instar est. A quo didicimus uictus formam,
à morbi initio ad statum non permutandam esse. Sed
quo in loco forsan quæres. Ex libro de uictu acutorum
secundo. Cum de permutationibus agit colliges. Aper-
tius tamen à Gal. duobus in locis nempe in expositione
illius conijcere autem oportet robur & morbi &c. Vbi
ita scribit, nempe summa quam adstruit est, non permuta-
tandam esse uictus speciem, priusquam signa coctionis
manifesta sint. Id autem fiet, si quot diebus ad uigo-
rem morbus uenturus sit, præcognoueris. In quibus
uerbis manifestæ ostendit à morbi initio ad status in-
troitum una uictus forma nutriendos esse egrotantes.
Alia uero, toto eo tempore quo durat status ad perfe-
ctam morbi solutionem. Demum alia per totum con-
ualescentiæ tempus ad sanitatis habitum. In singulis
harum quattuor conditionum, non faciendas esse insi-
gnes uictuum permutationes de una uictus forma in
aliam priusquam, ad aliam conditionem peruertum sit.
Idem præterea in eodem secundo, ita scribit in exposi-
tione illius interdum autem & cruda &c. Vniuersa
hæc contingere ijs ait, qui perperam cibati sunt à me-
dicis, quicunque primis diebus exoluentes laborantes,
sanè circa tertium, uel quartum, uel quintum, uel se-
xtum, repente ad edulia permutauerunt, nondum morbi

uigore peracto, quasi peracto, conuenienter eos permutasse uictum dicat. Quod igitur dicebat quod permutare quidem oportet uictum sanorum in morbis, non quidem ut sorte euenit illud agendum, iam puto manifestum ex dictis esse. Existente enim constitutione corporis una cum sanitas adest altera à morbi principio usque ad statum, alia ad perfectam solutionem, & post hanc alia quæ conualescentiæ tempus ad usque sanitatis habitum occupat. In nulla harum quattuor constitutionum facere oportet magnas uictus mutationes, antequam in aliam constitutionis speciem peruentum sit. Qui igitur egros morborum exordijs in omni ciborum abstinentia seruant, si ad uigorem usque talem uictus speciem seruare possent, nemo eos culpauerit. Quod si facere non possunt &c. Idem dixit in eodem in expositione illius de mutatione quæ in hæc uel illa fit, plurima sum locutus &c. Rursus sermonem totum in summam unam coegit Hipp. In ijs qui similiter habent uictum haudquaquam permutare percipiens, uerum in ijs qui ex sanitate ad morbum transeunt, permutare quidem, non tamen ut ceteri permutant, deinde compendio quodam uictus scopum in acutis morbis declarauit. Siquidem morbus maturuerit transeundum ad cremorem ptisane præcipit. Si adhuc crudus fuerit non transeundum, nisi ob aliquod symptoma. Hæc sunt loca ex quibus colligo in constitutione una, prout est à morbi initio, ad statum usque, non permutandum esse uictus speciem. Quod si iam dictis illud Hip. adiungas, non igitur intempestiua neque fortes uasorum in initio

In 2. de
 uictu a-
 cutorū.

moliri, neque cum morbi uigent, cibum dare, neque
pente huc, uel illuc, in toto negotio quicquam muta-
licet, manifestum erit quod si eadem uictus forma, et
dem quantitate, per morbi initium & incrementum
eremur, apud statum uero cibum omnino prohibere-
us, ægrotantes ex repentina uictus mutatione læde-
mus. Item rationi consonum est, ut cum paroxismo-
m incrementa, & longiores durationes minus tem-
pris quiescere laborantes permittunt, magis tenui ui-
u nutriendos fore. Cunque uictus species secundū an-
quorum mentem mutanda non sit, durante eadē mor-
i constitutione, reliquum est ut quantitates imminua-
us, prout morbus incrementum accepit. Id etiam ab
ip. licet colligere in primo de uictu acutorū, nā stan-
e eadem morbi constitutione, cum alimoniā addere in-
endit, & uirtutem roborare, uictus formam seruat im-
mutatam, quantitatē augēdam præcipit. Vt in eo, at
os madescat, & quæ à pulmone expuuntur talia sint
ualia esse oportet, sorbitionis quantitatē ut summa-
im dicam augere conuenit. Et infra statim, & quanto
maior fuerit expurgatio, tanto magis ad iudicationem
isque dare oportet. Ecōtrario igitur à morbi initio per
totum incrementū ad statum, cum minus nutrire ægro-
antem intendamus, uictus specie manente, quantitate
imminuemus, prout morbus manifesta habuerit incre-
menta. Minusq; naturā huiusmodi lædi posse mutatio-
ne, quàm si formam uictus immutarem. Consuetudo
n. magis formā uictus et eius qualitatem respicit, quàm
quantitatē. Et ob id difficilius fert natura, si assuetam

DE VICTV FEBRICIT.

uictus formā, & qualitatem immutes, si uero ab assue-
ta detrahas quantitate, non adeo. Ob id stante eadem
morbi constitutione, ut minor fiat mutatio, quantitas
mutanda est, forma autē uictus seruanda. Nec prae-
reundum esse, ætatem, regionē, coindicatrices quātitā-
tis esse, præterea numeri multiplicationis prohibitio.
Hæc enim maiorem indicant quantitatem, ut si puero
multoties ædere assueto, si propter morbum toties mini-
strare cibum non possimus, quod à numero deest, id quā-
titate ipsa supplebimus. Vt scite à Gal. scriptum est.
In expositione illius quibus semel, aut bis &c. Vbi ita
scribit, si uero accessiones non permiserint, neq; alimē-
ti offerendi occasiones fuerint multæ. Raro plura dabi-
mus. Vnde quidam male hunc uertit locū, in hunc mo-
dum neque multi alimenti offerēdi occasiones fuerint.
Hiems multum exhibendum esse indicat. Consimiliter
& regio frigida. Sed hæc ad imminuendā uictus quā-
titatem, quā consuetudo indicat, uires habent. Minime
ad augendā. Ab ijs ergo uictus quātitas diffiniēda est.

C A P. I I I I.

SED easdem numerus habet considerationes, nā
à consuetudine in prius, & à morbi dispositione obla-
tionis numerum scito sumendum esse. Vt scriptum est
ab Hipp. in hæc uerba, qui enim bis cibari sunt soliti,
bis ptisanam dare oportet, quibus semel, semel quidem
primo die detur &c. Ab hoc numero quem consuetudo
indicat, quæ à morbo sumitur indicatio detrahit. Nam
principia, & incrementa, & status, accessionum, ali-
quando numerum oblationis consuetum seruare pro-

i. de ra-
tione ui-
ctus.

bibent. Virtus autem corporis plerunque super addit,
cum imbecilles sunt, aut cum eum ministramus cibum,
qui parum nutriat, & uolumus ut roboretur natura,
numerum tunc cibationis addimus, si per morbum li-
ceat. Vt si febre continua laboret is qui multo cibo bo-
na utebatur ualitudine, uisumq; nobis sit huic ptisanā
exhibere ob aliquas causas, cum ultra eam quantitatē
quam consuetudo præstitit exhibere nō liceat uice una
numerum oblationis addere studebimus, ob id quod hic
multo indiget nutrimento, parumq; alimenti ptisana
suppeditat. Hoc uidetur intellexisse Hipp. eodem pri-
mo libro, in hæc uerba. Quibus semel, semel quidem
primo die detur, deinde sensim, paulatim, si fieri potest,
ijs quoque detur, si quid putas adiiciendum. Infirmum
igitur toties nutriemus quoties consuetudo indicaue-
rit, nisi aut facultas crebrius, aut morbus varius indi-
cauerint. Consuetudo igitur primam quantitatem si-
ue maximam, et primum numerum, penesquē aliquan-
do rarius, quandoque crebrius, ægrotantibus cibum mi-
nistrare dicimus, proponit. Huic aut uirtus addit, aut
morbus minuit, scite ergo Hipp. in Aphorismis dixit,
quibus semel, aut bis, aut plura, dandum est aliquid
tempori, ætati, et consuetudini, neque igitur quantitas
uictus, nec oblationis numerus, inueniri posset si à con-
suetudine indicationem tollas.

CAP. V.

QUALITATEM cibi multa indicant, nem-
pe morbus, naturæ ægrotantis, ætas, consuetudo re-
gio, anni tempus, & cæli status, in morbi appellatio-

DE VICTV FEBRICIT.

ne, morbum & eius causam intellige. Natura agrotantis, ætas, & consuetudo similia semper indicant. Cæli status, regio, & anni tēpus, si tēperata sint, similia, sin intēperata, contraria indicant, qualitate uictū. Ut si calida immoderate sint, uictū frigidū exposcant. Quod si temperata fuerint, uictum medium indicant. Non sic profecto laborantis temperatura, ætas, et consuetudo, semper enim hæc similia siue commoderata sint, aut non indicant. Cunque ea iam dicta in unum consentiunt cum morbo, eum esse exhibendum uictum, qui qualitate insigni morbo aduersetur. Vtpote omnibus indicationibus id dictantibus. Cunque contraria indicent, à potioribus sumendam esse indicationē qualitatis uictus. Ut si morbus frigidum & humidum indicet, cætera uero omnia calidum & siccum, ambiguitas, utique pugnaq; indicationum inter se oritur. Quo casu magnopere opus est, tum numerum indicationum tum earum magnitudinē simul conferas. Quippe quæ a febre sumitur, ea reliquis quando omnes contrarium faciendum perscribunt, numero quidem inferior est magnitudine tamen quæ ex dignitate potestateue spectatur, utique superior est. Potissimum, si longe a natura recessit. Prout quidem febris est, plus cæteris omnibus sollicitos nos habet. Et quia præterquam quod febris est, etiam magnitudo illi notabilis accessit, ideo contrarias indicationes inducit atq; obumbrat. Sin febris parua fuerit, fas est reliquas omnes una coniunctas cum ea conferri atque expendi. Ac siquidem pares uidentur, neque febris indicatio præferetur, sic ut humectandum

numectandum, et refrigerandum sit, neque etiam reliquorum, sic ut califaciendum, & siccandum sit. Immo media uictus ratio ubi ita se corpus habet eligenda erit. Sin altera indicatio exuperet, tantum recessisse à temperato, & medio uictu par est, quantum ea, quæ uolent sua contraria superant. Ergo exercitatum & natura prudentem esse medicum cōueniet, quo cuiusq; indicationis potestate diligēter cōsiderata, omnibusq; inter se collatis unam idonei uictus summam, quæ laboranti sit commoda comparet. Hactenus Gal. cū de qualitate uictus inuestiganda sermonem facit. Sed non deerit qui in hunc modum dictis Galeni opponat, haudquaquam sperans hac methodo qualitatis uictus scientiā se inuenire posse. Ponamusq; ut ipse proposuit omnia indicantia, uictum suadere calidum, & siccum. Febris uero leniuscula tertiana sit, uictū qualitate frigidum, & humidū indicans. Coniungantur ut ille ait omnes indicationes, & cum febre eas cōferamus, et expendamus, an pares sint morbo, aut impares. Vnde nā hoc mihi notum erit rogabit quis. Nam nec id se scire ait, nec unde sciat. Multo adhuc minus, si alterū exuperet, quantum utique alterum excedat. Prætera cū indicationes regionis, tēporis anni, cæli status ad inuicem dissentiunt, utrū eorum superare debeat. Propriū insuper ægrotantis temperamentum, si forte consuetudinis obuiauerit, quomodo ijs similes qualitate uictus ministrare possit. Oportuisset methodum tradere qua uires horum singulorum nosci possent. Nos igitur pro uirili tentabimus in commodum studiosorum, uia

8. de me
thodo.
medēdi.

In 2. de
ratione
uictus.

ostendere, qua facile qualitatem uictus inuenire possi-
mus. Ab ijs, quæ ab Hip. et Gal. didicimus initium hinc
sumentes, consuetudinis indicationem potestate digno
rē esse proprii temperamenti, et ætatis. Nā si quispiam
sit siccus temperamento, ætate consistens, lūnido assue-
tus uictu. Siccū ne ei dabis, ratione proprii tēperamen-
ti, & ætatis, An consuetudinē magis seruabis. Quod si
hæsitās Hip. roga, qui ita scribit, cibos quibus uti cōsue-
uerunt, facile ferunt, tam & si natura haut quaquam
boni fuerint, similiter & potus. Cibos uero quibus uti
non consueuerunt, et si mali nō fuerint moleste ferūt,
consimili modo, et potus. In quorum expositione Gal.
ita ait, cōsuetudo maxime potest, repentinaque ab ea
digressio, corporū nō paro offendit. Ipse idē loco supra
citato ita scribit, à consuetudine inquit semper est indi-
catio similium, quo ad scilicet ægrotant homines, ab æta-
te, natura, regione, anni tempore, Statu cæli, ubi tempe-
rata sunt, similium semper præsidiorum est indicatio,
siue ualeant homines, siue ægrotant. Contra ab intem-
perati, anni tempore, Statu cæli, & regione, cōtrario-
rum est indicatio. Ceterū ab ætate, natura, subintelli-
ge intemperatis non absolute, sed cū consuetudine. Au-
disti Gal. dicentem, naturam ægrotantis, & ætatem cū
intemperata sunt nihil absolute indicare, sed cū consue-
tudine. Duo igitur hæc, ægrotantis natura, & ætas, cū
intemperata sunt ad unius consuetudinis indicationē
reducimus. Præterea regio, & anni tēpus, ad cæli Sta-
tum si res exactæ consideretur, reducibilia sunt. Nam
nec regio, nec anni tempus, quicquā agent, nisi per im-

mutationem aeris nos cōtinētis dispositionis, aut si maioris temperiei, quā cœli statum medici uocat. Quod si ad huius assertionem Hip. aut Gal. testimonium optas prout sunt plures studiosorum nostra tempestate, apud quos paruum habent rationes locum, plurimū auctoritates, tātum iuuat alieno Marte ditescere. Gal. igitur in libro nono de methodo medendi ita scribit, uoco inquit cœli statim ipsam ambientis nos aeris temperiem, sub qua, & anni tempus, & regio comprehenduntur, quando horum quoque utrunque ex ambientis temperie indicationem mutuatur. Ex dictis manifestum est omnes indicationes qualitatis uictus, ad tres reduci posse. Nēpe morbum, consuetudinē, & aeris temperiem.

CAP. VI.

CAETERVM cum morbus in affectum, & in eius causam, diuiserimus, inquirendum est, an uictus qualitas utrunque nempe affectum, & causam respicere debeat, an solum eorum alterum, & sunt in libris Hip. non nulla loca utrunque asserentia. Nam affectū, Aphorismus ille humidæ dietæ &c. ostendit. Quodq; & causam respicere debeat, ipse idē in libro primo de ratione uictus, de ptisana sermonem faciens ostendit. Ita scribens si quid abluui eget probe abluit, non astringit, hæc omnia causam respicere manifestū est. Ratio tamē aliud dīctat, nā cū duo sint quæ in medici cōsiderationē subeāt, nēpe corpus febricitās, et humores putridi. Ita duo sunt instrumenta, illorū gratia, quorū altero corpus seruamus, et altero putridos humores extra pellimus. Uictus quidem corpus respicit, et id quod ab eo

DE VICTV FEBRICIT.

effluxum est, tum si ratione morbi corpus intemperatum est, id contrariis emendat qualitatibus, paulatim id agēs. Respicere humores medicaminū est, ut crassos extenuēt, lentos detergeāt, putridos expellāt. Victus igitur munus est id quod à patiente particula effluxum est instaurare, & id quod alteratum est reducere. Hæc solum euenire corporis partibus simplicibus possunt. Verum ad illud quod dixit Hip. si quid ablui eget, probe abluit, ipse statim illo uerbo si quid ablui eget, respondet, id tanquam non necessarium euenire innuens quid Gal. asserit cum ait, si quid ablui egeat, quasi nō omnibus acutis morbis probe abluente edulio utamur. Nēpe cætera omnia, quæ de ptisana dicuntur bona morbis omnino prosunt acutis. Sed abluēdi bonitas quibus uentrē subduci nolumus, ubi cibus in uia moratur est idonea. Probe igitur abluere febrili affectioni, neque tanquam contrarium, neque tanquam familiare auxilium unum utile existit, sed bene tanquam symptomatis alicuius emendatorium correctoriumque. Mentem adhibe ad illud uerbum febrili affectioni, ac si uelit, uictum, febrilem affectionem, & non causam, respicere oportere. Quod si accidat ut uictus utrique aduersetur, & affectui, & causæ, ob id reijciendus non est. Cū ergo uictus id solum quod à corpore exolutum est reponere, aut id quod alteratum à morbo est, reducere debeat, manifestum est, cibus astringentibus utendum non esse, nisi, cū morbus ad eam corpus alterarit dispositionē, à qua aut uētris fluxus, aut uteri, aut alterius momentaneæ partis, aut symptomati sudores robur,

uirtutis exoluentes, aut animi deliquium, proueniant. Alioquin non est quod corpus moderate habens in raritate, & densitate cibo astringente obstruas. Proinde cum aeris nos continētis tēperies nihil indicet nisi pro ut nostrū afficit corpus, tantumque indicationis sortiatur, quātum corpus ab illo mutatur, manifestū etiā est, indicationem continentis nos aeris ab ea sumendā esse immutatione qua nostra afficit corpora. Consimiliter de morbosa sentiendū est affectione, nam tantū indicabit quantū corpus à naturali mutauerit symmetria, licet febris in sua causa magna esse uideatur. Parūq; si corpus à proprio ammonerit tēperamēto, parū indicabit iuxta recessus magnitudinē. Duo igitur indicātia, nempe aeris nos cōtinētis tēperies, & aegritudinalis affectio, ad corpus reducuntur affectum. Neque ulli mirum id uideri debet, quod ambiētis indicationē ad præsentem corporis affectum reducamas. Nam iure id mirum uideri non debet, quod rationi peruium est. Pone affectum, & ambientem utrunque calidū, & sic cum. Corpus utiq; affectum tale est, non solū propter morbosam affectionem, sed ab ambientis calidi, et sicci operationem. Vtriusque igitur operatio affectum corporis præsentem produxere. At pone ambientem frigidum, & humidum affectioni contrarium, corpus profectò affectum, non tale est ob solam morbosam affectionem, ob quam magis tale esset, sed ob ambientis etiam qualitatem affectioni contrariam, eius uim refragentē. Neque, quæ dicta sunt præter mentē Gal. esse putes. Ille enim in libris de methodo medendi am-

DE VICTV FEBRICIT.

bientis indicatio ad præsentem affectum, quem morbum nominat, reducit. Cum ex tribus indicantibus, quorum tertium ambiens erat, duo collegit indicantia. Ad duas igitur indicationes in uniuersum omnes quæ uictus qualitate indicant reduximus. Nempe corpus affectu & consuetudo. Ab ijs igitur qualitas uictus querenda est. Verum cum hæc consideratio medicæ artis parti, quæ morbos curat subiaceat, necessum est recessus corporis à naturali temperamento scire, ut cōtrarium applicantes qualitate uictum, ad symmetriā particulam reuocamus. Recessum uero nisi naturale nouerimus temperamentum, alia sciri uia nō potest. Quapropter alia præter duas indicatione naturali nempe temperie opus est. Quibus autem notis id inueniri possit medico considerandum est. Proinde cum omnibus in unum collatis temperamentorum signis coniectura et non sciētia assequamur, ab una consuetudine id certius sciri posse cum Gal. asserimus. Qui ita scribit, nos certe quibus cura fuit, inquirendi illud inuenimus quod per plures cognitu difficiles notas. Cuiusque membri, temperamentum coniectura potius, quam scientia inuenitur. Si igitur notis multis & paruis aliqua certior apparuerit, nōne abiectis illis, hanc pro omnibus arripiemus, nemo id arbitror qui mentis compos est, negabit. Atqui si omnes temperamentorum notas in unū colligas, hæc lōgissime absunt, ut parē ei quā consuetudo præstat fidē faciant.

C A P. VII.

VERVM quia in cognoscendo ægrotantis à proprio temperamento recessum. Duplex datur considera-

tio. Nempe generatim scire uersus quam qualitatem corpus alteratum sit, secundo quantitatem illius declinationis, hanc non ualde speculationi huic de ratione uictus necessariam. Nam particula intemperiem semel a suo contrario euertere in ratione ciborum non est, sed medicaminum. Sat enim est si cibus paulatim bono temporis intervallo id agat, id autem contrario remisso effici potest. Quam ob rem, & si corpus a naturali abscesserit symmetria, per duos gradus uersus calorem, necessariam non est, nec ut opinor commodum frigidum, huic totidem gradibus uictum offerre. Id enim cibi naturam egrederetur, haec est ut a naturali calido patiat, parum autem in id agat. Ut cibo medicinali usu uenit. Quapropter satis sit si frigidum in primo uictum offeramus. Hic enim cibi munus ad implebit, facultatem uero medicaminis, temporis intervallo crebriori usu praestabit. Vnde fit, ut cum cibus ea miscere quae ualentibus sint praedicta qualitatibus cauendum sit. Id solum ergo scire conuenit ad quod extremum alteratum sit corpus. An uersus calidum & siccum, an frigidum & humidum, & an parum, aut multum a naturali symmetria recesserit, quod haud difficulter inuenies, si considerationem de consuetudine habeas. In ijs quibus usus est bona ualitudine, citra noxam, & ex ijs quibus usus uidebatur. Ex ijs enim temperamentum corporis, certius alia quacumque nota cognoscas. Ut prudētissime Gal. citato libri. dixit. Videtur, inquit, non sicut alia quaedam exigua, leuemque sed plane maximam, maximeque principalem potestatem habere consuetudinem, ut quae singulorum corporum

DE VICTV FEBRICIT.

naturam ostēdat. Et statim inquit, sanè ipsi uia rationeque ab ea procedentes, fatemur ncs partiū affectum inuenire. Deinde ex illo rursus ad faciendorum indicationem uenire. In hocque pars hæc, quæ de uictus qualitate agit, ab ea medicæ artis parte, quæ singularum, aut simplicium partiū morbos curat differt, quod hæc quantitatem recessus à naturali temperie nosse desiderat, ut equali contraria gradu applicet remedia. Illa uero solum quærit uersus quam qualitatem intemperatum sit corpus, & an multum, an parum recesserit.

C A P. VIII.

A T R I B V S igitur qualitas uictus summitur, à naturali temperamento, & ab affectione, & à consuetudine, cunque hæc in unum consentiant, quod simul indicauerint statim exhibendum. At contraria indicare solum affectum, & consuetudinem posse. Nam naturale temperamentum semper cum affectu in indicatione qualitatis uictus consentit. Nam affectus indicat sui ablationem per quam ad temperamentū pristinum ægotans reducitur. Huic indicationi naturalis ægotantis temperies semper consentit. Duo sunt igitur, quæ contraria indicare possunt, nempe affectus & consuetudo. Vt si affectus calidus, & siccus humidum exposcat uictum, consuetudo uero prohibeat (nam calidis, & siccis assuetus erat cibus) in hac indicationis contrarietate inquirendū est, an calidis, & siccis assuetus esset, ob id quod male ex frigidorum usu, aut quia melius calidis, & siccis quàm a frigidis, et humidis haberet, aut à frigidis, & humidis nihil incōmodi perci-

niens. Si primum contingat, eo esse utendum uictu, qui temperatus sit, aut id mixtis adinuicem contrariarum qualitatum alimentis conficiendum. Siquidem dum sanus erat calidis & siccis opus sibi erat cibarijs, ut incultate uiueret, febre correptum, calidum & siccum iam effectum, frigidis, & humidis laedes. Aut nunc aut cum febris abierit. Nam id præstitit affectus quod calidis & siccis cibarijs quærebat. Quapropter si tunc iuste ea, quæ calfaciebant, & exiccabant amplectebatur, non est cur nunc caliditatem & siccitatem affectus, frigidis & humidis euertas. Nisi multum exuperent. quod si contingat uictu medio utendum est quo excessus securissime refranguntur. Quod si secundum eueniat, dandum esse aliquid consuetudini, minus tamen quam in prædicto. Eo utentes uictu qui refrigerare & humectare moderate ualeat. Liberalius id agere licet si tertium contingat, parum consuetudinem illam facientes. Ad tria igitur omnes reduximus indicationes, nempe regionem & tempus anni non agere nisi status cæli interuentu. Hic autem nihil indicat ex se, sed in quantum corpus afficit. In uno igitur affectu corporis, regionis, anni temporis, status cæli, & morbi, temperamenti ægrotantis, ætatisq; uires siue actiones, potestate sunt, & id quod tandem ab eorum actionibus, & re actionibus, & alterius, supra alterum exuperantia superest, in uno affecto corpore conspicitur. Non est igitur quod medicus in æstimandis horum cum contraria indicant uiribus, mentem inaniter agitèt. Id enim quod ab exactissima consideratione elici posset, corpus affe-

DE VICTV FEBRICIT.

Etum indicat. Diximusq; aetatem ad proprium reduci
temperamentum, cuius ope scimus an parum, aut mul-
tum, à naturali recesserit corpus symmetria. Ad opus
præstat id commodi, ut sciamus quando maxime finem
alteranti uictui imponemus. Cæterum in indicatione
qualitatis uictus cum affectu consentit. Nam si quispiã
sit calidus natura, calidiorq; ob ægritudinem euaserit,
affectus indicat, ut id caliditatis quod super excreuit
abscindatur. Idem proprium indicat temperamentum.
Et non calidum potestate uictum, ob id quod ante na-
tura calidus erat. Sola igitur illius gratia, corporis tẽ-
peratura à medico inuestiganda est, ut an parũ an mul-
tum, à naturali recesserit corpus symmetria, & quan-
do maxime alteranti uictui finem imponemus sciamus.
Sola igitur consuetudo est, quæ aliquando dissentit af-
fectui. Tuncq; diuisionem illam quam supra triplicem
fecimus inquirere ab ægrotante, & ab ijs qui hominem
multo ante nouerunt oportet. At cum omnes tres in
unum consentiunt, cum humidus natura, et humido ui-
ctus assuetus, febre corripitur, audacter frigido & hu-
mido uictu utetur. Nonne hæc sunt senis uerba humi-
di uictus omnibus febricitantibus conueniunt, maxime
pueris, & alijs sic assuetis refici. Sunt tamẽ febres quæ
non humidum, sed siccum indicant uictum, de quibus
infra nobis sermo erit ubi mentem Hip. in dicto Aphor.
ostendemus. Nunc ad reliqua properemus.

C A P. I X.

A duobus sumitur quãdo exhibere cibum debeamus
à facultate & à morbo non prohibente. Prohibet ab

nitijis paroxysmorum, aut exacerbationum ad manifestam inclinationem. Iis enim temporibus natiuo calore ad thoracē collecto, ut morbi causam unicat, cibus dandus non est, quanquam corpus iam iam indigere uideatur, cū Gal. asserimus de ratione uictus in acutis. Opportunum igitur exhibendi uictus tempus fuerit, cum caliditas ad pedes descenderit, uiscera iam deferens, ut ab Hip. scriptum est, uerum si facultas nimis langueat, ita ut imbecillitas eius maxime urgeat indiscrete quolibet tempore nutriemus ægrum. Et in statu totius morbi, ut scripsit Gal. in Aphor. Cunque in declinatione accessions dare expedit, non ea statim uictum forma, quā ægrotanti definieris exhibebis, sed magis tenuem, ut si sorbitionibus ægrotantem alere decreueris, satis sit si potiunculam, inchoante inclinatione, ministraueris. Postmodum aut febre cessante, aut omnino remittente, sorbitionem exhibeto. Quem modum uidi à peritis medicis obseruari in Italia. Quibus enim ægrotantibus sorbitionem ex pane & iure pulli quam panatellā uocāt, ministrare decernunt, hos primo in inclinatione febris tenui pulli iure nutriūt. Ac postmodum cessante febre, aut manifestè remittēte, sorbitionē exhibēt. Hoc ut arbitror sensit Hip. cum in fine primi de ratione uictus immediate dixisset, cū calor ad pedes descenderit, tunc dare expedit, subiungit statim. Vtere primum & maxime cremore, postea ptisana, secundum perscriptas coniecturas exacte speculatus. Quæ quidē uerba, & si Gal. ad uictum uniuersalem referat, de particulari cibatione eadem posse recte intelligi asserimus. Vt talem

In fine
primi
de ratio
ne ui-
ctus idē
dixit in
4. eius-
dem.

faciant sensum, quod si sorbitionibus agrotatem nutrire debeamus, melius esse inclinante febre à tenui sorbitione; ut cremore ptisanæ incipere. Ne ab unius diei inedia ad crassiusculum cibum mutatione subita, lædatur agrotantis natura. Quod autem scribit secundum per scriptas coniecturas, hunc sensum habet. Quibuscunq; coniectura habita de morbi constitutione & agrotantis robore, dandam fore sorbitionem decreueris, hanc non in initijs, neque incrementis accessionum exhibeto, sed in declinatione. In qua commodius ages si primum cremore usus fueris, deinde ptisana. Cæterum in continetibus febribus, quæ unicam à principio ad finem accessionem habent, nutriendi idoneum tēpus, à consuetudine, & à facili toleratione accipitur. Vt si in aurora facilius ager malum tolerat, eodemq; tempore cibari solitus est, commodissime ea hora cibum agrotanti ministrabimus. Hoc discimus a Gal. undecimo de methodo in hæc uerba. Tempus uero nutriendi quod quidem ad reliquas spectat febres, quæ ex putredine oriuntur, in progressu sermonis dicemus. Quæ uero unicam à principio suo ad finem habent accessionem (de his nante præsens sermo est) in his facilis toleratio, & consuetudo spectari debebunt. Quando cibus illis eo tempore est offerendus quo facilius quàm in cæteris morbum tolerant. Eoq; potissimum diei tempore quo prius cibari sunt sueti. Etenim facillime cibum ferent si ex his, considerationibus assument. Hucusque Gal. Cæterum scire oportet quod aliquando consuetudo & facilis toleratio, in indicatione temporis dissentiunt, ut si

qui ægrotat eorum sit, qui semel cibum solent capere
cumbente sole. Morbum uero facile toleret æger ini-
o diei. Pugna inter indicantia oritur, quo casu indi-
catio à facili toleratione præualet ei, quæ a consuetu-
dine. Nec præter rationem, nam si bis, aut ter cibum bo-
næ ualitudine capere assueto ægrotanti, propter feбри-
es accessiones, semel ministramus, ob timorem ne cibus
intempestiue exhibitus, aut in uehementiam febrilem,
aut in eius addat durationem, ut in superioribus osten-
dimus, multo cautius in synochis, quæ acutiores multo
sunt febribus prohibendus est, ea hora cibus qua plus
cedere potest, eaq; maxime ministrandus, cū ab eo cor-
poris natura capiat cōmodius usum, minusq; prompte
in morbi causam transeat. Quod si facilior toleratio
manifesta non detur, à sola consuetudine incontinenti-
bus febribus tempus nutriendi idoneum sumendum est.
Porro aptissimum in febribus, quæ intermittunt & re-
petunt, tempus est, cū uti dictum est, exhalare iam cœ-
perit febrilis calor, huius quoq; opportuno tempore ex-
duplici coniectato respectu, nempe summo præcedentis
accessionis uigore, et futura principio. Ad hæc nam spe-
ctantes, operā dabimus, ut quàm longissime ab utroque
nutriamus. Ergo si spatium quod inter summū prioris
accessionis uigorem, & sequentis principium interue-
nit, satis sit amplum, facile est idoneum tempus inueni-
re, sin exiguum id fuerit, alterum facias necesse est, ut
aut ægrum admodum adhuc calentem nutrias, aut se-
quentis accessionis inuasionem iam iam affutura. At sum-
mi uigoris & accessionis principij morem sic consideres

cenſeo. In ſummo uigore notabis an circa magnitudinē
 febrilis caloris ſiccus ſit & ſquallens, an citra ſiccitatē
 urens. Priorem nanque humectante uictu madefacere
 quā primum oportet. In ſecundo dum plurimum ca-
 loris ſe remittat, manere. In principij uero acceſſionis
 more æſtimabis, an corporis extrema perfrigeret, et ma-
 gnā ſanguinis reuocationem ad interiora corporis fa-
 oiat, an omnino corpus non præmat. Quippe ſecundum
 hoc, ceu facile cōtemnet. In priore diſtinguas oportet.
 Nam ſi abſque uiſceris phlegmone, aut ſuccorū redun-
 dantia, motus ad interiora acceſſionibus pollet, nihil of-
 fendens paulo ante cibans. Sin uel phlegmone, uel re-
 dundantia ſubſit, cauenda eſt ante acceſſionem ciba-
 tio, ſeu res maxime noxia. Hæc quidem Gal. ſcripſit de
 tēpore quando opportune in febribus æger cibetur cum
 exiguum fuerit tempus quod inter ſummū prioris ac-
 ceſſionis uigorem, & ſequentis principium interuenit.
 Vt ſi ponamus a ſummo uigore ad ſequentem acceſſio-
 nem trium horarum ſpatium eſſe, an prima cibare fe-
 bricitantem hora, commodius ſit quā ſecunda, hinc
 maxime diſces. Cibus ideo febricitantibus exhibemus
 ut eo uirtutē ſeruemus, cauentes quo ad fieri poſſit ne
 in uehementiam morbi, aut eius durationem addamus.
 Virtus ab eo cibo uſum capit quem coquit & apparat.
 Melius autem apparabit cum à febrili labore quietior
 fuerit laborantis natura. Verū facultas naturalis quæ
 cibum coquit, quietior eſt in paroxiſmi inclinatione,
 quā in initio acceſſionis, ut ab ipſo Gal. ſecūdo Aph.
 ſcriptū eſt in hæc uerba. In uigore eo quod iam coquit

superfluum euacuare. Tum propter alia, & quia animalis facultas omnino in statu laborat, licet maxime secundum illud tempus uitalis & naturalis fortes persistant. Ab initio igitur paroxismi naturalis facultas quæ concoquit maxime ad statum usque fatigatur, ab statu uero inclinationē uersus, fortis ut ille ait permanet. Quare hac ratione cōmodius est inchoante inclinatione cibū exhibere quā propē accessionē. His adde cibū si quando eum in uentriculo sequens accessio offendant corrūpi ut in pluribus certum esse. Paucis uero omnino quibus inchoante inclinatione exhibetur illud accidere. Quare siue in iocineris phlegmoni, aut uentriculi, aut pulmonis, siue ephimera, aut putrida febre quauis natura, & habitu, salubrius esse parum post uigore cibare, quā modicū ante sequentē accessionem. Hoc in singulis morbis naturis & habitibus ostendere haud magnū negocium est. Verum id studioso lectori demittere cōmodius erit. Sat nobis est, qui Hip. dogmata insequimur, eius sententiæ stare in primo de ratione uictus ubi scripsit. Nam si pedes frigidi fuerint non a sorbitione modo uerum quoque & maxime à potu temperandum. Item quarto eiusdem cum dixit frigentibus ergo pedibus neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis, sed maximum existimato si id tantisper obseruaueris, donec ualde incaluerint, deinde ita quod confert exhibe. Frigiditas siquidem pedum parte plurima febris accessuræ signum existit, quo tempore siquid porrigas maxime prorsus peccabis, nempe morbum non parum augebis. At uero

cum febris defierit, contrario modo pedes reliquo corpore calidiores sunt. Idem infra, nempe cum pedes frigidi fuerint, uenter de necessitate calet fastiditq; cibum, intenditur hyppocundrium, iactatur propter internam turbationem corpus, mens fixa non est, dolet æger, lancinatur, uellicaturq; , uomere affectat, & si mala uomuerit dolet. Ergo cū calor ad pedes descēderit, curritq; urina, & si non sudet, omnia cessant, quo tempore sorbitionem dare expedit, nam alias pernitiosa existit. Hæc quidē Hip. scripsit incōmoda euenire ijs qui in initijs accessionū cibantur. Sitq; à nobis in præfenti definitum, quod cū ob breuitatem temporis à uigore præcedente ad sequentem accessionem, alterum duorum sequi sit necesse, aut ægram ut adhuc calentē nutriamus, aut sequentis accessionis inuasiōe iam iam affutura, consultius esse primum, ut sanum magis eligere, in omni morbo, in omni natura, & in omni habitu. In qua sententia Hip. esse certum est libro de ratione uictus in eo loco qui ita incipit, cum autem purgaueris sorbitionibus quibusdam utitor. Cæterum cum spatium inter summum prioris accessionis uigorem & sequentis principium interuenit, adeo amplum, ut satis sit ad binas cibi oblationes, offeremus semel quidem, resoluta omnino priori accessione, iterumque sequenti nondum incipienti. Temporis autem inter secundam oblationem & sequentem accessionem quidam quattuor horas sat esse putarunt. Idq; forsan ex Gal. octauo de methodo sumunt, ubi asserit. Abunde esse si tres æquinoctiales horas quattuorue inter balneum, accessionis

sionisque tempus inter ponantur (à balneo enim semper ægrotantibus cibum ministrabat .) Verum in præsentī citra disputationem, non satis esse, si tres quattuorue horæ inter cibum, et sequentē accessionem inter sint arbitror . Nam intra limites dispositionis ad futuram accessionem, naturam alio intentam ciborum coctioni segniter atque imbecilliter uacare putandum est. Quæ causa est, ut diutius eo tempore cibus in uentriculis laborantium immoretur. Quapropter ijs qui ab humore putrido à febre detinentur, si quando ante accessionem cibum sint capturi, septem horarum interuallum ad sequētis accessionis initiū, necessarium esse, ut cibus in uētriculis eorum decenter coquatur, & ad inferiores partes, descendat, iuxta sententiam haly medici arbitramur . Nec Gal. huic contrarius est opinioni. Nam si ea quæ parum ultra eum quem citarunt locum scripsit, legant, ita dicentem audient . Tempestiuum inquit est iam, ut ad ea quæ post balneum adhibentur accedamus. Sunt autem ea minime multa . Nam præter aquam, quæ parum apij incoctum in se habuerit, nihil his est offerendum . Licet quod inter balneum, & suspectas horas spatium erit, trium fore horarum coniiciamus . hæc quidem Gal. Et ut apertum fiat ob angustiam temporis ad sequentem accessionem, febricitantem non cibasse, audias quid ijs statim subiungat . Si uero inquit circa uesperam, aut duabus horis citius accessio inuadat, tum lauasse mane liceat, tum cibasse, &c. Audisti Gal. eum cuius accessio ad uesperam futura est, mane cibasse, quod nostrorum medicorum imperitiam, aut in

K

sanam temeritatē arguit, qui sat esse si tres quattuor
 ue horas à cibo ad accessiōē interponant arbitrantur.
 Sed reliqua propositi prosequamur. Proinde corpora
 quæ calida, & sicca sunt natura gracili habitu, & si pa-
 rum ante accessiōem cibentur, minime læduntur. Quin-
 immo Gal. refert plures eorū à febre liberaſſe quibus
 in ipſo horrore cibum exhibuit. Illud tamen intelligere
 oportet, cum ob retentionem mordentis halitus febrici-
 tant. Tunc enim cibo conuenienti, corpore humectiori
 reddito acrium excrementorum minor commouetur co-
 pia. Sed, & cutis mollior redditur. Vnde fit ut ij qui in
 choante horrore per cutem corporis ab acri excremento
 mordentes feruntur fumi, cibi, & potus dulci halitu mi-
 tiores reddantur, unde ob dictas cauſas febrilem non
 concipiunt calorem. Ob id igitur Gal. cibum ijs duri-
 te horrore concedit, minime autem cum iā calorem fe-
 brile patiuntur. His tamē si quando febre à putrido hu-
 more laborent, cibū in accessiōibus exhibeamus ea fidu-
 cia, ut eos à febre liberemus, non leuiter in eorū damnum
 errabimus. Minus tamen ij quàm qui alio sunt habitu
 læduntur. Sed hæc de tempore nutriendi febricitantes
 opportuno, satis sint dicta. Resumentes igitur ea quæ
 hucusque diximus quod reliquum est prosequemur. For-
 mam uictus quam Græci σιμα uocant, à morbi consti-
 tutione, & egrotantis robore sumendam esse diximus.
 Scopumq; totius huius considerationis esse, an ijs quæ
 comeduntur aut ijs quæ ſorbentur, aut bibuntur ægro-
 tantem nutrire, an omnimoda cibi, & potu abstinentia
 uti debeamus, formam esse uictus quærere. Qua inuen

ta, quantitatem determinabimus, à consuetudine primo, deinde à morbi constitutione. In initio tantum esse exhibendum, quantum indicat consuetudo diximus. Deinde, ut symptomata increscunt, ita minuere, ita ut in uigore, et parum ante ipsum, nihil sit exhibendum. Deinde ostendimus secundū Hip. & Gal. unica uictus forma, à principio statum usque, & parum ante ipsum nutriendos esse ægrotantes. Non ut aliqui senserunt crassiori uictu in principio, quam in augmento, & in hoc quàm propè statum. Hancque crassitiem maiorem aut minorem non ad quantitatem solum, sed ad formam uictus referentes. Vnde cibarijs utuntur, & forma, & substantia longe dissimilibus stante eadem morbi constitutione. Cum quibus disceptare hac de re breuitati consulens præmitto. Solum lectores admonitos esse uelim, si Hip. libros diligenter euoluant, unica uictus forma, ægrotantes alere ab initio, acuti morbi ad statum usque inuenient. Porro iam dicta de ea morborum differentia fore intelligenda dictum est, qui ab initio leuiter incipiunt, & summissim increscunt, et exacerbantur ad iudicationem usque in qua abunde elucent. Verum in morbis ijs qui ab initio florent, et uigent maxime, et ad difficilius increscunt, iusta uero crisin imminuuntur aliā fore diximus uictus obseruandum rationē, nempe à robore uirtutis, & à coctione morbi uictus formam sumendam esse. Ita ut cum morbi cruditas affuerit, tenuiter ægrotantes nutrire oporteat. Cunque coctio in materia apparuerit, formam uictus mutandum esse ad crassiorem, quantitatemq; augendam. Diximusq;

DE VICTV FEBRICIT.

in omnibus morbis in quibus procedens coctio sympto-
mata imminuit, hanc uictus rationem seruandam esse.
Cæterum numerum diximus à robore uirtutis, et à mor-
bi constitutione, & à consuetudine sumi. Hæc primum
oblationum numerum indicat, à quo morbus detrahit
aut uirtutis imbecillitas addit. Si ergo quis recte quæ
dicta sunt in singulis uictus scopis percipiat, quat tuor
esse uniuersi uictus indicantia rationem colliget. Nem-
pe uirium robur, morbus, ægrotantis temperamentum,
& consuetudo. Tot enim, & non plura in ijs, quæ dixi-
mus numerauimus. Hacque indicantium uictus ratio-
nem summam, secundum mentē senis esse scito in libro
secundo de ratione uictus ubi ita scribit. Coniungere au-
tem oportet robur, & morbi cuiusque modum, hominis
item naturam, atque ægrotantis in uictu consuetudi-
nem, non in cibis solum, uerum quoque, & in potibus.

C A P. X.

D I V I N V S igitur Hipp. in libris de ratione ui-
ctus, de sorbitionibus, & poculis solum egit, tanquam
eæ solum acutis morbis conueniant uictus formæ. De
ptisana scripsit ut pote quæ leuissima omnium aliarum
sorbitionis est, & acutis maxime conueniens. Ut osten-
dat, quod cum in exhibitione huius committatur error
non paruas inde fieri in acutis noxas, grauiores multo
fore si alijs utamur cibis. Primum ipse ostendit ijs uer-
bis, lubricissima est, sitim maxime arcet, facillime co-
quitur in firmissima existit, si optime cocta fuerit, qui-
bus omnibus est opus. Secundum, ijs uerbis ostendit, si
lateris dolor assiduus est, calidisq; fomentis non remit-

titur sputumque non procedit, ptisanam autem ita affe-
ctis dederit, præcipit aget in mortē. Quod autem ijs si-
milis accidant eis qui alijs cibis utantur, ipse statim
ostendit. Præhendit autem inquit hæc, non solum si pti-
sana intēpestine utantur, uerū, & multo magis si quip-
piam aliud quam ptisana inconuenientius sit edant, aut
bibant. Sunt igitur nonnulla, quæ scripsit Hip. de ptisa-
na iudicia cū alijs cibarijs cōmunia, quædam peculiaris
ipsi ptisanæ. Communia hæc sunt. Cum morbus a prin-
cipio floret, & uiget, ut pleuritis, & peripneumonia
uitāda est ptisanæ sorbitio, & multo magis quæ ex alijs
cibarijs sit, maxime ea, quæ eduntur affectu existente
crudo, sunt enim causa suffocationis, et mortis. Sed tunc
temporis potus humectantes exhibere conuenit. Cūq;
morbus coctionem iam recipit, & sputa procedunt, sor-
bitionem dare licet, et eius quantitas prout morbus ma-
gis maturescat augenda est. Præterea symptomate quō-
cunque superueniente aut periculo, sicut tunc ptisanæ
sorbitio suspectam esse dixit, ita, & omnem alium
cibum qui solidior sit ea. Insuper, et illud commune est,
nempe tempus exhibitio in opportunū, cum calidas ad
pedes descenderit. Præterea incipiendum esse inclinar-
te febre a magis tenui cibo ærotantes alere. Denum
illud, nempe post purgationem medicaminis sorbitio-
nem esse ministrandam, quæ consueta sit minor Pecula-
ria sunt hæc ut ptisana optime appareatur. Nā nisi quis
quantum deest contulerit, ut ptisanæ sorbitio sufficien-
ter pareatur, crebrius sanè detrimentum afferet. Dein-
de illud quibus enim cibus statim inclusus, si quis nō ua-

DE VICTV FEBRICIT.

cuato eo, sorbitionem dederit, dolorem si adest ad au-
gebit, & si non adest protinus inducet, frequentiorque
reddetur spiritus, quod malum est, nam pulmonem
exiccat. Præterea & illud ubi autem quis medicamen-
tum ebibit, ptisanam protinus sorbendam dato. Nec in-
gniter minore quàm consuetum est quantitate. Præte-
rea, & illud nisi propter pharmatiam aut clistere ab
usu ptisanæ desistendum sit. Gal. addit, aut propter san-
guinis missionem, hæc omnia soli competunt ptisanæ
minime alijs cibarijs.

CAP. XI.

IN solis ijs morbis mulsæ utendum est, in quibus præ-
acuminis uehementia morbus peracutus fuerit. Aut ob
aliquem dolorem, aut si periculum instat. In summa
morbis ijs quibus supra sorbitiones prohibuimus, indi-
gentes eo quod pulmonem humectet, & sputum me-
diocriter educat, & tusses mitiget, aut eo quod urinas
abunde cieat, aut biliosa deijciat excrementa, mulsæ eli-
gimus. Meraciore cauentes ijs qui natura calida, & sic-
ca sunt, amare bilis hominibus picrocholi Græce dicun-
tur. Is uero quibus, tumefacta sunt uiscera ob scyr-
rhum, aut ob phlegmonem, immoderato calore bilescit.
Scyrrhus enim impedimento est ne cito ad renes, & ui-
scera transeat. Vnde longa mora in bilem similiter uer-
titur. Picrocholis igitur dilutior exhibenda est, ut citius
penetret. Iis simili modo ministrato in quibus pulmo-
nem magis lenire cupimus, & sputum magis educere.
Meratior uero potentis biliosa deijcit excrementa, ma-
gis tamen suspecta ijs est qui calida sunt natura. Spumo

sa siquidem ijs, & plusquam conuenit biliosa efficit excrementa in bilem flauam transiens. Vnde aduersissimam liquefaciētibus febribus esse mulsam scripsit Gal. in tertio de ratione uictus. Oximelite in ijs utemur morbis in quibus à sorbitionibus supersedemus. Tunc maxime cum sputum crassum, & glutinosum educere uolumus, aut sitim sedare, flatum discutere, & urinas mouere. Proinde oximeli quod ualde acre est, ad crassa sputa, & uehementer glutinosa uim habet. Verum si huiusmodi sputa non secat aut educat, non solum non confert, uerum, & detrimentum affert. Nā exiccans, ea magis reddit crassa, & glutinosa. Aut ergo quod ualde acre oximeli est proderit, crassa si secuerit sputa, & ea eduxerit, aut id si non præstet abunde nocebit. Quapropter recte Hip. dixit nihil mediocriter efficere, in ijs quæ non facile educuntur sputis. Idcirco ægritudinis morigerationem aut malignitatem considerandum esse ait, ut sciamus quibus exhibitum secabit sputa, & quibus non. Iis igitur qui grauius habet, et uiriū imbecillitate laborant, non propinabis. Quod si ob uirium robur de eo bene speraueris, dabis paulatim, & tepidum. Oximelitis nocumenta sunt, hæc quod partem intestini imam reddit humectiorem, & ramenta facit. Vnde imbecilla habentibus intestina exhibendum non est. Est aliquando in acutis morbis, ut ramenta intestini praua ob id sint, quod flatum non modo foras prodire uetant, uerum quoque reuerti faciant. Et ob hæc uires frangūt, extremaq; infrigidant. Qui autem non sorbitionibus sed potione sola utuntur, ijs non semper oximelite uti-

In fine
10. de
metho.
medēdi

K iij

DE VICTV FEBRICIT.

expedit; ob intestinorum ab rasionem, eo præcipue quod stercore uiduasint. Cum igitur sputa, quæ in brōchijs pulmonis contineantur, uel glutinosa, uel admodum crassa sunt, mulsaq; sitim inferat, solo est utendū oximilite. Quare, ut longo usu non noceat, aquæ mulse tantum aceti miscendum est, ut duntaxat sentiri possit. Et ita simul ad lentum ignem coquere oportet. Hoc enim pacto ad nocendum infirmius erit. Sed abunde à nobis de uictus ratione secundum mentem Hipp. hucusque dictum sit.

C A P. XII.

SED tempestiuum est de potu sermonem faciamus qui febricitantibus conueniat. Hunc, omnia, quæ supra ostēdere uictum diximus indicant, nēpè uirtutis robur, morbi dispositio, ægrotātis natura, et cōsuetudo. Vt nos docuit Hip. in secundo de ratione uictus in hæc uerba, προτεμαρτέα δὲ καὶ ἡ ἰσχυρὸς καὶ ὁ τρόπος τοῦ νοσήματος ἐκαστὴ καὶ τῆς φύσεως τῆς ἀνθρώπου καὶ τῆς ἕως τῆς διαίτης τῆς κάμνοντος ἐγμόνον σιτιῶν ἀλλὰ καὶ ποτῶν. Hoc est coniicienda sunt, & robur, & modus cuiusque morbi, hominisque naturæ, & consuetudinis laborantis in uictu, non in cibis solum uerum quoque in potibus. Quibus in uerbis quatuor esse quæ potum indicant aperte docuit. Cæterum si eorum, quæ supra in de qualitate uictus diximus memineris, tria sat esse ad potus indicationē intelliges. Nam laborantis naturæ, ut illic ostendimus, non nisi interuentu consuetudinis indicat. Nam ægrotāti frigida naturæ, potui aquæ assueto, aquam non uinum mini-

strabimus, sumpta à consuetudine indicatione, & non à laborantis natura. Neq; rursus homini calidæ naturæ ægrotanti, aquam in potu dabimus, qui perpetuo uino assueuerit. Hæc ex Gal. octauo de methodo colligimus de calidis naturis, & siccis loquens in hunc modum. Si quis uero, inquit, non adsueuit, scilicet frigida, huic per febrem dare non inceperim, nisi pristina plane sanitate prius reddita. Indicatio igitur à consuetudine, eā obumbrat, quæ à natura laborantis sumitur indicationē, durante morbo. Nec id mirū uideri debet nam maximam uim habet consuetudo, repentinaq; ab ea digressio, corpora non parum offendit. Vt a Gal. scriptum est secundo de ratione uictus. Tria igitur sunt, quæ potum indicant, nempe uirtutis robur, morbus, et consuetudo. Virtus cum ualet, consuetudini in indicatione potus cōsentit, eum maxime potū indicans quē consuetudo. Cūq; imbecillis est, quandoque dissentit, unde fit ut ægrotāti frigida assueto, modicū uini quo eius roboretur natura concedamus. Cuius argumentum est, pluribus, dulce bacchi uenenū, primā labijs admouendi occasionem, de disse ægritudines. Morbus cum magnus est, & uehemēs consuetudini indicationem obscurat. Nam laboranti acuta febre uino assueto, eū ministrabimus maxime potum quem ægritudo indicauerit, uirtute nequaquam dissuadente. Vt ex Gal. nono de methodo colligitur cū de continentium febrium curatione agit. Vbi frigida potum post coctiones exhibet, à consuetudine nullā sumens indicationē. Vbi in hunc modū scribit. Cum ergo coctionis humorū in ijs notas uideris de quibus dictum

DE VICTV FEBRICIT.

deinde in libris de crisi est, audacter frigidam dabis. Et subiungit statim, quod si etiā frigida assuetus ager sit, magna cum fiducia frigidam exhibebis &c. Ac si uelit id quod eodem libro scripsit in hæc uerba. Si quidē cum se e iam uidimus non paucos, ex ijs qui febribus ardentibus præmerentur, cum iam mediocriter concocti humores essent, statim ex frigida potione à febre liberatos, quāuis ei potioni parum assueti fuissent. Multo arbitror magis in ijs, qui assueuerūt, utilitatem fore citra noxam ullam sperabimus. Vnde non ob id quod aquæ assuetus non sit, ab ea desistendum est, nisi cum aliquod effatu dignum incommodum naturæ ab eius cursu timemus. Ob id apposui uirtute nequaquam dissuadente. Idem ab eodem undecimo libro de methodo medendi colligi potest, cum in febribus continuis, absolute citra consuetudinis considerationem, uinum prohibet, & frigidam exhibendam consulit. Imbecilli uero morbo existente, diuersumq; ab eo quem consuetudo indicauit potum exposcente, quæ à consuetudine sumitur præualebit indicatio. Vt manifestum est ex eo quod Gal. octauo de methodo scripsit. Qui cum uinum utilius esse, quàm aquam dixisset, ad coctiones, & urinæ, ac sudorum, prouocationem, statim subiungit. Ego igitur censeo eius generis naturas, et dum ualet huiusmodi potione scilicet aqua magno opere iuari, nec in diaria febre ijs quibus in usu fuit eam circuncido. Si quis uero non adsueuit huic per febrem dare nō inceperim, nisi pristina planè sanitate prius reddita. Ostensum igitur est, quod cum morbus, et consuetudo diuersos potus

inducant, si morbo magnitudo accessit, huius indicatione, obscurare eam quæ à consuetudine sumitur. Quod si morbo nulla effatu digna accessit magnitudo, aut uehementia, scito indicatione à consuetudine tunc præuallere. Cæterum de robore uirtutis, & morbi magnitudine supra abunde dictum est, cum de uictus forma sermonem fecimus. Sciendum præterea quod cum uirtus ob imbecillitatem urget, eum semper indicat potum, quo maxime roborari possit. Qua de causa roborantem potum nuncupamus quem causa roboranda uirtutis ægrotantibus concedimus. Tale in primis uinum est, quod omnium maxime corporis uires naturales, et uitales roborat. Morbus eum indicat potum, qui morbo aut eius causa qualitate contrarius sit. Ob id curantem potum eum dicimus, quem morbus ipse indicat. Est autem talis, acutis, & uehementibus febribus, aqua. Vt ex Gal. in tertio de ratione uictus (licet sub alijs uerbis) colligitur, cum ita scribit. Quando igitur, inquit bibi idonea est aqua, cum scilicet potu solo æger nutritus fuerit, nullo pacto accepto ptisanæ cremore. Tunc enim in potionum aliarum medio, aquam tempestate quis ingerat, & præsertim cum siticulosus æger fuerit. Per illa uerba, potu solo nutritus, fuerit, intelligit, ab aliquo ægrotantem acutorum morborum affici, cuius causa solo uictu per pocula nutriatur. Ac si uelit quibuscunque acuto morbo laborantibus, aquam conuenienter in potum exhiberi. Aqua igitur in primis, potus curans in acutis affectibus est. Vires tamen corporis minime roborat, ut ab eodem loco citato scriptum est cum ait.

DE VICTV FEBRICIT.

Quod autem inquit non alat antea dictū est, quo fit, ut facultatem uitalem roborare non possit, &c. Ab aqua simplici consequenter est ea, in qua uirtus alicuius rei per decoctionem transmissa est. Vt aqua ex decoctione hordei, aut liquiritiæ, aut prunorū, &c. Et sunt tot numero quot sunt res, quæ simul cum aqua decoqui possunt. Est & uinum in aliquibus morbis potus curās. Vt ex Gal. in libris de methodo medendi apparet, & ex Hip. tertio de ratione uictus. Consuetudinem uero eū cui æger assueuerit potū indicare diximus, quæ de causa consuetum potum eum dicimus, quæ consuetudo indicat. Qui unus è tribus est potus, quibus utique terrarū utuntur homines, nempe aqua, uino, Cerulsia. Lusitani aquæ potu delectantur, Galli & Itali uino, Germani, & Angli cernisia. Caterum potus roborans multiplex est. Nempe uinū potēs, quod uinosum Hip. nuncupauit, id tale est, quod in aliquo uehementissimum est. Est & huius cōtrarium quod aquosum ob id medici nuncuparunt quod aquæ maxime, in omnibus simile existit, nempe tenuitate, colore, & odoris carentia, & non manifesta calfactione. Iis omnibus consentit Gal. tertio de ratione uictus in initio. Porro inter hæc multa esse, quæ mediæ naturæ sunt uina comperies. Nos clarioris sermonis gratia, tria inter iā dicta, media locauimus. Vnū quod uehementissimo proximum est. Aliud quod aquoso. Tertium quod medium obtinet locum. Primum ex duobus maxime dignoscere oportet. Nempe ut in mixtione uinum aquā manifestæ euincat. Item ut in eo aliquod sit uehementiæ uestigium. Secundū contraria qualita-

te dignoscēs. Nempe ut in eo aqua euincat, & imbecilliter calfaciat. Ex ijs duobus medium intelliges, nempe in quo neutrum sensibilibiter euincat, & nullū in eo uehementiæ uestigiū appareat. Nos quo facilius res percipiatur, singulis horum nomina imponemus. Vinū uehementissimum, uinosum nuncupamus. Eius contrariū aquosum. Huic proximum imbecille. Eius oppositum potens. Et medium inter hæc. Scire oportet has uinorū species reperiri posse in simplici uinorum natura. Nam quod fuluum colore est, uehementissimum est. Huius contrariū est, quod imbecillitate, colore, tenuitate substantiæ, odoris carentia, & occulta calfactione, aquæ similimum est. Huic proximum, uinum album tenue, sine odore, imbecilli calfactione est. Cuiusmodi sunt uina alba tenuia inodora, quæ in aliquibus Italiæ locis proueniunt. Proximum uinoso est, uinum colore, rubrum crassum, odorum, cum uehementia calfaciens. Cuiusmodi sunt quæ Hispania profert. Mediū, colore sub rubeo est, splendidum, mediocris substantia, modorum, manifeste citra aliquam uehementiam calfaciens. Cuiusmodi sunt uina, quæ ex gallia deferuntur. Posset quisque imitari has naturas, potenti uino aquā pro ratione cuiusque immiscens. Ita ut aquosum efficias si aquæ portioni tantummodo id uini misceas, ut modica fiat, in eo uini representatio. Id enim discimus à Gal. in tertio de ratione uictus in acutis, qui uinum sic tēperauit multa aquæ cōmixtione. Cuius uerba ita habent cum igitur, inquit seni cuidā egrotāti quotidie uinū aquosum exhiberē, quidā ex huiusmodi medicis præsens, me uini mi-

DE VICTV FEBRICIT.

nimum, aquæ insilantē contemplatus risit, ægrumq; uinum nō bibere sed duntaxat uidere dixit. Non sane intelligens, mixtionem uini quod gratia uoluptatis datur, ad aquam aliam esse symmetriam, & aliā esse eius quod ad opem ferendam ministratur. Nam uini omnino minimū ueluti excitationē quandā quæ ad distributionē aquam trahat permiscemur. Vt duntaxat aquæ tollamus sinceritatē, nō autē aquā uinum faciamus. Sunt autem plerique ex sanis qui uinū aqua dilutū bibant, sed in ijs aquam gustatu ipso euincere non oportet. In ægris uero, ut modica sit uim repræsentatio. Sic de oximelite paulo ante dicebat aquosum laudans, &c. Hucusque Gal. quibus in uerbis modum mixtionis aquæ, cū uino ad aquosum uinum efficiendum aperte docuit. Talem in mixtione seruare iubens symmetriā, ut modica sit uini in gustatu ipso repræsentatio. Imbecille efficies si tantum aquæ iniicias, ut uinū imbecilliter calfaciat. Sed ut exactius rē assequi possis, uinum super aquā infundere expediet, subinde labijs admovento, ut cum primum ad metā imbecillis calfactionis deuenierit mixtio, uini non amplius infundas. Simili ratione uinum quod moderatum diximus efficies, tandiu uinum aquæ immiscendo, donec neutrum duorum euincat. Possit qui uis his alia media inserere, naturasq; eorū penes aliquod trium sensuum obiectum diffinire. Sed hæc sufficere omnibus tam ijs qui acuto, quàm ijs qui hebeti sunt sensu arbitramur. Eo præcipue quod reliquæ quæcunque inter has sunt potus differentie haud facile à sensu discernuntur. Potus similiter quo communiter angli

tuntur multiplex est. Nempe uehemens medius, & imbecillior. Discrimen inter hos penes uehementiam, & imbecillitatem, calfactionem, & refrigerationē, & penes substantiæ crassitiem, & tenuitatem habetur. Apud anglos triplex semper paratur potus, nempe aquosus, quem simplicem cernisiam dicunt, medius, quem trihapeninam, potens, quem duplā cernisiam nuncupant. Simplex eosdem effectus præstat quos uinum aquosum. Aperit siquidē, refrigerat, & distributionem adiuvat. Nec decipiatur aliquis credens ob eius amaritudinem calfacere, partes enim quæ cernisiam amarā reddunt, pauca admodum sunt, si ad reliquas conferas, quæ in ipsa refrigerant. Quod colligere ex ratione lupulorum poteris ad aquæ, & hordei portiones. Cito præterea amaritudo à cernisia euanescit, reliquarum uero partium facultas tandiu permanet donec in aliā transmutetur substantiam. Potens cernisia quam duplicem dicunt, potenter calefacit, & quid habet uehementiæ, ut potens uinum. Trihapenina mediæ naturæ est, manifestæ calfacit in nullo tamen uehemēs est. Posset quis duos alios potus efficere mediæ naturæ inter hos, & totidem in cernisia differentias ac in uini natura fecimus. Ut si simplicis cernisiæ duos ciathos uni trihapeninae misceas, medium potum inter duos efficies. Quod si simplicis cernisiæ unum, mediæ unum, duplicis unū, simul misceas, medium potum inter mediam, & duplicem efficies. Vocemus hos quinque cernisiæ potus eisdem nominibus quibus in uinorum naturis usi sumus. Simplicem aquosum, proximū quem ex mixtione duo-

rum confecimus, imbecillem, deinde medium, & huic proximum potentem, omnium postremum uehementem. Simili ratione totidem posses efficere differentias, illius potus quo molliores anglorum utuntur, (Allam uulgari sermone appellant) sunt qui ceruisiam per u, hunc latine dicant. Potus est ultra modum inflatiuus, nullam ex eo febricitantes utilitatem capiunt. Neque enim refrigerat, neque aperit, neque ullam promouet euacuationem. Sed nec sitim sedat. Corruptioni præterea aptissimus est potus. Et uicinos ad similem affectum disponit chimos. Eius insuper substantia nimis prompta est, ut in flatuosos soluatur halitus. Qua de causa capiti, & nervis incommodus est. Materia insuper obstructionum est, unde iocineri, & lieni inimicus est. In summa amicus potus nemini nisi ueneri. Ab ijs tamen qui eo usi sunt bona ualitudine, dimittendus per ægritudinem non est, ut supra ostendimus. Potus quem curantē diximus, nullas tales recipit differentias. Nā cum morbo, aut eius causæ contrarius sit, fieri nō potest, ut per intensiōem alicuius qualitatis, aut remissionē ullas præstet differentias. Oppositio siquidē omnis latitudine caret. Cæterum meminisse oportet uirtutem in maxime, multum, & parum, & nihil urgentem, supra nos explicasse. In totidemq; morbum partitiones una plus diuississe. Nempe in maxime, multum, mediocriter parum, & nihil urgentem. Signisq; in utrisque sectionibus usi sumus, quibus cui uis facile erit, si nō admodū crassa sit natura, cum uirtus, & morbus maxime, an multum, an parum, an nihil urgeant discernere. Pona-

mus

mus igitur primum à consuetudine nihil indicari, hoc est nulla sit is qui laborat astrictus cōsuetudine in potibus, ut si aqua, uino, & ceruisia si uelis assuetus sit, (Vt cōsueuere gētis Lusitanae profugi, qui in Anglia, & Flandria sedem habuere) huic si uirtus corporis sit imbecillis, eum indicabit potum quo maxime seruari possit, si morbus non prohibeat. Talis potus uini est quem uirtutis imbecillitas indicat. Sed quod nam eligemus nondum constat. An aquosum an imbecille an medium. Verum id natura corporis indicabit, ijs si qui dem qui calido, et sicco sunt temperamento, gracili habitu, imbecille vinū conuenit. Iis uero qui frigida sunt natura, crasso habitu, pingui abdomine, tardi, potens, aut vinosum. Quicunque attrabiliosi & mediæ inter hōs naturæ sunt, medium. In sanis igitur corporibus nulli potui assuetis, cū aliqua imbecillitate laborātib. ab ea solummodo indicatio potus in genere sumitur, à naturali uero temperamento species. Quod si nulla imbecillitate eorum uirtutes vrgeant, à sola corporis naturali temperie, potus indicatio est sumenda, Vt in sexto de morbis vulgaribus siue Hip. siue Thessalus eius filius traddidit, calidis naturis refrigerationem, aquæ potionem, tūc quietem, consulens. Et hinc licet colligere ijs qui calida et sicca sunt natura cum robore viriū, aqua uti commodius esse quàm uino, Verum quicunq; calidi & sicci sunt temperamenti, imbecilli natura, salubrius ijs esse aquoso uino in potum uti q̃ aqua. Quia enim aquosum est, calidæ naturæ conuenit. Vt uero uini facultatem habet, imbecillitati subuenit. Vnde ma-

L

nifestum

DE VICTV FEBRICIT.

nifestū est, ut ij qui calida & sicca sunt natura, gracili habitu, tenuium succorum, ob id quod cito eorum corpora in habitū soluantur, & imbecilliores ex inde fiūt, uino aquoso per sanitatem commodissime utātur. Hoc Gal. asseruit octauo de Methodo cum ait uinum inquit ipse conscius es, me omnibus huiusmodi naturis cōcedere, sed quod tum aspectu tum uiribus sit aquosum. Id enim ad omnia utilius est quā aqua, utpote quod concoctionem iuuēt, & urinas ac sudores prouocet. Ostensum igitur est quod seclusa indicatione à consuetudine, sanis corporibus imbecilibus, genus potus à dispositione uirtutis sumendum esse, speciem uero à naturali temperamento. Vbi uero uirtutis imbecillitas nihil indicet, prout cōtingit inculpatis naturis quas semper nisi cum à morbo detinentur robustæ comitantur uires, à sola naturali temperie & genus potus, & species sumuntur. Vnde fit ut corporibus calidis robustis aqua per sanitatem uti, & non uino salubre sit. Anglis & Germanis qui simili ualent uirium robore, & simili sunt temperatura, et quicunq; ijs Borealiores sunt, cū prospera fruūtur ualitudine, trihapeninam cernisiam, quæ medio inter simplicem potum & duplicem est magis conuenire arbitramur. Simplici potu, nisi æstate feruente non utantur. Vinum ijs nisi medicinæ gratia incommodum est. Nam ob frigidam cōtinentis intemperiem, tum ob excrementosa cibaria, tum ob fæculentos potus, crassa in horū uentriculis agregantur excrementa, de genere priuata quæ lōga mora uitiosam qualitatem acquirūt. Iis uinū potens si exhibeas, uitiosos humores

res ad iocinerem & uenas secum defert. Quare ob eorum crassitiē in angustis iocineris meatibus detēti, uias obstruunt. Quę causa est ut coctionem sanguinis perturbent, & deprauent, iocinere ab eis uitium cōtrahente. Quod si imbecilla ijs uina ministres, alterum duorum efficies, aut uitiosos chimos uētriculo magis impinges, aut crudos hos magis reddes. Huiusmodi si quidē uina astrictiōnis, aut quid acetosi habent. Verum medicinę gratia, modicum uini ad secundas mensas ut coctionem uentriculi adiuuet, & cibariorum incoctorum à sole cruditatem emendet suo moderato calore, his salubre est. Quapropter ijs media uina quę nihil uehementiæ habeant commoda sunt. Ceterum cum consuetudo suā præstat indicationē, uirtute sani corporis robusta existente, considerandum est, an propriū corporis temperamentum, eundem potum, quem cōsuetudo, indicet, an alium. Quod si eundem, citra aliam considerationem exhibendum eum esse potum scito, quē simul consuetudo & temperamentum indicarunt. Quod si alium, pugna fit inter duo indicantia. Quapropter ætas inter hæc dirimet. Nam si homo citra annum quadragesimū quintū sit, temperamento consentit. Si ultra consuetudini. Omnis si quidem mutatio magno uiriū robore indiget, quod raro in ijs qui ultra quadragesimū quintū annum sunt, reperitur. In omni si quidem mutatione duo adsunt labores, nempe rei consuetæ demissio, et ad insuetam transmissio, ut ergo quę ab ijs eueniunt incōmoda, quis effugiat, et ut spes sit quę futura sunt corrigantur dāna, certo uiriū robore opus est, quod raro in

L ij ijs

DE VICTV FEBRICIT.

*ijs qui ultra annū quadragesimūquintum sunt, reperi-
 tur. Vnde prouerbiū apud Hispanos est, qui cōsuetudi-
 nem demiserūt propè mortem accesserunt. Neque im-
 merito nā mors & consuetudo è regione habitant: Nō
 possis cōsuetudinis egredi limites, quin patentes mortis
 fores inspicias. Quapropter senibus, consuetis foue-
 ri, melius est. Sed de sanorum potū satis dicta sunt.
 Hoc enim negotium ad speculationem de tuenda uali-
 tudine spectat, quare illic quod reliquum est quære:
 Nos ad egrotantes sermonē conuertamus. Positis duo-
 bus potū indicantibus nempe uirtute & morbo, à con-
 suetudine nulla sumpta indicatione, si uirtus maxime
 urgeat, eū esse exhibendum potū quo maxime laboran-
 tis natura seruari possit, neglecta omnino indicatione
 quæ à morbo sumitur, supra ostendimus de mente Gal-
 cum de uictus forma nobis sermo erat. Quod si multum
 uterq; urgeat & uirtus & morbus, dissentiātq; in indi-
 catione potus, præualebit à uirtute indicatio, nō tamē
 neglecta quæ à morbo sumitur. Sic Hip. in quarto de
 ratione uictus, quibus per febres alius liquida est, &
 mens turbatur, horūmq; multi floccos uellunt, narēsq;
 fodiunt, & parum quidem interrogatis respondent, sed
 ex se nihil quod compositum est dicunt, talia ijs melan-
 cholica esse arbitror. His igitur ita habentibus, si uēter
 liquidus fuerit, absumēnsque & contabefaciens, sorbi-
 tiones frigidiores crassioresque exhibendas esse puto.
 Potūsque qui sistant, uinosioresque, uel etiam astringē-
 tiores. Quibus uerbis descripsisse & uirtutem, & mor-
 bum multū urgentes, ex ijs quæ in superioribus dixi-
 mus*

mus manifestum est. Vinum tamen, non obſtāte delirio concessit in prædicta constitutione causa uirtutis multum urgentis. Apposuit qui ſiſtant, ob alui liquidæ symptoma. Vinosioresq; ob imbecillitatis rationem nō equidē uinosum ijs cōcedit uinū, qui hmoi delirio laborant, sed aquoso uinosius, postremo enim de aquoso uino sermonem fecerat, cum dixit in tertio cæterum uino albo tenui paucifero & inodoro &c. Cum ergo uinosiores potus scribit, ad aquosum conferre opinandum est, & eo maxime quod aquosum uinū in simili delirio cōcesserat, libro tertio in expositione illius cū uero in huiusmodi morbis &c. Imbecille igitur uinū quod aquosum proxime subsequitur ad uinosum uersus, itellexisse arbitror. Sed quod idem rubrū esse oporteat, inde manifestum est, quod in huiusmodi uinorum natura adstrietio reperitur. Ex ijs igitur duobus locis & ex ijs quæ supra in initio huius speculatiōis diximus, licet colligere quantum sit aduersantibus indicationibus à præuolente detrahendum. Quod ut omnibus, inuestigationis modus pateat, tabellam apponemus, ijs inseruientem in quibus uirtus & morbus potum indicant à consuetudine nulla sumpta indicatione. Peracuto igitur morbo, multumq; urgenti, aquam in potum exhibendam esse, uirtute robusta existiēte supra ostendimus in initio huius meditationis. Quod si uirtus parum ob imbecillitatem urgeat, aquosum uinum ministrandum est. Quare picrocholis quamuis acuta febre laborantibus aquosum uinum propinabimus, ob id quod horum uirtutes semper parum urgeant. Nam horum corporū substantia.

L iij facile

DE VICTV FEBRICIT.

facile à leui occasione effluit, ob raritatem pororū, et succorum tenuitatem, & calidam eorum naturam. Sic Gal. octauo de methodo dixit. Vinum uero ipse conscius es, omnibus me huiusmodi naturis concedere, sed quod aquosum tum aspectu, tum uiribus sit. Id enim ad omnia utilius est quàm aqua. Vtpote quod & coctionem inuat, & urinas ac sudores prouocet. Constat autem & Hip. nō in diarijs modo febribus uerum etiā in acutis ex ijs quæ de acutarum uictu prodit uinū dare et c. Ex quibus uerbis manifestum est aquosum uinū in acutis cōcedendum picrocholis esse, ob futura eorū imbecillitatis timorem. Causatius igitur ubi uirtus corporis ob præsentem imbecillitatem parū urgeat, aquosum uinū ministrandum est. Hoc dico puod in omnibus quàm maxime sit aquæ simile. Hoc efficies modici uini multa cū aqua permixtione. Modus sit, ut modica sit uini representatio. Vt legimus Gal. fecisse, qui minimū uini multa aqua cōmiscens id ægrotanti seni exhibuit, ridente alio medico qui forte tunc aderat. Semperq; cum uinum aquosum dixero, tale intelligo, in quo aqua qualitate & uiribus multum in mixtione superat. Vinum uero in gustatu modice solummodo præsenteretur. Quod si uirtus multum urgeat, stante eadem morbi uehemētia, aquoso uinosius exhibere oportet. Tale imbecille fuerit, in quo aqua in mixtione superat, uini tamen in gustatu ipso manifeste qualitas percipiatur. Vt dulcor, si dulce. Adstrictio si austerum & c. Hoc, imbecille supra uocauimus. Sic Hip. loco iam citato, uino si ores potus ijs administrare iubet, quorū uirtute multa

tura

rum ob imbecillitatem urgeant. Signum, quod sic habeant est, fluxus uentris, contabefaciens, absumensq; Quod si morbus parum urgeat, uirtute multum urgente, medium potum exhibebimus. Talem dicimus in quo neutrum sensibilibiter in mixtione uincit. Quod si omnino non urgeat morbus, uirtute similiter habente, eum quo maxime seruari possit uirtus, ministrabimus. Hūc potum quandiu uirtus & morbus similiter habuerint, non mutabimus. At cum duorum alterum in aliud uariauerit, pro ratione mutationis, potū ministrabimus. Sic supra cum de uictus forma ageremus iuxta mutationem indicatū, uictus formam inmutauimus. Nec enim in ea sum opinione, ut credā ab initio morbi posse medicum, uictum & potum coniungere, qui agrotanti per totum morbi decursum exacte conueniat. Dementia est putare posse hominē eo cognitionis peruenire. Sed de ijs abunde in superioribus diximus. Verum nūc hæc ad tabellam reduximus ut facilius habeantur. Per potum, curantē eum intelligo qui morbo aut eius causa sit qualitate contrarius. Aquosum roborantem eū, qui ex roborante & curante mixtus est potus. Sed similem in eo rationem habet ad curantem roborans, ac uinum ad aquam in uino aquoso. Imbecilliter roborās, in quo hic ad potum curantem similem seruat symmetriam, ac uinum ad aquam in uino imbecilli. Reliquorum similis est ratio. Vt si ponas Socratem morbo parum urgente laborare, ac uirtus eius multum urgeat, potum ei potenter roborantem dabimus

L iiij

Tabella

DE VICTV FEBRICIT.

TABELLA HIC INSERVIENS QVIB.

à virtute & morbo potius indicatio
sumitur.

	morbis maxi.	multum	medio criter	parū	nihil ur gens
virtus non	curans	curās, ut aqua	curans	curans	curans
parum	curans	aquosus roborās	imbecil- liter ro- borans	medio- criter ro- borans	potenter roborans
multum	aquosus roborās	imbecil- liter ro- borans	mediocri- ter robo- rans	potenter robo- rans	quo ma- xime ser- uari pos- sit
maxime urgens	quo ma- xime ser- uari pos- sit	quo ma- xime ser- uari pos- sit	quo ma- xime ser- uari pos- sit	quo ma- xime ser- uari pos- sit	quo ma- xime ser- uari pos- sit

Vt

Vt si aquam decoctionis seminis fœniculi Socrati potū curantem diffinieris, hunc uino miscebis tali symmetria ut uinum in mixtione manifeste superet. Cæterū tempestiuū est ut de ijs faciamus sermonē, in quibus assuetudinem tanquam indicatricē contemplamur. Seclusa in primis ea quæ à robore uirium sumitur indicatione. Deinde omnia tria simul in indicationem potus conuocabimus. Nunc quæ in superioribus de consuetudine diximus, in mentem reuocare oportet. Nempe consuetudinem in maximam, & minorē diuidi. Maximam dicimus, ut cū uni duntaxat potui quis insueuerit. Vt Galli uino. Anglorum nonnulli ceruisiæ, Lusitanorū plurimī aquæ. Minorem, cum quis uino insueuit, quia eo bonæ ualeitudini cōsultat, citra aliquod incommodum alio nō utens potu. Eisdem modis dicitur id quod insuetum est. Ad hæc scire oportet quod cum morbus & consuetudo consentiunt, ministrandum eum esse potum, quem indicant citra aliam considerationem. Vt laborāti acuta febre Lusitano cū uirium robore aquæ potui assueti, aquam hordei quam morbus & consuetudo indicant, citra cōtentionem ministrabimus. Quod si pugna in indicatione fuerit, quod uiribus superius est, in indicatione præualet. Nempe morbus si multum aut quā maxime urgeat. Aut cōsuetudo, si morbus parum aut nihil urgeat. Sic Gal. octauo de methodo. Si quis uero inquit frigida non adsueuit, huic per febrem dare non inceperim nisi pristina planè sanitate prius reddita. Rursus ponamus hominem acuta febre laborantem uino assuetum, aqua q; nunquam fuisse usum, quem huic ministra-

DE VICTV FEBRICIT.

ministrabimus potum, morbo aquam indicante, consuetudine fortiter dissuadente, morbus quidem in indicatione ob id quod multum urget praualebit, consuetudine tamen non neglecta. Quinimmo aliquid ei indulgendum est iuxta sententiam Hip. in Apho. id prestabimus si in dicta constitutione potum aquosum consuetum hoc est vinum aquosum ministremus. Sic olim Dionysio patri meo contigit. Laborabat acuto morbo Gallus cunq; de consuetudine quereretur, dixit. se aqua fuisse nunquam usum nisi ad manus abluionem. Qua propter hominem a morbo liberauit, consuetudinem in indicationem potus admittens. Licet ergo morbus multum urgeat, consuetudini dandum est aliquid, hoc est neque totum neque maximum. Neque obstiterit quod aphor. solum de numero oblationum agat. Nam uerus est sermo, etiam in indicatione potus. Vt ab eodem didicimus secundo de ratione victus loco supra a nobis citato ubi consuetudinis ad indicationem potus meminit. Sed quod in tali morbi constitutione non sit plus concedendum consuetudini, hinc manifestum est. Hip. in tertio de ratione victus ita scribit. Cum uero in huiusmodi morbis forte capitis grauitatem uel mentis læsionem suspicatus fueris, a vino penitus est abstinendum. Aquam que tunc dare oportet, uel vinum aquosum, flauumq; & prorsus inodorum &c. In quibus uerbis multum urgentem morbum depingit. Cunque morbus ita habuerit, a vino penitus abstinendum esse iubet. Aquamque tunc dare consulit. Et subiungit statim, uel uinum aquosum prorsus inodorum. Cunque non eadem sit aqua & uinum,

ni,

ni aquosi natura opinandum est, aquam uel uinū aquo-
sum non ideo dixisse, ac si uellet, citra discrimen ullum
trouis æque nos uti posse. Quod ex ijs quæ statim se-
quuntur uerbis manifestum est, cum dixit. Atque ab ip-
sius potione aquæ exiguum super bibendum est, nam
hoc modo uini potentia caput minus tentabit. Cū ergo
uinum aquosum alterius sit naturæ quàm aqua, ab eis-
dem indicantibus utrunque indicari non potest. Cūq;
tria sint, quæ potum indicēt, nempe morbus, uirtus, &
consuetudo, stanteq; eadem morbi constitutione, utrum-
que consuluerit potum, necesse est aut uiriū robur, aut
cōsuetudinem, mutationem accepisse. Proinde cum ob-
seruemus in scriptis suis. Hip. ea semper recēdere signa
quæ uires laborantis imbecilles esse ostendūt, cū ab im-
becilli uirtute capturus est indicationē, fit manifestū,
quod cum scribit aut uinum aquosum, ijs ministrandū
iubet, qui uino per sanitatē perpetuo sunt usi, minime
aqua. Iis fidem præstat, quod quarto uolumine scripsit,
in simili morbi constitutione, imbecillitatis uirium cau-
sas apponens, cum dixit. His ita habentibus si uenter li-
quidus fuerit, absumens, & contabefaciēs &c. In qua
quidē morbi cōstitutione potus uinosiores ut diximus,
ratione imbecillitatis uirium administrare cōsultat. Tri-
bus igitur in locis uinū in acutis Hip. concessisse obser-
uamus. Primo, ratione morbi, ut cū dixit mulsam aut
uinum utrum magis auxiliaturum putaueris. Secūdo,
causa imbecillitatis uirtutis, ut cū dixit his habentibus
si uenter liquidus fuerit corpus absumens &c. Tertio,
ratione consuetudinis. Hoc est quod Gal. octauo de me-
thodo

Primo de
ratione uī
tus.

4. Eiusdē
3. Eiusdē

DE VICTV FEBRICIT.

thodo dixit. Constat autem & Hip. non in diarijs modo febribus, uerum etiam in acutis ex ijs quæ de acutarum uictu prodit uinum dare & c. Ostensum igitur est quod cum consuetudo, morbi multū urgentis indicationi dissentit, eū esse exhibendum potum, in quo minimū sit consueti multum uero curantis. Hunc dicimus aquosum consuetū. Vt uinū aquosum ijs qui uino sunt assueti. Quod si anglo ceruisiæ potui assueto acuta febris accidat, modicum ceruisiæ ei assuetæ multa aqua hordei miscebimus & ei ministrabimus. Sed ut reliqua quisq; in promptu habeat, tabellam secundam apponemus, à qua facile horum singula haberi possunt. Sed illud scire oportet quod quæ de cōsuetudine loquentes hucusq; de frigida potiōe diximus, intelligēda esse cū gratia potus assumitur, nō prout gratia refrigerandi, cū affatim semel exhibetur post morbi cōtiones. Ad cuius exhibitionem à consuetudine nullam sumendam fore indicationem ex Galeno supra ostendimus in locis quæ supra citauimus. Illud insuper aduertere oportet quod quæ de cōsuetudine hucusq; diximus, de maxima, & potissima consuetudine, intelligēda sunt. Consuetudo uero quam minorem nuncupauimus, aliquā nullas habet in indicatione uires. Vt qui aqua in potū non utitur ob eius frigiditatē & fluctuationem quæ ab eius usu percipit, febre acuta laboranti eam ministrabimus cōsuetudini nihil concedentes. Hæc si quidem quæ ab aqua contraxit uitia, immoderato acutæ febris calore castigantur. Quod si insueti potus incommoda à morbo corrigi non possunt, minor cōsuetudo in indicatione potus uires habet,

bet, sed priori inferiores. Sed raro accidit, ut damna curantis potus, à qualitatibus morbi contrarijs non corrigantur.

CVM A MORBO & CONSVETUDINE
potus indicatio sumitur.

	morbis maxime	multum	medio- criter	parum	nihil vr gens
consue- tudo	curans potus	aquosus consue- tus	imbecil- liter con- suetus	medio- criter cō- suetus	consue- tus po- tus

Reliquum est, ut cum omnia tria indicantia simul ad indicationem potus concurrant, sermonem conuertamus. Scire oportet quod cum virtutis imbecillitas, morbi vehementia, & consuetudo, ad indicationem potus concurrerint, accidere, ut plurimum ut duo indicantia in unum consentiant potum. Quapropter conuenientem potum ab altera duarum tabellarum elicies, ad hunc modum. Querere oportet ab altera illarum potum, qui potiori duorum indicantium, quæ in unum consentiunt conuenit. Eidem que addes, aut ab eo minues tertij indicationem. Ut exempli causa laborante Gallo febre acuta, cum uirtute multum ob imbecillitatem urgente, omnia simul,
in

DE VICTV FEBRICIT.

in tali constitutione potum indicantia concurrunt, nempe, uirtus, morbus & consuetudo. Duoq; eorum in unum uini potum consentiunt, nempe uirtus, & consuetudo. Morbus uero utrique dissentit. Quapropter potum quæ res qui uirtuti & morbo multum urgentibus cõueniat talem ex prima tabella imbecilliter roborantem esse inuenies. Tale est imbecille vinum. Huic iuxta indicationem consuetudinis addes. Quare in tali constitutione potum imbecilliter roborante fortiozem exhibebimus, talis fuerit vinum quod imbecilli parum vinosius est, tale Gallo febre acuta correptum in potum ministrabimus. Rursus labor et Lusitanus febre acuta, assuetusq; sit aquæ potui, uirtusq; eius multum ob imbecillitatem urgeat, cunq; consuetudo & morbus in unum consentiant potum, morbo & uirtuti multum urgentib. conuenientem potum quærito talem ex prima tabella imbecilliter roborantem esse comperies, à quo indicationem consuetudinis demam. Quare imbecilliter roborante infirmiozem, laboranti Lusitano potum exhibebimus, tale fuerit vinum imbecilli magis aquosum. Diximus ergo cū omnia tria indicationem potus indicantia cõcurrant; duo ut plurimum in unum consentire potum, siue Lusitanus Hispanusue Gallus, aut Italus, aut Asiaticus infirmetur. Idq; eo maxime quod ij omnes altero duorum potuum nempe uino, aut aqua utantur. Sub aquæ appellatione, eas in quibus semina herbae, aut radices per cocta sunt intelligo, ut aqua hordei capillorum ueneris aqua liquiritiæ &c. Quicunq; enim aquæ potui assueti sunt, ijs potus aquæ hordei insuetus dici non potest

est, & si ea usus fuerit nunquam. Anglis igitur & ijs qui Flandriam inhabitant & superiorem Germaniam Scotisque multoties egrotantibus accidit, ut omnia indicantia in potus indicatione dissentiant. Quin immo quoties Anglus soli ceruisie potui assuetus ob acuta capiatur aegritudine cum uirium imbecillitate, pugna inter omnia indicantia oritur. Morbus si quidem aquam ut curantem potum exposcit. Virtus ob imbecillitatem uinum ut roborantem. Consuetudo ceruisiam ut consuetum. Qua propter tali concursu aut tres omnes miscendi sunt potus, pro ratione indicantium. Aut uini modicum seorsum semel aut bis aut quoties expediat ad roborandam naturam exhibendum est, de inde mixtum ex simplici ceruisia & aqua secundum symmetriam, & morbo & consuetudini correspondentem potum, quoties opus fuerit ministrabimus. Primum modum non approbo, ob id quod non bene conueniant uinum & ceruisia insimul. Multo adhuc minus si uinum ceruisie quam allam dicunt misceas. Conflatur enim ex ijs potus qui facile acescat in sanorum uentriculis & corrumpatur, nedum eorum qui acuta febre laborant. Qua propter secundum modum insequendum esse opinor. Vt potum ijs qui ita laborant in duplicem partiamur. Altero uirtutis imbecillitati & morbo indulgebimus, altero morbo & consuetudini. Vinum uirtutem diximus roborare, sed acuta febre maxime in modum esse. Quare uinum aquae decoctionis hordei & capillorum ueneris aut politrici miscebimus pro ratione primæ tabellæ. Addimus capillarem herbam, ut simul

DE VICTV FEBRICIT.

simul cum hordeo coquatur, vt hordeū à corruptione seruet, & vt ne vini mixtione aceſcat. Secundum componemus, ſi ceruiſiam conſuetū agrotanti potum, aqua hordei miſceamus, iuxta rationem ſecundæ tabellæ. Aqua ſi quidem hordei maxime cum potu vtriuſque ceruiſiæ conuenit. Quare quæ ex ijs mixtio fit, naturæ Angli acuto morbo laborantis maxime conueniens eſt. Hoc præceptū diligenter ab ijs obſeruandum eſt, qui bona valitudine ceruiſia quā allam vulgari ſermone dicunt vtuntur. Iis ſi quidem cum ab acuto morbo capiuntur, incommodiſſimus eſt ceruiſiæ potus. Mutari quidem tunc temporis ad alium conſilium non eſt. Nam vt didicimus à Gal. repentina à conſuetudine digreſſio, corpora non parum offendit. adduximus præterea ſupra ab eodem, agrotantē cui aqua vt dixit cōueniens potus erat, ob inaſſuetudinem tamen per febrem non dedit. Cum igitur ceruiſia incommodiſſimus acutæ febricitantibus ſit potus, ſi quis eo bona valitudine perpetuo uſus fuerit, recte aget, ſi ceruiſia multa aqua hordei commixta vtatur. Iis uero qui ſecunda valitudine medio potu ceruiſiæ vtuntur trihapenniū bīram dicūt, cū à febre corripuntur ſimplici ceruiſiæ potu vti commodum eſt. Diximus ſi quidem hunc potū refrigerare, & meatus aperire. Quare qui ipſo per febres vtuntur, trimeſtrem, defecatum, & quā maxime ſimplicem quærant. Quique ex aqua fluente confeſſus ſit. Hunc quidem in acutis febribus commodiorem ijs eſſe arbitror quā aquam. Quod ſi iam dictorum aliquod deſit, cum aqua hordei hunc miniſtrare oportebit.

re oportebit. . De potus indicationibus abunde à nobis dictum est.

CAP. XIII.

EXPERIAMUR an medici Lusitani in artis operibus methodū Hip. de ratione uictus insequantur, narremusque quam uictus rationem in febricitantibus dietam Lusitani uocant. Si quis febre corripitur, moto statim uentre inferiori per clisteriū, iure lentum aut cocta borragine cucurbitāe & similibus ad sextam diem ducitur. Qua purgante pharmaco adhibito pulli gallinacei iure, & carnibus alitur. In reliquum tempus hunc obseruant uictum, paroxysmorum aut exacerbationum diem cauētes ad morbi solutionē usque. Tenui magis uictu primis ægritudinis diebus utuntur stante uirium robore. A purgatione autem, quam ut plurimum die sexta, aut octaua exercēt, crassiori uictu nempe capi aut pulli gallinacei carnibus febricitantes nutriunt. Id agunt, ubi nullum symptoma occurrat, à prædicto ordine eos perturbans. Hunc modum Lusitani & Hispanorum bona pars insequuntur. Sed ut ostendamus quantum à recta ratione & à mente simul Hip. alieni sint, operæ precium erit eorū audire rationes, & fundamenta, quibus inutuntur, ut his destructis sponte eorum labatur opinio. Ferunt nostra tempestate hominum corpora ob delicias, uenerē, & ob inordinatum uictum, superfluis abundare. Facile enim his de causis accrescere uētriculo, intestinis,

M iocineri,

DE VICTV FEBRICIT.

iocineri, & uenis, excrementa. Communes uocant materias. Has, utpote propriam morbi effectricem causam fouentes, prius soluendas esse iudicant. Quæ in inferiori sunt uentre clisterio, quæ uero in uentriculo, & uenis, tum subtili uictu, tum pharmaco deijciente, quod non solum communes sed & propriam morbi materiã respiciat. Aiunt huiusmodi purgatione quam minorationem nuncupant, laborantes minus periclitari, imminuta quantitate propriæ materiæ. Cuius multitudinem ob iam dictas causas suspicantur. Hip. etiam hanc euacuationem quam inter initia morbi exercent, acceptã ferunt ex in Apho. inchoantibus morbis. Gal. citat dictum Hip. exponentem in hæc uerba. Ad hoc ut citius fiant coctiones, melius in principio euacuare, ut materiam minorẽ redactam, facilius natura coquere possit. Die sexta iudicantes naturam iam sibi separasse ex communibus materijs bonum, parumque expulsionem apparasse, pharmacum ministrant ut naturam minus grauatam celebris die critica offendant. A purgatione uires naturæ roborare conantur. Quam languere suspicantur ob clisteria pharmacum & tenuem uictum. Quare sorbitionem ex iure pulle gallinacæ & carnes eiusdem febricitanti apud sextam ministrant. Ut apud uigorem uires habeat natura, quibus morbo fiat superior. Sed usum sorbitionis apud diem pharmaci, approbant ex Hip. dicente cum autem purgaues, sorbitionibus quibusdam utitor, obseruatis ita febrium accessionibus ut nunquam &c.

Cap.

ED vt ostendamus quantum à ratione hæc uia
 deuiat. Oportebit primum de minoratiua quam dicunt
 euacuatione parum differamus. Nam hanc suspicor
 præcipuam huius uictus occasionem esse. Hinc sumpto
 initio. Quamlibet artem construi, tum ex ijs quæ in
 uniuersum dicuntur, tum ex ijs quæ in partem, quæ sunt
 excepta, ab ijs quæ generatim dicuntur. In singulis præ
 terea artibus duo cõtینگunt errores, alter cum ea quæ
 in uniuersum dicuntur, in partem quis accipiat, alter
 cum ea quæ in partē, in uniuersum esse dicta accipian
 tur. Grauior quidem error hic priore est, summeque
 uitandus in arte medica, in qua crudele profectò erra
 re est. Concocta medicari & mouere, non cruda neque
 in principijs &c. Uniuersale dogma aut si mauis præ
 ceptum tres habet exceptiones. Quarum singulæ secun
 dum partem dicuntur. Nempe nisi sint furiosa. Item
 in acutis passionibus raro & in principijs pharmatijs
 uti. Præterea inchoantibus morbis &c. Horum singu
 la ab uniuersali præcepto excepta esse ex eo intelliges,
 quod dixit nisi sint furiosa. Item in eo in acutis passio
 nibus raro. Præterea in eo si quid uidetur. Cunq; sin
 gulos quos sanandos sumis, initio moueas pharmaco,
 innixus Apho. inchoantibus morbis nonne sententiam
 uniuersalem facis, cum ea Hip. particularē fecerit, in
 eo quod dixit si quid uidetur. At tibi forsā id semper
 faciendum uidetur. Cum tamen mens Hip. si quis rem
 exacte consideret fuerit, tribus affectibus nō oportere
 coctionem humoris ad eius euacuationem spectare.

M ij Nempe

DE VICTV FEBRICIT.

Nempe aut cum motu inordinato, aut qualitate, aut quantitate, aliquod uitæ discrimen afferūt. Primum intellexit, cū dixit nisi sint furiosa, per corpus inordinato motu uagantes humores ab ignobili ne ad nobilē & principem partem ferantur, timor est. Aliquando contingit humorem morbum efficientem adeo quantitate exuperare, ut merito timeat medicus, ne coctrix facultas sit coquendo aut expultrix expellendo. Consulte agat medicus aut uenæ sectione, aut purgante pharmaco, utro magis auxiliaturo putauerit, humoris quantitatem inter initia imminuere. Antequā quæ à pharmaco euenire solet commotio, læsioni sit magnæ. Magis eo lædit tempore, quo iam calore putredinali et actione naturæ humores agitantur. Fit ut ob agitationē boni cum prauis simul educantur. Commotio insuper pharmaci in augmēto morbi causa est additiōis potius quā diminutionis prauorū humorū. Id manifestum quilibet existimabit, si opus naturæ intelligat esse coctiōe media separare bonos à prauis; & qualitatis putridi humoris esse, contactu afficere quibuscūq; obuiauerit, eos præcipuē qui à naturali calido haud commode reguntur. Quod si ijs addas, naturæ vires imbecilliores reddi ex pharmaco intempestiue exhibito, cuius proprium est, multum boni et prauī exiguum euacuare, intelliges quantum mali sit, perpetuo pharmacum sexta die exhibere, ni facile conieceris, humorem quantitate adeo exuperantem esse, ut timeas ne vires naturæ superet. Quod si id indicas, non sexta die sed ab initio morbo inchoante euacuare expedit. Quod uero

uero citant dictū Gal. nempe ad hoc ut citius fiant co-
 ctiones melius in principio euacuare. Perperā de phar-
 macia intelligendum fore contendunt. Nā per euacua-
 tionē, uenæ sectionem intelligit. Hāc in principijs mor-
 borum adhibendam esse ait, ut materiam minorem fa-
 ctam, facilius natura coquere possit. Quod ipse osten-
 dit in expositione Apho. ubi cibus præter naturam
 intrat. Ubi ita scribit ὅτι δὲ κένωσιν μὲν ἀπλῶς εἴωθε λέγειν
 ὁ ἱπποκράτης ὅταν ὁμοτίμως ἅπαντες χυμοὶ κένονται, καὶ θάρσιν
 δὲ, ὅταν οἱ μοχθηροὶ κατὰ ποιότητα μεμνησθῇ χρῆ. Id est
 quod autem euacuationem simpliciter consuevit Hip-
 appellare cum humores omnes æqualiter euacuantur,
 purgationem autem quando mali sunt secundum qua-
 litatem meminisse oportet. Et infra ait, declarans id
 quo maxime humores omnes æqualiter euacuantur.
 Euacuatio inquit, omnium humorū æqualiter quæ ex-
 quisitissima est, fit per uenæ sectionem. Vnde ex ijs mā-
 nifestum est per uerbum κενώσεως euacuationem omnium
 humorum equaliter, quæ per uenæ sectionem fit, intel-
 ligendum esse, & non eam quæ per pharmacum fit,
 quam Hipp. & Gal. καὶ θάρσιν nuncupare consueuerunt
 & non κένωσιν. Sed eundem undecimo de methodo me-
 dendi audi, eadem quæ hic de uacuatione in principijs
 morborum retulit, de uenæ sectione dicentem. Cum
 ergo de uacuatione in febribus quæ à putrido humore
 ortum habent ageret. Saluberrimum, inquit, non so-
 lum in continuis uerum in omnibus quas putrescens ac-
 cendit humor, uenam incidere. Leuata enim naturā
 ab eo quod uelut sarcina premitur, quod reliquum est

M ij

potentius

DE VICTV FEBRICIT.

potentius coquet & expellet. Verbum igitur mouere quod in Apho. inchoantibus morbos est, de uenæ sectione maxime intelligendum est. Aliquando uero de purgatione ut scriptum est à Gal. in expositione. Cum ait si quid uidetur mouere, sunt autem hæc maxime uenæ sectione aliquando uero purgatio. Vnde ex ijs colligi licet, sæpius exercendam esse uenæ sectionem inchoantibus morbis, quam purgationem. At ij contrariū agunt purgationem quibuscūq; in morbis perpetuo inter initia adhibent, uenæ sectionem aliquando. Sed in acutis saltem errorem esse fatebuntur. Nam raro in acutis passionibus expedit in principijs pharmacis uti. Quod si die sexta, aut octaua transactum principium in acutis esse dicant cædo. Sed cum status iam inestet, grauiori noxa naturā afficiant ut supra ostendimus. Ob id enim dixit inchoantibus morbis. In acutis uero quantum periculose sint purgationes tum ob medicaminis qualitatem, tum ob cōmotionem, declarat Gal. quarto de ratione uictus in expositione illius uerum si ad hæc non aperiatur. Tum nō minus oberrores qui perpetuo in huiusmodi purgationibus cōmittūtur, quos magnas in acutis parere offensas ex Gal. supra ostendimus. At uenæ sectione minus errori obnoxia est. Quinimmo nec eius occasionē nec quantitatem errabit doctus & diligens medicus sanguini missioni assistens, sola ex pulsu facta coniectura. Quare in re Dionysius medicus pater meus facile omnes sui tēporis medicos superauit. Perspicuo ex pulsu putridum sanguinem dignoscēs. Quod quam medico possibile sit sensu assequi, & ad opera deducere,

deducere, testabuntur Angli qui mea usi sunt arte, de quo alibi nobis sermo erit. In acutis ergo morbis raro pharmacijs utendum est, nec in eorum principijs, nam commune in ijs præceptum Hip. est uenam incidere, sola indicatione sumpta à magnitudine morbi. Quare Apho. in acutis passionibus raro, exceptio est duorum communium præceptorū, nempe illius quod nobis tradidit quarto de ratione uictus ubi scribit. In acutis morbis sanguinem detrahes si uehemens morbus uideatur &c. Et præcepti concocta medicari. Prout enim inter initia acuti morbi pharmacum ministramus, communē frangimus regulam concocta medicari. Ut uero uenæ sectione non utimur, contra præceptum demittendo sanguine in acutis agimus. Ob quā causam dixit & hoc prius bene dijudicātes facere. Hoc est an pharmacum magis competat phlobothomo, quod quidem ualde necessarium & acuto morbo maxime cōueniens dixerat. Sed quando liceat in acutis pharmacum exhibere alibi ostendemus. Dixit ergo in acutis passionibus raro & in principijs pharmacijs uti, ac si uelit. In acutis raro purgante medicamento utimur, quia ut plurimū sanguinem in ijs mittere maxime necessariū est. Quapropter discernere oportet, an pharmaco uti maiori cōmodo possis, quā sanguinis missione. Cum ergo hæc ita se habeant, fieri non potest ut perpetuo id quod sexta, aut octaua die pharmacum adhibent, recte et secundū rationem ministrent. Vere ita res habet, quod non paucos absque ulla purgatione sanauerim, & multo plures quibus nec quarta, sexta, nec octaua, pharmacum

M iij purgans

v. de mor-
bis vulg.

DE VICTV FEBRICIT.

purgans exhibui, sed in morbi inclinatione, natura in completam crisin faciente. In continuis febribus raro quantū memini occasionē inueni exhibendi pharmacum inter morbi initia, nedum apud incrementū. Febris. n. continua est, quæ proprie & maxime acuta est ægritudo, ut tradidit Hip. Ostensum igitur est purgationē non esse ex usu quæ perpetuo quibuscunque in morbis die sexta aut octaua fit, quare & uictū qui purgationem consequitur. Quod aut de cōmunibus dictum est materijs, nō iusta occasio est à recta deniādi. Quod si ob multitudinem earum nec clisteribus nec syrups digerētibus absumi posse indicat medicus, quod rarum est, potiunculam cassiæ ex oximelite initio dare expedit: aut eiusdem tres bolos deuorandos ei qui potionem fastidiat. A quibus quinque oximelitis aut syrups quem acetosum uocant coclearia deglutire cōmodū erit. Sic. n. bilem & pituitam leniendo educit. Nec erit impedimento quo minus rectam uictus rationem ab initio ad uigorem usque instituas. Sed mihi ad mirari sæpe contingit, quod nostro seculo infælici omne communes materiæ antiquis temporibus non uisæ, comparuere. Aut si erat, non tanti certe habebātur:

C A P. X V.

SED ad reliqua propositi sermonem conuertamus Primis quinq; aut sex diebus febricitantes tenui magis uictu alere, deinde cum morbus propè uigorem est solidiori cibo pascere, omnino præter rōem est. Minus si quidem natura cibo impedienda est, cum morbi uis stimulata, circa morbi materiæ coctionem impensius

us uariat. Vt scite à Gal. scriptū est. Prudens igitur
 medicus ad ciborum coctionem, naturam tunc tempo
 ris ab opere non distrahet. Quinimmo ab ijs quos ante
 ministrabat cibis subtrahet. Vt cibus quacunque leui
 naturæ actione transmutetur. Qui si crassior esset na
 tura alio intenta corrūperetur. Aut certè laboranti
 naturæ superadderet laborē. Omnis insuper mutatio
 disproportionalis si repente fiat, sanis molestā est, qua
 e multo magis ægrotantibus, ut supra ostendimus de
 nente Hip. Cum ergo uirtus laborantis die sexta, aut
 octaua imbecillior sit, quā erat in initio, minus cibi fe
 ret tunc tēporis natura. Quare ut recte mutatio fiat,
 mutare cibum pro ratione ad magis tenuem oportet.
 Quod si aliter, disproportionalis fiet mutatio, nō parū
 naturā agrauans. Ipsa. n. à magis robusta, prout erat
 in initio, ad magis imbecillē, prout est sexta, aut octa
 ua die acuti morbi mutationem habuit. Ratio autem
 uictus contrario, nempe à magis tenui ad crassiorem
 mutata est. Quapropter nullo pacto credendum est,
 naturam posse ex huiusmodi uictus ratione iuuari.
 Insuper mutationes insignes in cibo ab initio morbi
 ad statum usque faciendas non esse supra ostendimus.
 Pessimam omnium & magis grauantem naturā, quæ
 à tenui uictu ad crassum repente fit. Ad hæc, Hipp.
 commentario secundo de ratione uictus aperte dam
 nat eam uictus rationē qua primis ægritudinis diebus
 inaniuntur ægrotātes, deinde ad sorbitiones, antequā
 morbus iudicetur transeunt. Cuius uerba ita haent.
 Melius si quidem esse dico ut protinus à morbi initio
 sor-

1. Aphor.

2. de ratio
ne uictus.

DE VICTV FEBRICIT.

sorbere incipias quàm inanitis euacuatisque uenis, uel die tertio, uel quarto, uel quinto, uel sexto, uel septimo, si ante hoc tempus morbus haud quaquam iudicatus fuerit, sorbitionem inchoare. Præterea ipse eodem libro in expositione illius hoc autem uerius efficaciusque ita scribit. Sed sanè deterius aget, qui omnibus ijs diebus uasa ante examinauerit, & sequētibus quibusdam diebus ita pauerit priusquam morbus maturus reddatur. Nempe hoc pacto mortē plurimis liquido affert, nisi morbus omnino beneficus fuerit. Quæ uero in principio committuntur delicta ea non similiter domantibus renituntur, sed facilius domari possunt. In quibus uerbis aperte nobis ostendit maximum periculum esse in acuto morbo primis quinque aut sex diebus tenui uictu ægrotantis uenas inanire, postmodum morbo adhuc non maturo ad ea quæ comeduntur transire. Ipse præterea eam mutationem damnauit quo ad sorbitionem transitus fit à magis tenui uictu. Cum ait de mutatione quæ in hæc uel illa fit, plurima sum locutus quod re uera hæc nouisse commodissimum sit, cum ad omnium ad id de quo nunc agitur. Nam in morbis acutis ex uasorum inanitione ad sorbitiones transitur. Transeundum quidem præcipio ego sed sorbitionibus haud quaquam utendum, prius quàm morbus ad maturitatē perductus fuerit, aut signum aliquod aliud apparuerit &c. Vides ad sorbitiones transeundum non esse à magis tenui uictu antequam morbus maturuerit nedū à iure lentium aut à cocta cucurbita ad capi aut pulle gallinacæ carnes, quæ crassum uictum constituunt huiusmodi

huiusmodi se habent uictus, quos febricitantibus ministrant occidentalissimi medici. Qui quantum ab eo quod febricitantibus conuenit, aberrant, & à uera Hip. mente satis ostensum est.

CAP. XVI.

MAGIS Anglorum medicorum uictus ratio præceptis artis medicæ consentit. Unica si quidem uictus forma febricitantes ab initio ad morbi solutionem nutriunt. Ius pulle hoc modo parant. Ante diem matant quam crassam elegerunt. Deinde hordeo præparato prunis, passulis, buglosa, endibia, uiolis, & huiusmodi herbis, coquiunt, plus satis, ita ut ius spissum reddatur hac sorbitiuncula non solum febricitantes sed eos qui alijs detinentur affectibus nutriunt. Hunc uictum à morbi initio ad manifestam usque inclinationem ministrant. Antiquorum regulas maiori se cura obseruare ostendunt. Tum quia unica uictus forma à morbi initio ad statum usque procedunt citra per mutationem insignem, tum quia sic agentes læsionem quæ ex uictus formæ mutatione ægrotantibus euenire solet, effugiunt. Secundum ex libro secundo de ratione uictus colligunt. Primum ex Gal. eodem libro in expositione illius interdum autem et cruda &c. Vbi ita scribit uniuersa inquit, hæc contingere his ait, qui perperam cibati sunt à medicis, qui primis diebus exiccatos ægros die tertio, uel quarto, uel quinto, uel sexto, repente ad edulia non peracto morbi uigore permutauerunt. Quasi peracto morbi uigore conuenienter eos uictu permutasse dicat. Quod autem dicebat

DE VICTU FEBRICIT.

dicebat permutare quidem sanorum uictū in morbis, neque tamen temere id agendum, iam patere ex dictis arbitror. Nempe cū una quidem corporis conditio sani sit, altera quæ à morbi initio ad statum usque extenditur. Mox & tertia, quæ ad perfectam morbi solutionem sese prorogat. Deinde & quarta quæ totius conualescentiæ tempus ad usque sanitatis habitū occupat in nulla harum quatuor conditionum permutationem uictus insignem facere oportet, nisi prius in alteram conditionis species peruentum sit.

CAP. XVII.

SED quo magis antiquorum dogmata insequi eo modo conantur, eo grauius Anglos lædunt agrotantes eorū uires exoluentes. Angli animo & corpore uigēt cibi, & potus, multum & crebro ingerere assueti. Assuetudini aut cum aliquid concedendum nos doceat Hip. colligitur non esse dictam uictus rationē quibus cunque in febribus certā, sed nimis tenuem, sumpta indicatione ab assuetudine, regione, & celi temperie. Corpora si quidem quæ multo & crasso utūtur uictu, prospera ualitudine, simplici sorbitiuncula alere, tribus morbi temporibus, haud iustum est. Nam uerendum est ne corporis uires labantur ob defectum. Nec obstiterit quod supra in inuestigatione formæ uictus consuetudinis non meminimus. Nam & si uere formā uictus consuetudo non per se indicet, interuentu tñ uirtutis indicare uidetur. Nam Crasso uictu assueti, tenui si aliquot diebus utantur, imbecilles fiunt. Quapropter supra cum de uirtutis robore quereremus, cōsue-

uetudinis mentionem fecimus. Ita ut eorum uirtutes
ui multo et crasso uictu prospera usi sunt ualetudine,
id parum urgere ac si imbecilles sint, posuerimus.
Regio præterea ad quinquagesimum quartum gradum
uersus boream uergens cum frigida ualde sit, calidum
matum intra uiscera colligens fortius reddit. Vnde
rassiori indigent alimento, tum ob hoc, tum ut frigori
continentis ualidius obsistat. Quod autem à frigida
regione similis sumatur indicatio ac à frigido tempo-
re, ex eo fit manifestum, quia uires ualidas similiter ef-
ficat, & consimiles in corpore humano creat humores.
Sed hyberno tempore multa quidem propter robur ui-
rium & raro danda sunt. Vt scriptum est à Galeno in
expositione Apho. quibus semel aut bis. Consimiliter
igitur ijs qui frigidam regionem incolunt, plus cibi quam
quod morbi natura exposcat, ministrandum. Illud re-
gioni & consuetudini concedentibus medicis. Gaudere
enim semper naturam consuetis dixit Gal. octauo de
Methodo ex autoritate Hip. Sunt præterea quamplu-
rimæ acutarum ægritudinum quæ adeo tenuem uictum
non ferant. Præter acutas febres quas tropicas appelli-
tant medici, quibus non competit, sunt et quæ die unde-
cima, & tertiadecima, et quartadecima terminantur,
quibus perscriptus uictus non est ex usu, non Italo, non
Hispano, si aliqua supra dictarum febrium specie labo-
ret. Cum uterque eorum partius secunda ualetudine
uiuat. Quod si febrem ponas esse ex ijs quæ longiorem
habeant terminum, recte profectò colligetur Anglos
ægrotantes à tenui uictu grauiter ladi. Ea si quidē im-
pense

DE VICTV FEBRICIT.

penſe grauis noxa non eſt, qua morbus uires aſſumit,
ſed quæ uires, quibus natura morbo oppugnat, adimit.

CAP. XVIII.

SED non deerit fortasſe errandi occaſio. Anglos
bona ualetudine inordinato aiunt uti uictu, uentresq;
eorũ ob id crudis humoribus redundare. Hos cũ agro
tant tenui uictu abſumi oportere iudicāt. Fouent enim
inquiunt propriam morbi effectricem cauſam. Sed res
aliter habet ut exiſtimo. Ventres anglorum non crudis
ſed prauis aut ſemicorruptis humoribus abundare opi
nor. Quod ſi crudos eos dicas, quos natura non euin
cit cædo, & appellationem non moror. Sed eo modo
quo Hip. ſolet, cruda nũcupare excrementa, nempe fla
uam bilem & reliqua quæ corpus alere non ualent.
Eos prauos eſſe dico, qui poſt coëctricis facultatis actio
nem nutritioni permanent inepti, cõſimilem à natura
mutationem recipientes ac excrementa. Eos ineptos nu
tritioni ſignum eſt, quod ieunium haud facile ferant,
quorum enim uentres crudis abundant humoribus nu
tritioni aptis facile ieuniũ ferũt, ſiue aſſueti ſint mul
tum aut parum ingerere. Vt ſcite ſcripſit Hip. in hæc
uerba, nō aſſuetam inquit cibi abſtinentiam, facilius o
mnino ferunt, qui parte ſuperiori pituitoſi ſunt. Quo
fit ut, ſi ſemel die, cibo utantur, facilius etiam ferant.
Rationem aſſignans Gal. ad hunc modum ſcribit. Pitui
ta uero temporis proceſſu coquitur, ſanguisq; effici
tur. Vnde facilius ieunium ob pituitæ in ſanguinẽ con
uerſionem ferunt, id longa docente experiẽtia. Augu
mento ergo dialeçtico, quod à negatione conſequentis
dicunt,

2. de ratio
ne victus.

dicunt, perspicuo apparet, eorū qui ieiuniū difficulter
ferant uentres carere humoribus aptis, ut nutriant.
Vnde manifestum fit humores quibus eorū uentres abū
dant, alimonie aptos non esse. Ratio vererem ita esse
ostendit. Et si hæc sola si satis, ut de re certa habeatur
scientia, alia adducemus obiter signa ut pusillanimes
ad rem percipiendam confortemus. Cum humores in
uentriculo contenti, laudabiles sunt, halitus qui ab ijs
ad caput feruntur humidi sunt nullusq; prauæ qualita
tis participant. Cunque per poros capitis & faciei ef
fluunt, nulla in transitu particulas extranea afficiunt
qualitate. Cum vero parui fuerint, & uentriculo diu
insederint, necesse est partes eas quæ ab eo per consen
sum affici solent, similiter afficiantur. Facies igitur ha
litus à uentriculo ascendentis qualitatem haud obscu
re indicat. Corpora igitur Anglorum si circumspectas
pulchra esse videbis, alba & leui cute eorum membra
obduci. Faciem vero eorū quorum uentriculi crudo
rum humorum congerie grauantur obscura rubedine,
pustulis conspersam, lacera multis in locis cute intuebe
ris. Similem in quo videas faciem crudisq; humoribus
grauari eius uentriculū quem iandiu conquerentē au
dias nōne recte colliges cōiectura habita ex facie eius
humores prauā naçtos esse qualitatem lōga in uētriculo
mora. Halitusque inde ascendentes, faciem inficere.
Vt id calido iocineri quis tribuat, sanguinē biliosum ef
ficienti talēq; ad corporis particulas mittenti, fieri ne
quit. Nam cū materia quæ totū nutrit corpus, à natu
rali mutata est symetria, necesse est ut singulæ corporis
par-

DE VICTV FEBRICIT.

particulæ ledantur cum facie. Quod si adhuc insistas. Sanguinē biliosum aut magis natura exaltaetum, facilius ad superiora uergere, cædo. Sed fieri nequit temporis longitudine ad totum corpus quæ uitiū permeet. Id præterea senibus crebrius accidere quàm iuuenibus uidemus, quibus minus causæ est quod biliosum generent sanguinem. Ventres tamen eorum crudis abundare humoribus non extra rationem est. Verum est quod quibuscunq; talis facies futura erit humorum in uentriculo congestorum occasione, immoderato opus est calore, tum ut humores corruptioni disponat, tum ut ab eis fumos educat halitus, qui faciem maculent. Senibus igitur immoderato uini usu immoderatum calorem intra uiscera excitante, talis generatur facies & non ratione calidi iocineris. Quibuscunq; igitur talis affectus accidit materiam à uentriculo prauæ qualitatis suppeditari, calorē uero efficientem uel ab iocinere uel ab ipso uentriculo adscititiū certū est. His fidem præstāt, cibos & potus quibus utuntur, aptissimos esse ut in uentriculo corrumpantur. Vino & ceruisia quam allam uulgaris sermone dicunt ad unam mensam utuntur. Potus. n. ceruisiæ, cum statuosus natura sit, uini consortio magis inflatiuus redditur, ita ut caput magis impleat & feriat. Butyro præterea salsis cū piscibus uescuntur. Ita fit ut aduersantibus ciborū & potuū dissimilibus qualitatibus, tota mixtio corruptioni fiat obnoxia. Rōne igitur quispiam asseret, eos non crudis solum, sed & uiosis abundare humoribus, minime ad nutritionē aptis.

Audi

AUDI quo rem deducam. Aegrotantibus Anglis tenuem uictum ministrare medicos ob id quod eorum uentres crudis redundant humoribus quos ita absumi sperant, errorem esse arbitror. Victu tenuem ministras ut humores in uentriculo redundantes absumas. At ij cum à propria mutati natura, prauamque naeti qualitatem, nutrire non ualeant, ut ostendimus, fit, ut prauos humores morbum efficientes natura (alioquin multum temporis uentriculi coctioni impendere assue ta) ad expulsionis opus parante, alter naturæ hostis insurgat, ipsam multitudine & praua qualitate & ob sedis nobilitatē grauer perturbans. Præter id quod à propria morbi effeetrice causa laboris patitur. Quod si naturam duplicis hostis in cursu grauata, uiriumq; robore indigentem, accedens medicus contra consuetudinem agens, tenuem uictum offerat, spontemq; reddat imbecillio rem, nonne merito non medicus sanans sed occidens, non adiutor natura sed egritudinis dicitur. Sed ut nulla aduersario super sit spes, constituamus hominem ex corruptione humorum ægrotantem, cum robore uirium. (Corruptos humores eos dico qui à natura propria migrantes nutrire non ualent. Quales Anglorum esse supponimus, qui diu uentriculo insederunt.) Sumpta solummodo ab ijs indicatione, parū an multū raro aut crebro huic cibum offeres. Medicus Anglus modicum iuris pullæ gallinacæ conuenientibus herbis decenter temperati bis aut ter in die ministrabit. Aut quam dicunt hyposetalam. Aut analberi, aliud sorbitionis

DE VCITV FEBRICIT.

tionis genus, quæ parum alimenti præstant. Quid si Gal. audias contrarium dicentem, nonne deinceps mutabis sententiam & Anglos in posterum ægrotantes crassiori victu ales. Ille igitur in espositione Aph. qui bus semel aut bis ita scribit εἰ δὲ μετ' ἐνδείας ἢ διαφθορὰς ἢ δυνάμεις ἔρρωμένοι τύχοι, καὶ πολλὰ καὶ πολὰς σιτία τοῖς νῦν κάμνουσι δόσομεν, ὥς ἂν καὶ τῆς διαθείσεως δευμένης πολλῶν καὶ τῆς δυνάμεως κρατῇ αὐτῶν δυναμένης. Hoc est si cum indigentia aut corruptione facultas robusta fuerit, & multa, & multoties cibaria ita laborantibus dabimus. Ut pote multa exigente dispositione & facultate illa uincere potente. Sentis ne dispositionem quæ ex humorum corruptione accidit, non modicum cibū indicare. Sed eundem in eodem audi dicentem. Si facultas inquit laborantis imbecillis fuerit, & ea quæ in corpore est dispositio ex corruptione sit uel indigentia, paucum alimenti his, & sæpius dabimus. Parum quidem quia semel totam multitudinem alimenti sustinere nō potest facultas debilis. Sæpius autem quoniam multis indiget dispositio. Indigentia si quidem adiectione indiget, corruptio uero epicrasi. Hos enim qui cum virium imbecillitate corruptione humorum laborant, docet Gal. curare in lib. de Metho. medendi, paulisper noxios humores vacuando, & decenti victu laudabiliores semper apponendo. Curationē hāc per epicrasim fieri nuncupat. Quod cū viriū robore, & corruptione humorum, hominem crebro multū cibi & potus assuetum ingerere, ponas, præter hæc, in regione frigida qualis est Anglia,

iudicas ne hunc exiguo & tenui uictu alendū fore an
 multo & crasso, indicationibus tribus in id consentien-
 tibus, nempe corruptione humorum, consuetudine, &
 regione. Ego quidem multum ijs & crebro exhibendū
 esse arbitror. Nisi obſtent paroxiſmorum aut exacer-
 bationum inuaſiones. Quod ſi contingat, rarius multū
 ijs miniſtrare oportet. Nec hoc præter mentem Gal.
 eſt, qui in expoſitione dicti Apho. ita ſcribit ſi uero ac-
 ceſſiones nō permiferint nec multi alimenti offerēdi oc-
 caſiones præſtiterint, raro plura exhibebimus, ſic qui-
 dam tranſtulit. Aliter tamen habet græcum exem-
 plar nempe. Μηδὲ πολλὰς τῆς τρεφῆς ἡμῖν καιρὸς παρέχον-
 ταν ὁ λιγὰκις δώσομεν τὰ πολλὰ, hoc eſt neque plures ad
 cibum offerendum occaſiones habentes raro plura da-
 bimus. Et uere ita res habet, nam acceſſiones non ſolēt
 plura cibrationi opportuna tempora præſtare, præcipue
 ſi longæ ſint. Velim quiſquis hæc legerit ſibi perſua-
 deat, me hæc ſcribere, non ut in medicos Anglos inue-
 har, ſed ut ueritatē omnibus aperiens, ſimul & Anglis
 amorē quo eos hucusq; proſequor oſtendam. Daboque
 operam ut abſens, calamo efficiam, quod præſens apud
 uos præſtabam. Clariffime uir Thomas Aldea totius
 Angliæ cancelarie digniffime unicum Anglorum De-
 cus, Ioannes BaKeri primitiarum cancelariæ humaniſ-
 ſime, in paternarum legum peritia prudentiffime, recti
 immobilis trutina, uobis hæc commentaria de uictus
 ratione conſcripſi, ueſtra gratia tueamini. (Scio nō de-
 erunt detractores) ſpeculatio tamen cū hominibus ex
 uſu maxime ſit, ſi ueſtra gratia apud Anglos commen-

N. ij detur,

DE VICTV FEBRICIT.

detur erit, ut ad hominū manus libellus ueniat, legatur, quod reliquum est speculationis utilitas præstabit. Hoc quicquid est uobis dicare decreui, ut beneficiorū animum meum nunquam immemorē ostendam uobis. In quibus uirtutū singulare exemplar situm esse scio. Beatam rem publicam in qua ad honores tales euehuntur uiri. Sed beatissimā si uos ad magistratus culmem euectos, diu substitutes foveat. Sed ad reliqua propositi redeo. Obijciat nobis *Anglus medicus* illud *Hip.* non pura corpora quantuncunq; nutries magis lædes. Qualiter ergo eos qui ex corruptione humorum laborant adiectione indigere asserimus. Prauos humores aliquādo in uentriculi capacitatem cōtineri, et quandoq; inter eorum tunicas, et eorum aliqui crassi & lenti sunt, aut tenues, quandoque quiescentes, uentriculo inherere, aut mouentur intra eius capacitatem. *Hipp.* sermo de ijs est qui in spatio uentriculi, aut in uis per quas commeatibus humoribus continentur. Qui in prædictis locis tumultuantes praua qualitate cibum nuper aduenientem corrumpunt. Vnde fit ut cibo talia non corroborentur corpora. Nobis uero de ijs qui intra uentriculi tunicas crassitie & lentore pigri continentur, sermo est. Quorum causa non est quod corpus non nutriatur: Sed aliter dicamus. Posito uirium robore in duobus æquali, & paribus cæteris, eorū alter corruptione humorum laboret, alter ex multitudine eorum qui laudabiles sint. Cui nam eorum plus cibi concedas. Ego quidem sentio cum *Gal.* corpus humorum laudabili multitudine grauatū, multū iuuari inedia, aut modico cibo.

bo. Alter uero ex his deteriore fieri. Nam corrupto-
rum humorum praua qualitas naturæ uires dissoluit.
Quare in ediam si his aut tenuā uictum iniungas, mul-
tum profectò imbecilliorē reddes. Quia tamen eueni-
re potest ut ob prauā humorum qualitatem cibus corru-
patur, præsertim cum in uis cibi fuerit adhibere pur-
gationem consulit; antequam reficienti uictu conuale-
scentiam corpora nutriamus Hip. causam reddens qua-
re corpora eorum qui cibum assumpserunt non corro-
borentur, ait, quod eorum corpora nō pura sint, uacua-
tionēque indigeant, ut corpus sumpto cibo corrobore-
tur. Nobis uero in præsentī de ijs sermo est qui intra
uentriculum diu inherentes nutritioni corporis non ob-
stant. Quod ex eo manifestum est, eos non obstante hu-
more uentriculi, ex cibo & potu inuari. Quod argu-
mentum est, aut humores intra tunicas uentriculi esse,
cibum aduenientem nō tangentes, (cui adhæreo sentē-
tiæ) aut si in capacitāte uentriculi sint, ob eorum pi-
gram crassitiem & lentorē haud quaquam posse adue-
nientem cibum multum inficere. Corruptio igitur hu-
morum non indicat inanitionē ut arbitratus est oriba-
sius in expositione Apho. corpora non pura. &c. Sed
potius cibi adiectionem; ut manifeste à Gal. scriptū est
in fine dicti Apho. quibus semel aut bis. Autumno ue-
ro, inquit morbi qui ex corruptione fiunt assimilantur.
Quapropter qui eo febricitant tempore continua opti-
mi indigent adiectiones, & si uires ualidæ fuerint sæpe
& multa, si uero imbecilles pauca & sæpius asseremus.
Anglis igitur cum humores ij qui uētriculis eorum in-
N ij hærent

DE VICTV FEBRICIT.

herent & crassi sint & lenti aut inter ambas uentris
tunicas collecti, aut certe quiescente, non est quod te-
nuis uictus ministretur. Quinimmo danda est opera,
ut cum huiusmodi corpora febre detinentur, aut alio
morbo, uires eorum quoad fieri possit seruemus. Vt na-
tura, multitudinem humorū manuteneat. Si. n. ob im-
becillitatē imbecilliter eis dominetur, facile in eis febrili
concepitur calor, ob prauā eorum qualitatem. Vnde
fit ut præter propriā morbi materiā, aliam denuo mor-
bificam causam suppeditet uenterculus, prima multo
tenaciorem, & sæuiorem. Caute ergo cum ijs agendum
molliterq; tractanda sunt huiusmodi corpora, & cras-
siori uictu quā pro morbi ratione sunt alenda. Eua-
cuatio etiā talis adhibenda his est, ut propriam morbi
materiam solum respiciat, incommotis ijs qui in uen-
triculo commorantur humoribus. Hos enim securius
bona ualitudine tractabit medicus. Hoc meo discrimi-
ne didici, crassiori uictu hmōi corpora alere, & leuius-
culis purgationibus subducere, in quorum uentricu-
lis multitudo frigidorum humorum diu congesta est.
Semper diligenter præcauens nequi in uentriculo sunt
humores morbosam affectionē cōcipiant. Tribus ergo
indicationibus in crasso uictu consentientibus, iudicas
Anglū exiguo & magis tenui uictu, posito morbi acu-
minē æquali nutriendum quā Hispanum aut Italum.
Ego quidē arbitror crassiori & ampliori cibo Anglos
indigere. Scioq; optimos quosque medicos probaturos
sententiā meam. Nā nullam mihi legitimam reddes ra-
tionem ob quā causam magis tenui cibo, & eius mino-
ri

ri

ri copia egrotantes Anglos nutrias, posito æquali morbi acumine quàm Hispani medici egrotantes Hispanos, aut Itali Italos, qui alioquin magis tenui indigeret, tū ob calidam regionē tum maxime ob id quod partius secunda uiuunt ualitudine. Manifestum igitur est hunc uictum Anglis uirium esse detrimentum & labefactionem maximam. Nec illa iusta errandi occasio est, ob fugiendam mutationem in uictu, febricitantium robur simplici iure multis dieb. absumere. Profectò grauior error est, quo naturæ uires exoluimus, quā quo morbo fomēta ministramus æque urgentibus uirtute & morbo. Nec omnem damnavit Hip. mutationem quæ in uictus ratione apud egrotantes fit, sed solū repentinam & disproportionalem ut in superioribus dictum est. A tenui igitur uictu egrotantes Angli grauiter leduntur. Cuius argumētū est sudores qui nō raro his, per febres circa caput & collū accidunt. Quorū causa præcipua, uiriū est imbecillitas & nō morbi acumen. Nam huiusmodi sudores in acuta ægritudine & in mitiori contingere solent. Vt ab Hip. scriptum est cum de sudoribus qui circa caput & uultum & ceruicem fiūt loquitur. Quos in acuta ægritudine & mitiori posse contingere ait. Imbecillitas uirtutis ergo est quæ præcipue hos operatur sudores & non morbi acumen. Anglis igitur hoc crebrius per morbos accidere quā sibi uicinis Gallis Hispanis aut Italis à duabus causis nempe, ob uictus tenuitatē & eo quod cubiculis aërem uelut carcere occludunt euenire putandum est. Tenui si quidem uictu cito labuntur corpora multo cibo assueta.

i. præi-
tionum.

N iij

BRUDI

BRVDI LVSTITANI
DIONISII MEDICI


FILII

DE VICTV FEBRICITANTIVM

AD ANGLIOS.

LIBER TERTIVS.

CAP. I.



ED tempestium est, ut de victu agamus qui singulis febribus conueniat. Exemplis si quidem manuducere lectorem oportet, ut facilis fiat sermo. Causus cum à biloso ortum habet humore si cum robore ui-

rium adsit et ager tali sit habitu, ut non facile exoluitur, potu nutriatur, ut dictum est. Hordeum mediocris ætatis plenum, album, exutumque ab utroque cortice coquito in aqua fontis, quæ aut coctione aut longa mora residentiâ fecerit. Sit que hordei pars una aquæ partes viginti. Bulliat tandiu, ut infletur hordeum & rumpatur. Collatum propina cum opus fuerit. Hic potus erit egrotantis uictus. Quod si sitim non sedat. Preparato eundem potum & hora una antequam ab igne amoveas recentes violas mediocris magnitudinis insi-

Aqua hor
dea.

Aqua hor
dei cum
uirtute
uiolatum.

simul coquito, à collatura parū zucari misceto. Eli-
to pruna cuius sapor medius sit inter dulcem & ace-
sum, ita ut nulla participant adstrictione. Coquan-
turque in aqua quæ prius per se ante ebullierit, sitque
runorum pars, una aquæ partes duodecim coquantur
andiu, ut pruna tumescentia rumpatur. In eadem te-
sta qua cocta sunt potum seruato. Dato cum modico
zucari ubi oportet. Aquam per se coquito ad tertias,
cunque subsidentiam fecerit ad aliudque uas collatam
effuderis, syrupi acetosi imbecillioris partē unā, aquæ
partes quindecim misceto ad lentum ignem spumā au-
ferendo tandiu ut permisceantur adinuicem. Quia ue-
ro non omnibus una placet mixtio, consulto ægrotantis
palato prædictum syrupum magis aut minus acrem ef-
ficito, plus aut minus aquæ miscens. Idem cum syrupo
violarum efficies, si tibi cōmodum uidebitur aut alijs.
Quod si de viribus ægrotantis non fidas, ut solo potus
perdurare possit ad crisis horam, aut & si in presenti
vires constent, nihilominus times futuram imbecillita-
tem, aut quia homo raro habitu est, aut consuetus alio
quin multum ingerere, horū uerique talem exhibebis
victum. Aquam hordei ut supra parato tandiūq; hor-
deum coquito ut rumpatur, lintheo raro hordeum su-
scipito, fortiterque exprimito, ita ut totam hordei me-
dullā exire facias, hanc multa aqua hordei misceto ut
tenuis fiat sorbitio, est cū paucō zucaro exhibito. Sy-
rupi acetosi acris si tantum misceas ut aliquid acetosi
habeat iam dicta sorbitio, faciasque ut modicum bul-
liat, optimum cibum huic febris efficies. Idem cum pru-
nis

Decoctū
prunorū.

Potus ace-
tosus.

Pisane te-
nuis sorbi-
tio.

Acris pi-
sanæ sorb.

Panarella
acetosa.

DE VICTV FEBRICIT.

nis efficere possis. Micam panis mediocris ætatis à fure
sinceri ad paruulas partes radito, in aquam infun-
dito frigidam, digitisq; confricato terq; aquã in noua-
to, deinde coquito in aqua hordei uiolacea, cunq; utrũ
que permixtũ fuerit, infunde succi granatorũ acetoso-
rum & zucari singulorum tantum ut ægrotantis pala-
to placeat, iterum coquito ut misceantur, fac ualde te-
nuem sorbitionẽ multa aqua panẽ diluẽs, quã ijs dabis,
quorũ uirtutes ob imbecillitatẽ parum urgent. Hip. de
curatiõe huius febris agens, aqua mulsæ coctæ & a quo
se quantũ æger uoluerit concedit. Hocq; potu ægrotan-
tem ad crisis horam ducit. quod manifestum est ex eo
quod in hunc modum scribit. Et sorbitiones, inquit nisi
dies indicatorij transierint non dabis. Sub audies cum
Gal. si uirtus ægrotantis robusta esse uideatur. Zucarũ
usum mellis præstat. Efficariorem tamen uirtutem mel
habet. Zucarum utpote temperatius ad causi curatio-
nem magis probandum. Antiquorum ætas eo carebat,
& si sacharum tunc non deesset.

CAP. II.

Q V O D si causis à materia pituitosa salsa
fuerit, crassiori uictu alendi sunt ægrotantes. Nem-
pe sorbitione tenui. Potus non erit ijs uictus ido-
neus. Quare sorbitionibus in hunc modum, uteris, si
uirium adfuerit robur, habitũsque talis sit ut non fa-
cile corpus effluat, parceque sit assuetus uiuere se-
cunda ualitudine. Sorbitionem ex hordei medulla
cum syrupo acetoso eo quo supra dictum est modo præ-
parato. Acrem ptisanæ sorbitionem appellauimus, ad-
ministra

istra ubi oportet. Eam insuper sorbitionem quam
 panica panis ter loti scripsimus, acetosam panatellā
 mus preparabis, addito loco succi granatorum sy-
 acetoso acri, hunc dico qui plus aceti recipit, Hūc
 um intellige ijs conuenire qui maligno causo nō la-
 at. Discernitur cum malignus est, ex assidua extre-
 rum frigiditate, de ijs infra agemus. Iis ergo qui cau-
 pituita salsa laborāt, sorbitionem dato ex hordeo
 pane modo predicto bona syrupi acetosi quantita-
 niecta, ita ut palato effatu dignam offerat repræsen-
 tionem. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut fu-
 imbecillitatis suspicionem præstet corporis habi-
 , aut cōsuetudo, aut si alius ab initio liquida fuerit
 rpus absumens (hoc. n. symptomate solo posito, uirtu-
 n multum urgere supra diximus) talis cōmodus fue-
 uictus. Pullum gallinaceum qui matrem insequitur
 guem coquito ad lentum ignem recenti testa, pruno
 m & hordei preparati quantum singulorum manu
 pi possit, aquam sufficientem infundito, mali deinde
 anati accidi grana quantū manu capere possis proj-
 media hora antequam pullum ab igne moueas. Sūt
 ni tandiu pullum ad ignem coquunt donec hordeum
 mpatur. Huius decocti portionem seruato ut agro-
 ni exhibeas, cum tibi opportunū uidebitur, ex resi-
 uo decocto cum pane in aqua frigida ter infuso sorbi-
 onem facito. Dato quando oportet ei cui alius liqui-
 a fuerit. Ceterum scire oportet causam cum à salsa
 ituita generatur, si cū aluo ab initio perturbata fiat
 ires naturæ multum absumere. Quapropter uictu
 crassiori

Decoctū
 pulli ex
 granato
 acetoso.

DE VICTV FEBRICIT.

crassiori eos indigere qui huiusmodi causo laborāt. Præsertim si habitu, sint raro & assueti multū ædere. Natura si quidem huiusmodi causo laborantis symptoma ptū prauitate: & humoris contumaci resistentia coëcti facultati repugnantis, exoluitur.

CAP. III.

H I P. iubet attractorias exhiberi sorbitiones. Sed quid sibi Hip. uelit per illud uerbum attratorias dicere non facile est. Præcipue cum Gal. uerbum absque interpretatione reliquerit. Græce ita habet *ροφήματα ἐπισπαστικά διδου*. Hoc est sorbitiones super attratorias dato. *ἐπισπαστικά* composita dictio est à præpositione *ἐπὶ* cuius officium est dictionis significato aliquando aliquid addere. Vt Hip. infra *ὅνδε λαπαρῶ ἔονται καὶ σπαστικὰ ἐπιγίνεται*, hoc est causus superueniat. Aliquando idem ualet quod apud latinos. In. Vt cum idem ait *τὸ ἐξωθεν πνεῦμα ἐπάγισθαι*, hoc est exteriorem spiritum inducere. Vul. Hip. ut sorbitiones attrahenti pharmaco misceamus. Pharmacum enim sorbitione mixtum, melius nuncupare non potuit, nomen ab utroque simplici compositum efficiens, nempe sorbitiones attractorias. Quod autem antiquioribus consuetum fuerit medicis, in sorbitionibus pharmaca miscere, manifestum est ei qui antiquorum scripta euoluerit. Ipse etiā Gal. in phlegmonis iocineris curatione, cortice helebori in ptisana, mercuriali, & philicula utitur. Idque non uulgare præceptum est in uehementi febre aut maligna. Nempe cum purgatio admodum sit necessaria, timeatque medicus inualidis ægrotantis uiribus. Con-
sulte

te aget ut cum pharmaco uti uelit, id simul cum sorbitione ægrotanti offerat. Sic enim pharmacum minus commouebit, minusque calfaciet, & exiccabit, quæ in inuehementi febre aut maligna ne fiant, diligenter obseruandum est. Pharmacum præterea ita exhibitum uires naturæ minus exoluit. In maligna febre et pestilenti optimus fuerit exhibendi pharmaci modus, quo uellus alius certior, minorique humani generis damno. Id ita esse intelliget si Gal. sententiæ sis memor, in expositione Aphorismi quibuscunq; crisis fit, ubi plures iudicationes ad bonum terminari uidisse ait. Nouimus inquit ipse plures esse ex ægroti sanatos quam mortuos nisi pestilens sit constitutio. In iudicatione autem natura tristantes chimos ad expulsionem commouet. In qua quidem commotione natura solet pluribus uictrix exire, nisi cum pestilens morbus uerit. Cauenda ergo sunt, quæ humorem pestilentem natura pharmaca commoueant, offerre. Ab utroque enim & à pestilenti humore & à pharmaco ægrotantis robur absumitur. Quod si pharmacum cum sorbitione misceas, ab utriusque ictu naturam magis seruabis, & que simul materiam unde sibi arma ministrat suppeditabis. Prudentissime igitur Hippoc. in maligni causi curatione sorbitiones attractorias ministrare iubet. Quod autem in causi curatione pharmacum purgans aliquando exhibere oporteat, ipsemet docuit eodem libro in hæc uerba. Si liquidam aluum habenti causus superueniat, si tibi uideatur purgatio necessaria, intra dies tres non purgabis, sed quarto. Sermonis consequentia

4. de ratio
ne victus.

DE VICTV FEBRICIT.

Sequentia huc me adduxit ut de administrandi pharmaci modo disererem, alibi enim de pharmacorum administrandorum methodo latius agemus, ubi quale, quātum, quando, & quibus exhiberi debeat pharmacum, inuestigabimus.

CAP I III.

4. de ratio
ne uictus.

In 1. de ra
tione ui-
ctus.
16. conti-
mentis.

N V N C ad sermonem reuertamus. E' nostris medicis nonnulli medullam cucumeris, citruli, alij lactucam, portulacam, alij lac amigdalorum, aliqui scariolam cum aceto aut agresta uel succo berberorum aut acetositate citri utrique causo concedunt. Sed quantum astringentia aduersa sunt legitimo causo, tantum frigida potentia, notho. Quod ex hoc maxime intelliges. Legitimus causus fluxu sanguinis aut sudore, soluitur, ut ab Hip. discimus. Quæ autem potentia nimis frigida sunt, tum ea quæ astringunt, utriq; obstant terminationi. Quod notho seu non uero causo non conueniant ea quæ potentia ualde sunt frigida, ratione manifestum fit. Humor si quidē huius febris difficilis coctionis est, idque maxime ob id quod frigida glutinosa & crassa pituita sit, quæ hanc febrem generat. Quapropter abcessu solet hæc febris terminari, ut à Gal. scriptum est. Quare omnia quæ potentia frigida ualde sunt huic febre incommoda esse quiuis percipiat. Quod Rasis in hæc uerba asseruit. Et pone, inquit in cibarijs scilicet in non pura, res calefacientes & subtiliantes. Quid igitur prudens lector de illo sentis, qui camphorā cum aqua rosarum dissoluens, laborāti causo exhibet. At quæ astringunt nisi syptomatis gratia exhibita,

inhibita, utrunque causum perniciosum aut discritum
ficiunt. De causi utraque specie satis sint dicta. Vtri-
que synochi victus forma, similis est ei, quam causo
inuenire diximus.

CAP. V.

CVM enim uterque synochus febris sit nullas ha-
bens intermissiones, indicat ægrotantem potu fore nu-
tririendum. Et quia hæc febris raro accidit cum imbe-
cilli facultate, aut calido & sicco temperamento, neq;
habitu raro, ob id solum in hac febre de consuetudine
queremus. Quem ergo ægrotantem parce uiuere bona
consuetudine scias, solo potu nutrire oportet. Aquam
igitur hordei ut supra parato, cuius accipito partes
decem syrupi acetosi acrioris partem unam, misceto
simul ad lentum ignem, dato ubi oportet. Bonum est
hordeum à primo solum exuere cortice, nam ab utro-
que exutum, magis humectat & minus absterget. Ad
synochum absque putredine. Antequam aquam hor-
dei ab igne amoueris hora una. Mali granati accidi
grana secundum quantitatem hordei projicito, zucari pu-
rissimi quantum satis, coquito spumam auferendo, ad
lentum ignem, exhibeto ægrotanti quæ oportuerit. Commodis-
simus huic febre est potus. Ad putrescentem synochum.
Hordeum ablato uno cortice coquitum in aqua ut dictum
est, antequam ab igne amouea hora una, politrisci, aut ca-
pillorum Veneris non uetustioris uno mense accetose her-
be projicito singulorum quantum manu capi possit. Trans-
acta hora, remoue herbas quas filo collegeris & projicito
syrupi acetosi acrioris quantum videbitur, dato ubi opor-
tet

Potus ace-
tosus.

Potus ex
malo gra-
nato.

Cibus co-
ueniens
putrescen-
ti synoco.

Aqua hor-
dei cum uir-
tute capil-
lorum ve-
neris.

DE VICTV FEBRICIT.

1. de ratio
ne uictus.

1. Aphorif
simorum

Panarella
cū uirtute
politrici

tet, postquam ad lentum ignē probe mixta fuerint. Obseruandum tamen est, ante missionem sanguinis aut uētris subductionem aut clisterium bono temporis intervallo exhibendam non esse aquam hordei ut discimus ab Hip. Nō prātermittēdū est, synochum à putredine paulo solidiorem exigere uictum. Nam dispositio ex corruptione humorum, indicat ciborū adiectionem ut supra ostendimus de mente Gal. in expositione illius quibus semel aut bis. Natura insuper citius labitur à febre & à putredine simul inuadentibus quā ex sola febre. Sorbitiunculam igitur tenuē ex hordeo aut pane parato in hunc modum. Aquam hordei cum politrico & acetosa coctam parato, in eius portionē dissolue micā panis per horam in aqua endibiæ infusi. Coquito ad lentum ignem cunque permixta fuerint infude syrupi acetosi acrioris quantum in gustatu aperte sentia tur, iterum modicum coquito miscēdo. Potus sit aqua hordei cum malo granato acido cocta, in synocho absq; putredine in eo uero qui cum putredine est aqua hordei cum politrico & acetosa cocta.

CAP. VI.

NOSTRI iuniores medici, cibos ex cucurbitis spinachis lactucis portulacæ uirgulis, citruli medulla conficiunt. Hos uictus in continentibus febribus reprobandos fore, una ratione ante ostendi. Heæ quidem febres cum ualde acute sint, natura eas diu ferre non potest, cito enim fit crisis qua aut natura uincit, aut uincitur. Ut scripsit Gal. primo de glauconem. Summa ergo diligentia curare medicus debet, ne aut humores

humores aut corporis vias ad crīsim indisponat. Vi-
tus autem ex frigidis herbis potius efficere hoc ualent
quā humoris igneam qualitātē refrangere, aut sitim
egrotantis sedare, quæ alioquin magna aquæ frigida
quantitate uno haustu ebibita uix sedatur. In conti-
nentibus igitur febribus uerendum est ne uictus ex hu-
iusmodi ualde refrigerantibus herbis aut mortem aut
periculā crīsim inducant, ad fluxum sanguinis è nari-
bus, & ad sudores corpus laborantis, & humores si-
mul indisponendo. Est qui iuuuas, & lentes cum ace-
to, & cum granatis, & sumach ijs concedant quando
intentio esset ingrossare sanguinem, aut quando natu-
ra esset nimis mollis. Et subdit, & si sit aliquod horum
per quæ constriictio timeatur scilicet ne uentrem strin-
gat, frangatur eius constriictio cum siracost, & prunis
& cibetur tunc cum cibo factō de cucurbita, & herba
acetosa. Et conuenit ollus frigidum factum de acetosa
endiuiā, & lactuca. Sed forsā quis cōtra hæc obijciat.
Quod nam magnæ dignitatis commodum in continen-
ti febre ex sanguinis ingrossatione sequitur, ut eius gra-
tia sumach condimentis miscere ausus fuerit in syno-
cha febre, uidetur tamē duplici de causa id concessisse,
nēpe aut ingrossationis, aut symptomatis gratia, ut cū
alius liquida præter modum fuerit. An symptomatis
occasione concedi debeat, prætermitto. At ingrossandi
sanguinis gratia, haut quaquam rectū esse opinor. Nā
prudentis medici non uidetur esse, in fluxione quæ à
toto aut ab aliqua parte in aliam fit, biliosum sangui-
nē crassiores reddere cum ijs, quæ ualide astringunt,

O

ne superfluum humorem fluentem in parte aliqua magis fortasse momentanea detineamus. Aut ne id quod in parte affecta est, magis impingamus. In synocha vero febre sanguis feruens in alium tumet, moræ aquæ ebullientis in olla. Huius feruorem igne non remoto coepescas, si igneam qualitatem ab aqua remittas; id efficies aut aqua frigida iniecta, aut si cs testæ discooperias ut aeris refrigerium capiat. Sic in febre synocha, aut potu aquæ frigida efferventem humorem compescere oportet. aut conandum est, ut per corporis poros ebullientes chymi libere transpirare possint. Hæc enim uia ad salutem centior est. Nam febris remissio ex efferventium humorum transpiratione fit. Quæ duplici arte fieri potest, nempe cum aut pori totius aperiuntur, aut humores æqualiter minuuntur. Vt à Gal. discimus octavo, & nono de meth. med. Astringentia autem ex quibus unum uiribus ualens rhus, est, quam recentiores sumach appellat, tantum abest, ut per spirationes liberas efficiat, ut eas prohibeant corpora constringendo. Nam est triplici causa prohibita transpirationis una constrictio corporum est. Ex ijs igitur manifestum est, rhus, & cætera astringentia nimis esse continuis febribus infecta, eo quod transpirationes quæ remissionis febris sunt causa prohibeant. Symptomatis gratia uti possumus ijs quæ potentia mediocria sunt. Frigida potus exhiberi potest utrique synocha, sed signum coctionis in eo qui cum putredine est obseruare oportet. Exhibitio tamen frigida uno haustu, disputationis nostræ egreditur limites, non enim, ut potus sed ut medicinalis potio offertur.

C A P . VII .

FEBRIS tertiana continua dupliciter intermit-
tit, aut in intermissione quiescunt symptomata, aut so-
lum remittuntur. Sitque primum continua tertiana in
cuius remissione non omnino quiescunt symptomata.
Hæc dico capitis dolor, uigilia, sitis magna, delirium,
grauiter ferre morbum, & reliqua. Facultate robusta
existente, habitu tali, ut non facile corpus inhalitus di-
geratur, consuetusque sit parce uiuere, acri ptisanæ
sorbitione utitor, eo quo supra parauimus modo. Febri-
citantis panis offam infusi in aqua endiuia, & succo gra-
nati accidi, simulq; decem, aut duodecim pruna in aqua
tantum percocta, modico zucari super asperso, super
exhibeto.

Præterea prunorum acetosorum ad dulcorem acceden-
tium quantum manu capi possit, borraginis recentis à
uermibus non tactæ eadē mensura, hepaticæ quā liche-
nas Dioscorides appellat, Lusitani hepatega, angli liuer
urth bis tantum, hordei ab utroque cortice exuti, ter,
mundato diligenter à terrestri excremento herbam, co-
quitoque omnia cum pullis duobus teneræ ætatis crassis
admodum, tandiu, ut hordeū rumpatur, dato ubi opor-
tet. Conuenientissimus hic cibus fuerit ad omnes fe-
bres, quæ à putrescente bile ortum habent. Febrilem
calorem reprimit, qui in iocinere est, facultatem coctri-
cem inuat. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut habi-
tus rarus, aut multo cibo æger assuetus, crassiore sorbi-
tionē hordeo expresso multoties in prædictum ius effi-
cito. Aut medulla panis infusi in aqua endiuia in idem

Sorbi-
tio ex
hepatica

O ij

pulli decoctum dissoluta, sorbitionem conficies magis nutrientem.

Quod si in intermissionibus quiescunt omnino symptomata, uirtute robusta existente, & habitu duræ resolutionis, assuetusque sit parce uiuere, altera duarum sorbitionum pulli dicto modo temperati febricitantem alito. Panemque in aqua endiuiae, & succo granatorum infusum super exhibeto. Quod si facultas debilis, aut habitus rarus facilis resolutionis, aut multum ædere assuetus sit, febricitantem altera sorbitionum iam dictarum & pulli extremitatibus alito pane similiter infuso.

Quod si febris continua nulla quidem aut parua afferat symptomata, uirtute, habitu, & assuetudine, ut supra habentibus simili uictu hominem nutries.

Quod si uirtus imbecillis fuerit, aut reliquis crassiore uictum indicantibus, pulli etiam carnes febricitanti ministrato. In tertiana igitur continua, quæ debilia affert symptomata uirtute robusta existente, habitu, & assuetudine, ut supra habentibus, sorbitione utere in hunc modum.

Sorbi-
tio ex
lupulis.

Hordei ab uno cortice exuti man. tres, capillorum ueneris, cimarum lupulorum, passularum enucleatarum, ana quantum manu capi possit, coquantur insimul cum pulla crassa, quæ nuper matrem reliquerit, hora una antequam ab igne amoveas, immitte aceti albi quantum satis sit, ut acetum gustatui se offerat, huius partem seruato, ut bibat inclinante febre, sorbitionem ex reliquo cum pane conficito.

Quod si uirtus imbecillis fuerit, aut habitus, & con-

suetudo similiter indicent, extremitates pullæ quæ teneræ sunt magis, inualido ægrotanti exhibeto. Huic uictus conueniens forma, per ea quæ comeduntur est, Semperque à tenui iure incipiendum est; deinde temporis interuallo sorbitionem ministrato. Contingit aliquando febre iam inclinante, iterum à quodam inflammante calore febricitantes rursus molestari. Quod duplici de causa contingit, aut quia intempestiue eis oblati sunt cibi, aut cum in uictu erratum est.

CAP. VIII.

SUNT qui assa gallinaceorum hepata post sorbitiones laborantibus febre continua exhibent, quod minime probo. Nam cibus longum in laborantium uentriculis immoratur. Quod non parua occasio est ut ob id corrumpatur. Præterea hepar assum inter cibos exiccantes numerandum est; quapropter febricitanti non conuenit. Cuius argumentum est sitis quam excitat. Eos qui in continuis febribus, lactucis, & huiusmodi refrigerantibus herbis utuntur, ante morbi iudicationem, supra ostendimus in damnum ægrotantium errare. Sed non erit ab re, recensere uictum quo utitur quidam è nostris recentioribus; nam ex hoc aliquod capiet lector commodum. In die remissionis febricitantem pulla alterata (ut ille ait) nutrit, ante uero exacerbationem. & in febris inclinatione farre, & lactucis, qui ualde dissident ab inuicem uictus, & qualitate, et substantia. Nutrimētum insuper quod ex pulla habetur multum est, parum uero quod lactucæ præstant. Aquosum namque sanguinem generant excrementis abundantem, quapropter cum in si-

DE VICTV FEBRICIT.

gnis sit inter eos differentia, magna fiet utiq; mutatio cum ab uno ad alium transitus fiat. Stante autem eadē morbi conditione mutationem in uictu faciendam non esse supra ostēdimus de mente Hip. Vbi Gal. citauimus dicentem à morbi principio ad statum usque eadem uictus specie alendū esse febricitantem. Quò in loco cautum medicum reddit, ut tunc insignes mutationes caueat. Nonne melius esse iudicas si pulla ægrotantē alere illi mens erat, ut ante exacerbationem, & in febris inclinatione, sorbitione ex pullæ decocto uteretur. Multo si quidem magis inter se conueniunt pulla, & sorbitio ex eius decocto, quàm pulla cum lactuca, & farre, facilioris præterea sorbitio coctionis est. Quod si cibum minus nutrientem se uelle exhibere dicas, pullam quare exhibuit die tranquilliori rogabit quis, quæ multo magis nutrit quàm eius sorbitio. Non enim prudentis medici est, ægrotantem uice una implere, ut cum uice alia parum exhibuerit satisfaciat. Multo salubrius ægrotanti esset, id in partes secare, ut natura nullo ex mutatione afficiatur grauamine. Si ergo pulla recte in die tranquillo exhibetur, facta ex ea sorbitio modo quem diximus salubrior erit profectò ægrotanti ante exacerbationem quàm far, & lactucæ. Multo præterea commodius fuerit inclinante febre ius pullæ dicto modo confectum exhibere, deinde temporis interuallo sorbitione uti, quàm far, & lactucas in cibum ministrare. Oportet ergo non solum simili forma uictus sed similis substantiæ cibarijs febricitantem quo ad possis, stante eadem morbi conditione nutrias.

CAP. IX.

FEBRIS continua à pituita ortum habens si cū
virtute robusta fuerit, habitu, & assuetudine, ut supra
habentibus, hunc uictum exposcit. Hordei ab uno corti-
ce exuti quantum manu capi possit, passularum enu-
cleatarum, & petroselini tantum, thymi partem me-
diam, coquito insimul cum pulla crassa modicum, ante-
quam ab igne amoneas immittito capillorum ueneris
recentis, aut politrici man. unum. Ligato insimul her-
bas, coctasq; abstrahere. Projceto aceti albi quantum sa-
tis ut ingustatu representetur. Denuo coquito quousq;
permisceantur. Fac sorbitionem ex pane, utere, & iure
si uidebitur. Ex pullæ carnibus hora quietiori dato fe-
bricitanti quod tenerrimum sit. Meminisse oportet in
continuis febribus ubi suspitio est de pororum obstru-
ctione ante totius euacuationem incommoda esse quæ-
cunque aperiunt, & incidunt.

Cicerum facilis coctionis man. unum infundito in modi-
cum aquæ endiuivæ, testam tota nocte in calido cinere
seruato. Mane in aqua è fonte sufficienti bulliant, adie-
ctis hordei ab uno cortice exuti man. tribus, passularū
enucleatarum man. uno, cortice radicis cichorii uno, co-
quantur insimul cum pulla, & antequam ab igne amo-
neas, petroselini man. semissem addito, & parum ace-
ti, fac sorbitionem, ut supra. Extremitates pullæ ægro-
tanti dato.

Quod si imbecillis æger fuerit, permitte ei phasianum
ædere, optima si quidem ijs caro est. Bonum est, ut ci-
bum assumpturus æger, syrupi acetosi acrioris coclea-

O iij

Sorbi-
tio ex pe-
troseli-
no;

Sorbi-
tio ex ra-
dice ci-
chorii.

DE VICTV FEBRICIT.

ria duo, mellis rosati colati unum, mixta ante sorbeat.
Aquam decoctam cum hordeo, & semine fœniculi bi-
bant. Verum de potu abunde dictum est.

C A P. X.

IN febre phlegmatica quam arabes laticā dicunt, aut latentem, humidi natui multum exoluitur, cibum ideo multi nutrimenti dare oportet. Corpus humiditate madefaciēte, et laxatē affectū est ab humore frigido & humido, sed ob putredinem calido effecto. Vnde non aliter ab hac febre corpus, quā pars aliqua ab occur-
su aquæ ebullientis afficitur. Vnde ebullientem hanc fe-
brem nonnulli dixerē. Cibus conuenientem ijs qui hac detinentur febre actu frigidum, & siccum esse oportet, potentia autem humidum. Hoc autē est, ut hu-
miditatem madefacientem exiccet, & ut corpus ab hu-
mido innato exolutum eeficere ualeat, & ut laxa mem-
bra induret. Hoc autem difficile est in simplicibus inue-
nire. Quapropter sorbitionem ijs ita parabis. Pha-
sianum iuuenem, aut perdicē, aut hœdum (hæ enim ex
carnibus optimæ ijs sunt) coquitō cum radicibus cicho-
rij, petroselini, passulis, tenerrimis lupulorum cimis, et
corticibus citri, cauliculis altilis cardui, quem hispani
cardo vulgariter appellant, quo ubique locorū ad finē
mensæ utimur, in simul coquantur ex iure fac sorbitio-
nē cum pane. Dictā herbam quam nonnulli scolimōn,
esse à Dioscoride appellatam opinantur, cum capo aut
pulla si simul coquas, si phasiani, aut perdicis copiā

Sorbi-
tio ex
carduo

non detur idoneum illis parabis cibum. Carduus humiditatem madefacientem, et laxantē maxime remouet. Membrū laxum indurat, idq; citra humidi natiui absumptionem. Ad hæc aperit, & urinam prouocat, & in altum penetrat, quod ad huius febris sanationem expectandum est. Humor si quidem ad minimas est corporis particulas dispersus. Vnde crassam urinam copiosamq; & sudorem duo esse huius febris remedia ratione quis arbitrabitur. Tres ergo insimul coquens cauliculos, cardui sorbitionem facito, quam febricitanti ministrabis ubi oportet. Ex carnibus id quod maxime tenerum sit, & facile ab ægrotante coqui possit exhibeto. Nec prætermittendum, solam hanc febrem ex humoralibus indigere uictu qui maxime uirtutem corporis augere possit. More hecticæ febris cui ualde similatur. In illa enim caliditas præter naturam totum iam occupans, naturalis similitudinem acquisiuit. Sic humor huius febris per totum ad minimas usque partes dispersus more naturalis humiditatis, natura eius coctionem, separationem, aut expulsionem non curat, sed eum ob mixtionem ad minima cū naturali humiditate seruat. Vnde hos nec euacuatione uentris, aut fluxu sanguinis sanatos uidemus. Quin immo si sponte, aut à medico imperito alius moueatur, peiores redduntur. Quod si aliquandiu manet, euacuato bono simul cum malo separatione non facta, moriuntur. Quapropter scopas curationis in ijs fuerit, eos more hectici nutrire. Oportet enim totum id quod in ijs de humiditatibus est superfluis, sensim absumere, ciboq; salubriores inducere,

Quos
præbeat
usus car-
duus.

DE VICTV FEBRICIT.

qualitatesq; humoris quibus corpus affectum est, contrarijs successiue euertere. Et quia huius febris curatio à uictu, ut diximus maxime dependet, libet sermonem longiorem facere. Iis qui cum imbecillitate uirium hac febre detinentur hunc ministrato cibum.

Perdici secundum complementum assæ succum ad æquales portiones cum uino albo decoctionis radicum plantaginis misceto, febricitanti ieiuno stomacho exhibeto. Fac ut modicum sudet. Idem è phasiano efficere possis. Quod si carnes perdici, aut phasiani digerere non ualeat, ipsarum succus postquam complete assæ fuerint diligenter per linteum expressus, cū pane ministretur, aut cū modico uini albi misceatur, & propinetur. Sed diligēter obseruare oportet, ut uinum sit maxime imbecille quod ijs propinaueris, nā alias non parua ijs læsioni erit. Nec silentio prætereundum esse, ijs qui ita laborant commodo esse in edulij sorbitionibus ue præsertim ijs qui assueti sunt alliū, ut simul bulliat immittere. Nam prærogatiuam habet in roborādo naturales facultates, corrigendoq; damna quæ in ijs à duarum qualitatum immoderantia fiūt, nempe à frigore, & humiditate. Putridi insuper humoris cum per totum spargitur, corpus uitia corrigit. Habet enim præter hæc facultatem qua à centro ad circumferentiam pellit. Tria hæc quæ allium habere diximus ex Dioscoride licet colligere qui de eo ita scribit. Potum cum origani decocto pediculus, & lendes enecat. Præterea magnæ, & allio utilitates contra aquarum mutationes. Demum in fine dixit utile hydropicis, ad quem quidē morbum hæc fe-

ris corpus non parum disponit. Veruntamen propter
calorem, & eius acrimoniam modicum in sorbitionibus
miscendum est. Macerare tamen prius oportebit in suc-
co herbæ acetosæ. Potus ijs cōueniens sit uinum album
pauciferum defœcatum clarū cuius sumito partes duas
succī granatorum medijs saporis partis unius semissem,
aquæ in qua decocta est capillaris herba recens, aut po-
litricum unam, misceto. Conuenientissimus huiusmo-
di ijs potus fuerit. Nec prætermittendum est indicæ ra-
dicis decoctum maximo ijs fore remedio. Cuius si de-
tur copia, unciam unam in lupinares sed multo subtilio-
res formulas scissam, in decem libris aquæ in qua nocte
ante eam maceraueris coquito. Sequenti die ad lentum
ignem ad medias ebullire permittito. Propinato in au-
rora quantum uno haustu bibere possit calidum, sed
ægotantis corpus prius fricare linteo aspero oportet.
A potu uestimentis cooperiatur, & sudet quantum
pro uirium ratione. Cubiculum ubi ægotans iacet,
perpetuo calidum undique clausum seruare oportet.
Nullus alter potus melius sudores ciet. Partes insuper
ab humore assiduo laxas roborat, indurat, sed ijs qui
iam sunt imbecilles caute exhibendus est, quia plus ius-
to exiccat. Quare ijs qui imbecilliter habent non inu-
tile fuerit, succī granatorum medijs saporis partem unā
miscere tribus decocti, simulque propinare. Summa
diligentia obseruandum est ne ijs aliud liquida fiat,
quin potius huius contrarium, nempe astrictam al-
uum efficere conamur ijs, quæ poros cutis aperiunt, &
sudores mouent.

Deco-
ctū in-
dicæ ra-
dicis.

DE VICTV FEBRICIT.

C A P. XI.

TERTIANA simplex pura hunc exigit uictū. Paretur crassa sorbitio ex hepatica altero duorum modorum quos supra tradidimus. Ius dato ut bibat in febris inclinatione, ex reliquo fac sorbitionem, qua utitor ante aduentum paroxysmi, & cessante febre. Carnibus in die tranquillo uestatur.

Sorbi-
tio ex
cucur-
bita.
Panis
infrigi
dans.

Pullam cum cucurbita & prunis & uua acerba coquito fac ut supra.

Panem album trium dierum in subtiles partes planas diuidito, & in aquam endiuie infundito, acidumq; succum arantij desuper exprimito, zucarum deinde radito, tantum ut dulcor, & acetositas manifeste ingustati sentiantur. Pane in hunc modum utatur die tranquillo bis aut ter & in maxima inclinatione paroxysmi ante sorbitionem. Magna huic cibo uis est, in refrangendo biliosi humoris acuitatem. Ventriculi præterea, & iocineris immoderatum ardorem extinguit. Robur eis addit. Plures à tertianis liberari iuuenes, et adultiores ætate hoc cibo uidi, absque pharmaco, aut alia potione. Oportet tamen diligenter aduertere ne adsit pororum obstructio, aut condensatio, aut corporum constrictio. Quapropter in continuis febribus a bile ortum habentibus in quibus de pororum apertione solliciti sumus, ante totius euacuationem exhibendus non est. A uenæ sectione in continuis febribus secure exhibebitur.

Dupli-
ci ter-
tiane
uictus
conue-
niens.

Duplex tertiana tenui eo magis uictū indiget, quantum in ea minus quiescit natura. Sorbitione cucurbitæ, aut hepaticæ utere. A carnibus nisi sit imbecillis ægro-

tans temperandum est. Aut nisi multo sit cibo assuetus. Potus utrique febris conueniens aqua hordei est.

Tertiana simplex non pura ab humore bilioso cū crasso phlegmate mixto ortum habens quem recentiores choleram uitellinam dicunt, hunc exposcit uictum. Thymi petroselini, passularum, enucleatarum, singulorum manip. unum hordei ab uno cortice exuti tres, coquito cum capo, aut pulla gallinacea herbas iam coctas extra hito, immittitoq; aceti albi quantum satis. Parum coquito denuo quousq; permixta sint. Dato ut bibat inclinate febre ex residuo fac sorbitionē. Qua uti poterit cessante febre, & ante aduētum paroxysmi, horis septē ante accessionem, carnibus uesci poterit in die quietis. Pisciculos saxatiles in aqua coquito cum satiregia, thymo, sale & aceto, & modico purissimi olei. Facilis coctionis cibus est. Ventriculi appetentiam excitat, quæ in hac febre plurimum expetenda sunt.

Olei purissimi ex immatura oliua, partem unam, aceti albi duas, permisceto. Panē infundito febricitanti exhibeto. Quod si olei immaturi copia non detur, hispano utere. Mixtio ex oleo, & aceto cum humana maxime conuenit natura. Quandoquidem ex contrarijs utrisq; qualitatibus constat. Miscemur enim calidum frigidū humidam & siccum. Ventriculum roborat. Hepar & lienem. Distributionem adiuuat. Coctionem & appetentiam excitat. Aperit, incidit, humectat, refrigerat. Quod si piperis grosso modo contusi parum addas, frigidō uentriculo pituitoso conferet. Quod euenire in hac febre multoties solet. Rationalem merito quis

Tertiana non pure cōpetens uictus.

Sorbitione cū aceto.

Pisces petrosi.

Mixtio ex oleo & aceto.

Mixtio ex oleo & aceto cum humana maxime conuenit natura

DE VICTV FEBRICIT.

mixtionem dixerit. Quæ febrî à pituita, à bile, & ab attrabile conuenit. Quod si oleo, & aceto parum aquæ misceas sitim sedabit.

Cibus
herba-
ceus.

Aliū Alexandri herbæ cauliculos, laueris super aquas crescentis, foliorum rafani, uiolarum borraginis, lactuca, singulorum manip. unum coquite in aqua quousque percocta sint. Herbas exprimito quantum possis, cultelloq; ad minimas partes incidito, addito olei purissimi, salis & oximelitis acris singulorum quantum sit satis. Cum pane utitor. Mundificat cibus hic uentrem, utranque euacuationem promouet.

Quod si post expressionem herbarum, & earundem incisionem cum pinguitudine iuris capi, aut pullæ herbas coquas adiecto oximelite, magis nutrientem cibum efficias.

Herba
ceus ci
bus ma
gis nu-
triens.
Sorbi-
tio ex
hepati-
ca cum
malo
grana-
to.
Sorbi-
tio ex
lenti-
bus.

Quod si bilis permixta tenui humiditati aquosa fuerit, febrisq; fiat ex cholera citrina. Vtere sorbitione ex cucurbita, aut crassa sorbitione ex hepatica, adiecto malo granato acido hora una antequam ab igne amoueas. Dato ius in febris inclinatione, ex residuo fac sorbitionem. Vtere & pane infrigidante, modico cinamomi adiecto si opus fuerit. Lentescis hispanas coquito in aqua cum petroselino, coriandro uiridi, oleo, sale, & aceto, & modico croci. Vtere decocto cum pane. Cibus hic frigidus, & aliquantulum exiccans est. Hispanis multum in usu est. Febricitantibus quibuscunq; sorbitionem ex lentibus exhibent, exceptis quartana laborantibus. Quos & si nulla ob id laude dignos esse existimem, ita eos non absque erroris crimine, qui lentes

omni prohibent ægrotanti. Id ex Gal. asserētes qui eas cibum hominum non esse dixerit, cū de pleuritide ageret in qua lentes prohibuit. Sed relicta pleuritide febricitanti febre tertiana à cholera citrina certe conueniet. Si febris effectricem causam & qualitatem in partibus derelictam consideres. Cholera citrina humor calidus et tenuis substantiæ est, maxime omnium humorū penetrans. Ius lentium contrarias operatur qualitates nam refrigerandi, & inspissandi uim habet. Cholera insuper citrina eam in quā incidit partem totā eius acuta penetratione macerat. Ius lentium non solū partem cogit, ut minus prompte penetrationi fiat peruia, uerū id quod humidū est tollit æquali sua siccitate. Iis præterea qui ex hac febre immoderate sudant, & non ob id alleniantur non parum cibus ex lētibus confert. Quod si adhuc lentes aciem ocularū obtundere, & ægre concoqui, & somnia tumultuosa excitare ex Dioscoride asseras. Hæc omnia lentibus nō earum decocto tribuit. Hæc damna in hispana lente non percipimus. Stomachum male habere ex ea scripsit Dioscorides, hispana uere lens uentriculum roborat, & minime inflat. Lens Itala maior, & candidior est, minor uero Hispana colore ad ruberū uergente nec tumultuosa excitat somnia, ut de ea proditū est. Et si quid uitiosæ qualitatis hispanā habere contendas à uiridi coriandro castigatur. Vbi cūq; ergo humores corporis inspissare, aut corporis particulas cogere citra calfactionem mens est, ius hispanæ lentis in cibis recte porrigitur. Quod si id cum petroselino, coriandro uiridi, oleo, aceto, sale, & croco pa-

2. de ratione uetus.

DE VICTV FEBRICIT.

raueris, conficies cibum ad iam dicta conuenientissimū in passiuis qualitatibus temperatum, in actiuis ad frigiditatem declinantem.

Sorbi-
tio ex
pedib⁹
uituli.

Pedes uituli anteriores duos, aut arietis omnes in aqua plus satis coquito, radicū plantaginis, cichorij, petroselini, singulorum manip. unius tertiam, hepaticæ hordei ab uno cortice exuti, prunorum & passularum singulorum unum, addito mali granati acidi tres, ius dato ubi oportet, ex reliquo fac sorbitionem. Quod si post coctionem pedum antequam malū granatū iniiciat herbas abstrahas, ius collans, tertiam sui partē succi acidi mali granati immittas, pane & zucaro simul coquas, quousque permixta sint, cibum ijs ualde idoneum, & plurimis alijs ægrotantium parabis. Quem ut conuenientissimum memoria dignum ducito. Nam multum nutrit, corpus refrigerat, & humectat, particulas coagit, tenues humores inspissat, bilis feruorem reprimat, uentriculum, & iocinerem roborat, sitim sedat.

C A P. XII.

EX arabibus medicis sunt qui in tertiana pura à cibis in quibus est caro abstinendum esse dixerunt. Alius rectum est. inquit, ut in potu ei detur sicut sorbitio hordei, & etiam ei simile, nisi natura iam fuerit lenificata. Dixit alius si in ultimo diei erit tempus accessiones, non erit inquit, incongruum in diei principio aquam hordei propinare ad subtilitatem declinantem. Dixit unus è nostris, intellexerunt prædicti regulariter operando, nam coacte aliquando cibamus ante accessionem & in ipsa. Dixit infra hic idem uir
aqua

aqua tamen carnis in ijs febribus prohibenda est quantum possibile fuerit. Si autem coacte eam exhibere debeamus, ab ea carne in frusta parua redacta, et aqua in frigidantibus abluta sublimetur, et cum aquis in frigidantibus tribuatur. Sed operæ precium studioso lectori erit examinare, an dicti medici rationabiliter uereantur carnes nedum auium paruarum exhibere usque ad inclinationem uniuersalem febris. Et si quidem has in die accessionis prohibent, recte agere ita consulentes arbitror. Quod si nec in die quietis asserant, audire quibus inniuntur rationibus oportet. Tertianam puram ex Hipp. asserunt intra septem periodos iudicari, hos dies tredecim continere, terminum uero acutarum quattuordecim esse. Omni autem morbo intra quattuordecim dies iudicando, tenuis uictus exhiberi debet. Vt supra ostensum est. Carnes igitur nullæ dandæ sunt, quia tenuis uictus limites transcendunt. Præterea in ea febre bilis utpote nimium acris, membra plus iusto calfacere solet, exicare, & corrodere. His uero symptomatibus uenter & iocinerem plus affici, eorumque actiones imbecilliores ob id fieri certum est. Iis ergo de causis uictu facilis coctionis, quique contrariæ sic qualitatis, nutrire eos oportet. Carnes uero ob id quod non facile coquantur, & qualitati humori contraria non uigeant, sed media, à uentriculo, & iocinere male parantur. Vnde fit ut ad humoris morbum efficientes naturam, bona earum pars conuertatur. Danda igitur sunt quæ facillimæ sint coctionis, & quæ humori qualitibus contrarijs uigeant. Hæc non in carnibus, Sed in herbis, fructi-

P

DE VICTV FEBRICIT.

bus, seminibus, inuenire est. Vt in lactuca, endiuiā, portulaca, cucurbita, malo granato, arantio, hordeo, prunis, et similibus. Has, & similes non contemnendas rationes assignabunt, qui in tertiana pura die quietis à carnibus quibuscunq; ægotātes prohibent. Sed nos qui in supradictis pulum gallinaceum unū, aut duos parari iussimus cum hordeo, uiolis, endiuiā, hepatica, prunis, adiecto succo mali granati acidi. Consultimusq; ut hoc iure in febris inclinatione febricitans uteretur, positoque temporis interuallo sorbitione ex pane in aqua endiuiā hora una infuso. In die uero quietis præter ius & sorbitionem pulli carnibus uesceretur. Et arbitramur sic iubentes, recte ægotantibus consulere. Nullū equidem alium salubriorem quis uictū inueniat, quiq; magis naturam roboret, & corpus ad suam temperiem efficacius, morbifica qualitate euersa reducat. Quod ita ostēdimus. In tertiana pura duplex corpori siccitas aduenit, altera positina (ut dicūt) qua bilis natura sicca corpus afficit, altera ex consumptione humiditatis naturalis à sanguine ortum habentis. Vtrique siccitati subuenire tenetur medicus. Sed secundæ citius occurrere medicum posse, iure pulli refrigerantibus herbis temperato, & sorbitione ex eodem, quā herbaceo quocunque cibo inde manifestum est, quod in sanguinem bona illius cibi pars uertatur, minima ex oleribus, & fructibus. Quod si mente concipias corporis quamuis minime particula concessam esse facultatem, qua conueniēs trahat, et triste ejciat, intelliges ius pulli, aut eius sorbitionem, quia humanæ naturæ magis familiaris est,

multo magis humectare exteriores corporis, & interio-
res particulas. Adde quod cibus, ex herbis, & oleribus
cū minime ad sanguinē laudabilem conuertatur, ioci-
noris gibbum transineans ad urinam demittitur, aut in
halitum euanescit. Vnde minimum est id quod conuer-
sum in sanguinem humectare singulas corporis particu-
las possit. Quare si utique uelimus obstare siccitati, non
cibum ex herbis solum, aut fructibus, exhibebimus, sed
cum ijs simul miscebimus, quæ bonum præbeant alimen-
tum, indigenti naturæ opem ferens. Per hoc enim
herbarum facultates efficacius operabuntur, cū ad mi-
nimas ita corporis particulas deferantur. Quantum
autem facilis coctionis sint, ius pulli, aut eius sorbitio
constat. Ad hæc, in inclinatione paroxysmi, et ante acces-
sionem, ex infrigidantibus herbis cibus alendos ob id nō
esse febricitantes opinor, quod illic febrilem caliditatē
intropellant, hic expulsionem naturæ retardent. Quo
in tempore infrigidantia, et corpus constringentia mini-
stranda non sunt. Sed potius quæ à centro ad circunfe-
rentiam educant. Vt naturæ opus immitteretur regula-
riter agentis. Hoc discimus à Gal. octauo de Methodo
qui à balneo egrotanti ante accessionem aquam in qua
apium incoctum erat ministravit. In die quietis pulli
carnes exhibentes nihil peccabimus. Nam à paroxismo
præterito, et ab instante, inter sunt horæ decem, et octo
quibus corporis natura à labore præterito iam quie-
scens, vires resumpsit, ut pullum tenellum satis coctum
coquere, & parare possit. Superestque idem temporis
intervallum, ad initium instantis paroxysmi. Quo tem-

pore uerendū non est, ne puroxismus cibum adhuc incotum offendat. Quanto enim citius anticipatio fit, tanto, & citius febris finit in tertiana exquisita. Adde quod cibi ex herbis, & fructibus promptissimi sunt, ut putredinem efferuentis humoris concipiant. Quapropter recte à medicis prohibetur in febribus horarij fructus. Aliæ rationes satis efficaces adduci possunt, ad id ostendendum. Hæc tamen sano intellectui satis sunt. Hunc dico, qui uero statim assentit, falsaque (& si magis appareat) arguit minime applaudens. Quod autem de numero dierum quibus iudicatur tertiana dictū est, nihil obstat ijs quæ diximus. Formam enim uictus à cōstitutione morbi, & à robore ægrotantis sumendam esse ostendimus. Diximusque eum cuius uirtus parum ob imbecillitatē urgeat, crassiori uictu quàm morbi dispositio exposcat alendum esse. Ostendimus insuper ijs qui raro sunt habitu, & humores tenues habent, & natura sunt calida, & sicca ob id quod eorum corporum cito resoluntur uirtutes, crassiorem cibum ministrandum esse. Vnde manifestū est medicos qui in tertiana pura tenui uictu febricitantes utraq; die nutriūt in marasmū eos qui gracili habitu, & natura calida, et sicca sunt, deducere. Aut si alio sint tēperamento, ex pura nothā tertianā administratione frigidarum herbarum, & olerum efficere. Quorum utrunque bonus medicus summa cauere debet diligentia, nempe ut ne morbum periculosiorē, aut diuturniorem efficiat. Quod si siti nexetur ægrotans, multo sanè commodius fuerit si frigidam propines (si ea usus fuerit) quæ multo magis

sitim sedabit, quàm cibus ex refrigerantibus herbis.
 Sed non ab re fuerit in præsenti adducere quas nugas
 nobiscum agat unus è nostris medicus. Qui cum nos cau-
 tos in tertiana pura simplici, ijs uerbis redidisset. Aqua
 inquit carnis in ijs febribus prohibenda est quantũ pos-
 sibile fuerit. Si autem eam coacte exhibere debeamus
 ab ea carne in frustra parua redacta, et aquis infrigidã-
 tibus abluta sublimetur, & cum aquis infrigidantibus
 tribuatur. Post hæc cum de uictu continuæ colericæ
 agat, inquit. Ipsa enim eget subtiliori regimine, & fri-
 gidiori quam sua compar interpolata. Ipse tamen in-
 curatione unius qui febre cõtina tertiana laborabat,
 complexionẽ colericã, ætatis quadraginta annorum
 macro corpore, mense Septembri, cum capitis dolore, et
 magna siti, delirabat quæ per accessiones, hunc tamen
 post lenitium ex manna singulis diebus intermissione
 pulla nutriuit. Forsan aliquis in secunda intermissione
 pulsum magis debito prostratum inuenisse eũ dicet. Ob
 id quæ pullã ei dedisse. Quã tamen ea de causa nõ conces-
 sisse, arguit id quod in alio scribit febricitante in quo ni-
 hil tale inuenit in pulsu signũ, de quo ita scribit. Iuue-
 nis erat colericæ cõplexionis febre continua tertiana la-
 borabat cui pullã paruam alteratam cum lactuca su-
 per asperso succo arantij exhibui. Quid nam de eo sen-
 tiendum est, qui cum tenui magis uictu alendos esse qui
 continua febre laborant quàm qui sua compare inter-
 pollata scribat. In interpolata ab aqua carnis abstine-
 re iubens in quantum possibile fuerit, incontinua tamen
 sua compare carnes pullæ febricitanti ministrare audet

DE VICTV FEBRICIT.

nullo interueniente symptomate quod vires deiecerit. Turpe profecto est honesto viro contrarium quod dixerit agere. Vnum scriptis posteris mandare, aliud operibus exercere. Neesse enim est, aut altero, aut utroque falsus deprehendatur. Sed melius fuerit in hac re Gal. in de febribus ad Glauconem, ut iudicem admittere, an à carnibus auis abstineat necne, sed de ijs hætenus. Nō enim id ago ut medicos carpā, quod si uoluissē amplā nobis dabatur area, quæ chartam longiorē exposceret. Ob id dedita opera authorum nomina prætermisī, qui de hac re aliter senserunt. Quod si quis hoc mihi uitio uertat, cado, sentiat quiuīs, ut uoluerit, & mihi quæ a tergo mantica est, ut suspendam, æquū est cādant, aduncos quoscunque nasos. Mihi ipse uiuere, & more meo agere decreui. Popularem auram, & uulgi famam ueritatis studio scientiæq; pospones, ratus cum Gal. hac, nullam esse honestiorem nec diuiniorem possessionem.

C A P. XIII.

FEBRIS, quæ à pituita dulci ortum habet talem exigit uictum. Coquito phasianum, aut capum, aut pullam ijs quæ sequuntur. Petroselini, thymi, endiuie amaræ, singulorum man. semiß. acetosæ man. unum, berberorum tātundem, salis parum, antequam ab igne amoueas immitte capillorū ueneris, aut politrici man. unum bulliant quousque permixta sint da ubi oportet. Cicerum infusorum in aqua tepida per totam noctem man. tres, petroselini, thymi, hordei ana man. unū, rad.

Sorbitio
berbero
rum.

Ex cice-
ribus sor-
bitio

ces tres cichorij coquito cum pulla crassa adiecto aceto ut supradictum est. Aceti albi partes tres, olei purissimi oliuarum immaturi partes duas, zucari, aut mellis partem unam, his madente utatur pane. Mirabile est ad omnes febres quæ à pituita ortū habent. Venter roborat, appetentiā excitat, omnes præterea naturales actiones adiuvat. Nec prætermittendum his utile fore, ante cibum oximelitis coclearia duo, melis rosati colati unum, singulis diebus deglutire ante cibum. Nam plurimum confert stomachum mundificans, & preparans ad ciborum rectam coctionem.

Oxizachri rationalis mixtio.

À pituita salsa febricitantibus sorbitionē parato in qua sit duarum sorbitionum facultas nempe hepaticæ, et petroselini absque aceto. Caput arietis post decentē eius præparationem cum hordeo, uiolis, petroselino, hepaticæ, pulegiæ, thymo passulis, prunis, radicibus cichorij, et petroselin coquito. Fac, ut crebro decoctum febricitans sorbeat. Optimum ijs huiusmodi decoctum fuerit, quod nutrit, abluit, et pituitæ salsæ malitiam corrigit. Bonū est, ut ij ante cibum zucari offam deuorent, parumque aquæ ex hordeo & fœniculo dulci coctæ super bibant. Qui à pituita acida laborant, raro febricitant. Nam pauci omnino sumi, à re acida eleuantur. Quare ad eos qui à pituita crassa, & lenta febricitant sermonem conuertere commodius erit. Is talem ministrabis uictum. Pullam crassam, aut capum coquito cum thymo hordeo, passulis, ut singulorum man. unum, pulegiæ duos sumas bulliant simul, ut supra, modico sale ius parato, & sorbitionem.

Caput arietis.

Sorbitione ex pulegio.

DE VICTV FEBRICIT.

Item paretur sorbitio ex fursure quā infra traddemus cū de obstructione nobis sermo fuerit, quæ ualenter incidit aperit, & abstergit. Capparibus ciceribus radicibus ut pote nimium aperientibus in principio non utemur cum obstructionis suspitio est. Præstat enim ijs quæ abstergunt, & leniter incidunt cum cibis miscere, ut pulegium thymnum, & id genus alia.

C A P. XIII.

S E D qualis uictus febrī quæ à pituita ortum habet, conueniat hucusque dictum est. Inuestigare tamen oportet, an uerum sit, quod nonnulli ex nostris medis asserunt, crassiores uictum exposcere hanc quā tertianam simplicem. Rationem ad id sumentes longiorem hanc febrem esse quā tertianam, cunque crassities uictus, & eius contrarium, à distantia status sumenda sint, sit, ut morbi qui breuius finiantur magis tenuē, qui uero tardius, crassiores uictum exposcant. Præterea labores, & symptomata maiora seu uehementiora, cibum magis quā remissiora prohibere. Iis, & similibus adducuntur rationibus, phlegmatica febre crassiori uictu laborantes alant, quā tertiana. Sed eos à recta deuiare existimo triplici ratione, duabus ab ipsa febre, tertia à morbi utraque causa coniuncta, & antecedente. Et ut apertius res percipiatur, ponamus duos temperatura, ætate, habitu, & reliquis con similes, alterum phlegmatica, alterum colerica febre laborare. Positis cæteris paribus præter febres, & causas utrasque earundem. Uictus, ut in superioribus ostensum est, à uirtute sumitur morbo non prohibente.

Vnumq; diximus alimoniam scopum esse, uirtutis custodiam. Vt à Gal. primo de ratione uictus scriptum est in fine. Vbi igitur uirtus magis exoluitur, plus alimoniam opus esse, ut seruetur, quam ubi minus, si per morbum liceat. At in tertiana febre plus exolui corporis uirtutem quam in febre phlegmatica manifestum est experientia id ostendente. Plus igitur in illa ministrandum est si per morbum liceat. At licet, nam una integra die & nocte sunt à morbo liberi agrotantes, & placide quiescunt. At in phlegmatica febre contrarium accidit, ita ut neque tanta fiat exolutio, neque tantum per morbum liceat. Corripiuntur enim à febre omni die, & non raro prima adhuc non euanescente proxima subintrat. Aut parum est id quo quiescunt, temporis, & id quantumcunque est, absque motione aliqua intrinseca non est, incipiente ad instantem paroxysmum disponere. Vnde fit, ut necessum sit febricitantem alere priore febre adhuc non soluta, aut si id spectes, intra limites dispositionis ad futurum paroxysmum nutrias. Cunque hoc ut deterius caueant prudentes medici, reliquum est ut primum sit eligendum. At febre adhuc non euanescente, minus cibi & tenuioris dandum esse supra ostendimus de mente Hip. plus & crassioris cum corpus ab ea liberum est. Vnde fit ut magis tenui uictu in phlegmatica utendum sit, crassiori uero in colerica. Ad hæc si humorem pituitosum ulteriori coctione in sanguinem conuerti, & nutrire posse intelligas, magis assenties opinioni huic. Nam in corporibus quæ ab hac detinentur febre, abundant pituitosis excrementis

uentriculus, intestina, & meseraica. Quæ resolutioni utriusq; causæ antecedentis, et coniunctæ obstant. Hæc nullo alio melius quàm subtili uictu consumes; ut recte sensit, qui usq; ad septimum subtili uictu hos transigere præcepit. Quod si antecedentem spectes causam; propter inæqualitatem substantiæ pituitosæ, & qualitatis eius diuersitatem, multo plus habet hic natura quod separet, coquat, & conuertat, quàm in colerica, in qua propter causas contrarias æqualiter putredo concipitur. Ex ijs igitur manifestum est magis tenui uictu alendos esse qui à pituita, quàm qui à bile febri- citant. Iis adde ob multitudinem materiæ quæ ut plu- rimum in hac febre coincidit, cibum non parum obstare eius subtiliationi, incisioni, & consumptioni. In febre uero colerica quantum ad biliosi humoris synceri dispo- sitionem attinet, non solum cibum non lædere, uerũ & inuare, & ad reprimendam humoris acredinem, & ad inducendam humori nimis tenui crassitiem debitam. Assenties uerum esse quod opinamur, si audias quæ ad- uersarius de uictu agens qui quottidiana febre labo- ranti conueniat, scribat. Citans Hip. quarto de ratione uictus dicentem custodire patiẽtem febrem hyemalem in fame oportet. Per hyemalem febrem eam intelligit; quæ sit à phlegmaticis humoribus similibus naturæ hye- mis hæc ille. Quod si ita est, ut ille Hippocratem intel- ligit. Subtilior uictus in phlegmatica quàm in tertia- na exhibendus est. In tertiana enim non custodimus ægrum in fame. Sed re uera Hipp. aliter quàm ille con- tra se perperam opinatur, intellexit. Nam Hipp. non de

omni febre hyemali sermo est, sed de illa quæ praua af-
 fert symptomata. Vt patet ex ijs quæ dixit, lingua
 aspera redditur,prehendunt animi defectiones. Hunc
 iubet symptomatum non febris ratione ægrum, in fame
 seruare. Hæc ipsemet sentit cum dicit huic tam & si
 febris remitti consueuerit, in eo tamen qui per famem
 fit cruciatu conseruare ægrum oportet. Neque per fa-
 mem solum inedia intelligas, sed uictum qui solis adhi-
 betur potibus. Nam λιμοκτόνια uel abstinentiam omni-
 modam significat, uel eam saltem, quæ in potibus solis
 fit, uictus rationem. Vt Gal. citato loco scripsit. A ma-
 nu igitur aduersarij oblatam nobis palmam renuimus,
 malumus quam uictrici manu decerpimus. Ad ratio-
 nem quam adducit pro se aduersarius de distantia, &
 propinquitate status iam supradiximus. Sciendumq;
 non in omni febre instituendam uictus rationem penes
 status distantiam, sed solum in ijs quæ aut continuita-
 te, aut symptomatum causa periculum intra dies ali-
 quot uitæ afferunt. At tertiana, & præcipue exquisi-
 ta citra periculum est. Vt ab Hipp. in primo commen-
 tario de morbis uulgaribus accipimus. Quanto autem
 ab hac degenerat, mixtione phlegmatis cum bilioso hu-
 more non absque periculo aliquo febris est. Nam quot-
 tidiana siue ea nocturna siue diurna sit, eo non uacat
 ut ab eodem discimus. Quapropter ratione periculi
 quod in phlegmatica febre est, tenui magis uictu eos,
 qui ea detinentur alere oportet. Vt in superioribus ad-
 duximus de mente Hip. in eo quod si dolor aliquis uel
 periculum aliquod comparuerit. Quod si in hac re

i. de mor-
 bis uul-
 garibus.

i. de ra-
 tiōe ui-
 ctus.

Gal. ut iudicem quis admittat scio aduersariū non obtenturum. Nam legimus eum auium carnes oua, & pisces petrosos, gallorum testiculos, & similia concedere ei qui tertiana febre laborat. Verum in primo ad Glauconem de quotidiana agens, uictum incisuiū administrare iubet. Talem minus nutrire quā prae dicta manifestum est. Ex ijs aliquis recte colliget in tertiana non pura ubi bili pituita est admixta, subtiliorem uictū competere quā in ea quae exquisita est. Qua in sententia Gal. est eodem libro ubi de uictu per cibum, & potū agens, inquit. In non certis tertianis prohibere oportet magis, in quantum possibile est, ita ut neq; aegritudinem augere neque prosternere patientis uirtutem tempori ampliori affligendam. Id praeterea ab eo percipimus cū in huiusmodi non certis tertianis singulis alternis diebus febricitantes solummodo alere iubet. Quod in pura tertiana non consuluit. Quod ergo tenui magis uictu qui à febre phlegmatica, quā qui à tertiana detinentur indigeant satis ostensum est.

C A P. XV.

SED operae pretium erit uia speculationis inquirere, quae nā uictus forma in quotidianis competat. Nā inter recentiores medicos non conuenit in hac re. Aliqui antiquiores insequentis tenui uictu alere febricitantes usque ad septimum iubēt. Ab hoc ingrossare uictum praecipunt ut uirtus reficiatur, idq; gradatim, Cunque ad ingrossationē debitam augmento peruentū sit, subtiliori utuntur usque ad statum. Alius nō solum primis septem diebus sed per totum ad declinationem

isque iubet, dicens non oportet, ut comedat pullas neq;
oturnices subintelligit quidā neq; alias carnes donec
quiescat febris ab acuitate sua, et uiolentia. Alius dixit
neq; subtilibus, aut subtiliter dietetur, ne uirtus infir-
mi deficiendo molestetur. De ijs qui subtilem amant ui-
zum, quidam aquam hordei ad tres dies cōsuluit. Qui
post hunc secuti sunt medici per tres dies totum princi-
piū morbi intelligunt. Quidā ex arabibus non spernen-
dus author cōsulit, ut per hebdomadā regatur æger ex
aceto & oleo rosarum, zucaro, menta, & oleribus radi-
ce siclae & similibus. Ab alio tamen ex arabibus anti-
quiore medico hanc habuit opinionem, dicente in febre
phlegmatica subtilia regimen usq; ad septimum diem.
Et si uides eam diminutam diminutione multa procede
hac uia. Si uero non uides eam minui, ingrossa regimē
secundum quod tibi uidebitur, quoniam inueterabitur,
& est dubium de casu uirtutis. Sunt & plures qui di-
uersa sentiunt, sed longum esset omnium percurrere opi-
niones. Sed antequam in hanc messem nostram immitta-
mus falcem. Dicere necessarium duco, unde tanta inter
medicos discordia in uictus exhibitione in hac febre or-
ta sit, ut à communi ratione quæ chronicæ febris qualis
uictus competat ostendit, discedant. Causa est, ut supra
tetigimus communis materie abundantia, eueniens ut
plurimum in hac febre. Quæ utriusque causæ, et ante-
cedentis, et coniunctæ præparatione, et consumptionem
remoratur. Hanc esse in uentriculo, intestinis, & mese-
raicis hanc in sanguinē conuerti posse si cōtagiū corru-
ptionis non acceperit certum est. Hac propter eius len-

DE VICTV FEBRICIT.

torem, et tenacem adhaerentiā non potest clysterio, aut ullo alio medicamento incisivo citra commotionem, & lēSIONem melius erradicari quā subtili victu. Nam tenui victu non solum hāc putant consumere, sed & antecedentis materiae bonam partem, natura alimentum sumēte conuerso crudo humorem sanguinem. Nam ut supra tetigimus, putredo in phlegmate inaequaliter concipitur, propter partium substantiae diuersitatem, unde natura multum habet quod separet. Vt ergo medici experiantur phlegmatis putrescentis dispositionem, nempe aptum sit, ut actione naturae ad bonum reduci possit, necne, subtili victu febricitantes regunt ad septimum usque. Considerantq; tunc uirtutis dispositionem multum, aut parum, aut nihil sit imbecillior facta, quod si parum, aut nihil imbecillitatis incurrerit, & cū hoc materiam morbi dispositiones naturales recepisse medicus coniecerit, sciet humorem aptum nutritioni, actioniq; naturae cedentem, & hac uia procedendū esse ad sanationem usque. Quod si contrarium eueniat, à subtili victu cessandum, naturamq; crassiori reficiendam, ut uires assumat contra malum, et fortem hostem. Signum si quidem est, putredine humorem uasta correptum esse. Quapropter ineptum nutritioni esse, contumacisq; resistentiae. Vtraque ergo de causa crassiori victu indicant alendum febricitantē. Quod si quod medio loco est eueniat, ut uirtus imbecilla fuerit, humor autem dispositionem naturae receperit, paulo crassiori victu febricitatem ales, ut natura roboretur. Sed minus crasso quā in praedicto. Est & alia causa

huius controuersia. Febrem hanc chronicam ex sui natura esse, & non absque periculo ut Græci, & Arabes medici testantur. Quia longa est, crassum uictum exposcit, ob periculum uero quod affert, ob paroxysmorum quottidianam inuasionem, & eorum longitudinem, & oris uentriculi lesionem, ad nauseam disponentem, tenuem. Vbi enim aliquod uitæ periculum imminet attenuandum esse uictum nos docuit Hipp. primo de ratione uictus, & primo de morbis uulgaribus. Cum ergo hæc ita se habeant, non ex equo hæc uictus difficultas in omni phlegmatis specie accidet. Nā in acetoso minus quam in dulci, & quam in naturali, at in uitreo adhuc acetoso minus. In salso adhuc multo minus. Nā in omnibus, præter naturalem & dulcem pituitæ speciebus materiæ cōmunis multitudo non coniungitur. Nutritioni præterea parū aptæ sunt. Quo fit ut in ijs præter rationem sit subtili uictu per septē dies uti. Præsertim in ea quæ à pituita salsa ortum habet. Tum in ea summatim, in qua materiæ communes pituitosæ in uentriculis intestinis, & uis ductuum existētes, ineptæ sunt nutritioni, ob prauam earum dispositionem. Quarū in huius operis initio mentionem fecimus. In quibus non parū læduntur febricitantes ex subtili uictu per hebdomadam. In summa in omni febre longæ terminationis cum materia nutritioni est inepta ex abstinentia, aut subtili uictu, febricitantes grauiter læduntur. Ea si quidē grauis noxa non est qua morbus uires assumit, sed qua corporis uirtus exoluitur, morbi dispositione nihil aut parū in melius addente. Id enim manifestū est, nam

si hominē qui sic afficiatur, sola inedia per aliquot dies
 serues, multo eū imbecilliores reddes, humore pituito-
 so parum in melius addente. Crassus enim humor, &
 frigidus natura longo indiget tempore, ut coctionē re-
 cipiat. Præcipue cum longe à propria natura est, Qua-
 re citius uirtutem corporis in deterius subtili uictu ad-
 duces, quàm morbum in melius. Cum ergo hæc ita se
 habeant, grauemq; noxam febricitantes incurrere ostē-
 derimus à subtili uictu, cum humor nutritioni ine-
 ptus est, nisi perpetuo aliquo signo, aut signis id discer-
 nere ualeamus, dementis profecto est aliquid agere ali-
 cuius commodi gratia, sub periculo maioris damni.
 Quod si id citra uirium dispendium adipisci posse alia
 uia speres, qua materias communes absumas, & ante-
 cedentes si opus fuerit, non ne illam amplectendam esse
 merito quis existimabit, quapropter cum signum certū
 firmum non habeamus, quo à prima, die discernamus
 humoris dispositionem, an ad nutritionem sit aptus nec
 ne, multo melius est, & ægrotantibus salubrius, com-
 muni uia, & regia circa uictus rationem procedere, ci-
 tra aliquod uirium incommodum, quàm ægrotantem
 per discriminum compendia ducere. Adde quod si hoc
 detur, ut à primo die humoris naturam cognoscas aptā
 esse nutritioni, si materie communis adest abundan-
 tia, & hanc quoque subtili uictu consumere speres,
 prius putredo in antecedentis materie altum penetra-
 bit, quàm natura communem absoluerit. Lōge melius
 profecto est, clysterio quæ in inferiori cōtinentur uētre
 euacuare, lenitino mānæ, aut floris cassiæ cū oximelite
 aut

ut melle quæ in superioris ſunt. Hoc ſi ſemel, aut bis uſus
ueris cū uictu, ut oportet inciſiſuo intra dies tres mate-
rias communes abſumes. Licet earum abundantia de-
ur. Et interim materia antecedentem non penitus ne-
glexiſti. Horū ſi quidē lenitiuorū quæ acutior pars eſt
ad iocinorē uenas, et renes feſtinat, ad materiamq; an-
tecedentem cui obuiat non parum iuuat. Quibus ij qui
ſubtili uictu ſuos nutriunt febricitantes uti nō poſſunt.
Nam ieunantes non oportet laborare. Quod ſi commu-
nes non adſint materiæ, antecedentis autem bonam nu-
trire poſſe partem conieceriſ, optimum eſſe iudico ſubti-
lem uictum adminiſtrare. Vt pote quo natura plus tem-
poris in opere impendit, antecedentemq; ob id mate-
riam citius apparabit, bonum ſeparans, et ſibi accipiens
prauum ad expulſionem præparans. In ſubtili præte-
rea uictu inciſiuas qualitates, & abſtergentes inue-
nias quibus in magis nutriente uictu ſimiles non repe-
ries. Sed difficilis admodum eſt coniectura diſpoſitionis
humorum qui iam putredinem conceperunt, an ſint ad
nutritionem apti nec ne, niſi id experientia oſtenden-
te diſcamus. Qua in re non expectandum eſſe ſeptena-
rium duco, ſed melius ita agere. Cum ex ſignis pi-
tuitam naturalem, aut dulcem eſſe, putredinemq; non
profundatam in materia conieceriſ (quod ex febris ue-
hementia, longitudine, et ipſius inceptione, et finitione,
præterea ex ſymptomatibus, & ex colore faciei, et alijs
percipies.) parato ſtatim cliſterium ad hunc modum.
Cētauream minorem, camomillam, hyſſopum, maluas,
hordeum excorticatum, contuſum, in aqua, & oleo

Q

DE VICTV FEBRICIT.

communi ad æquas partes bulliant quousq; consumpta aqua, olei residentis untias decem accipito, adipis anatis aut capi, & mellis, singulorum untias tres, salis parum, quantum possit sublineat. Ab excretionē dato oximelitis untiam unam, mellis rosati collati unam, & semis, aquæ decoctionis seminis fœniculi dulcis duas, et semis, misce dato bis eadem die. Sequenti aurora floris cassiæ, aut manna untiam unam, & semis, dissolutæ in aqua decoctionis seminis fœniculi dulcis thymi, et hyssopi, oximelitis untias duas, dato hora quietiori diei secunda. Quod si bibere potionem renuerit, fac tres bolos cum zinzibere, et zucaro, quæ postquam deglutierit, sorbeat oximelitis coclearia septem. Cūq; hæc peregeris ægrū symmetro uictu seruato eo modo quo supradiximus. Hoc est crassa sorbitione ex decocto pullæ, & ex carnibus eius. Die tertio syrupum bis dato, & similem uictum exhibeto. Quarto die cliesterium ministrato et simili uictu febricitantem alito. Verum à quarto die ad septimum hoc uictu ægrotantem nutrias.

Cicerum electorum man. tres, hordei duos, infundito in aquā tepidā per totam noctem in testa recēti, proijceq; aceti albi tantū ut aqua acetosa reddatur. In crastinū olei purissimi antiqui quantū satis misceto, petroselini thymi singulorum man. unum, salis parum, coquito ad lentum ignem. Vtere decocto ter in die, et cum pane sorbitiunculam facito. Propinabisq; ante cibū mellis rosati collati coclearia duo, oximelitis unum ut supra diximus. Hoc uictu utitor ad septimum usque. Quo temporis interuallo nec purgante medicamento nec clisteri

uteris. Die octauo & uires infirmi & ægritudinis dispositionem contemplare. Si nullam differentiam inueneris sensibilem ad undecimum ita transi. Quod si tunc ægrotantis uirtus parum fuerit imbecillior, morbi autem dispositio in melius plus addiderit, perge hac uictus ratione. Si alias eueniat, crassiori utitor uictu. Et quia bona hominum pars unum duntaxat uictum per dies aliquot ferre non possunt, sunt & qui cicera odio habent, cibum alium apponemus huic proposito maxime idoneum, quo uti possunt qui tenui uictu in hac febre per dies aliquot procedendum esse iudicant. Petroselini berberorum singulorum man. unum, coquito in aqua modice quantitatis &c. In qua duo oua bullire tandiu finito, ut satis dura reddantur, fac collaturam cuius accipito partes tres, olei purissimi unius semis, aceti unam, zucari unam, cum pane fiat sorbitio ad lentum ignem. De subtili igitur uictu qui ad dies septem ab antiquis arabum medicis obseruatur satis sint dicta.

CAP. XVI.

SED qualis uictus ijs qui à quartana detinentur febre conueniat, iam percurramus. Hæc à triplici humore ortum habet, nempe ab atrabile quam sanguinis fecem recte quidam nuncuparunt. Et ut plurimum fit, nulla alia præcedente febre. Fit etiam à bilis crocæ & à pituitæ incensione, & hæ duæ species quartanam notham seu non puram efficiunt, successu aliarum febrium, scilicet tertianæ & quottidianæ. Fit etiam ex sanguinis adustione. Verum ex incensione melancoliæ

Q. ij

DE VICTV FEBRICIT.

naturalis atra bilem posse fieri certum est, sed quod ab ea generetur febris quartana non recipimus. De hoc alias differeendi aptior dabitur locus. Nunc quem uictū singulæ species exigant dicamus. Iis qui à naturali melancolia febricitant, hanc ministrato sorbitionem.

Pulegij, scolopendrij, hepaticæ, passularum enucleatarum singulorum man. unum, coquito cum pulla crassa, parum antequam ab igne amoveas, immitte florum borraginis man. unum. Coquātur simul, quousque sint permixta, croci modico adiecto, ius dato febricitanti. Ex reliquo fac sorbitionem.

Sorbi-
tio ex
colo-
pedrio.

Iis qui intemperie frigida, & sicca laborant, conuenit pulegij, chamæmeli, scolopendrij, hepaticæ singulorum man. unum, passularum enucleatarum unum, coquito cum capo, aut pulla crassa, adiectis floribus borraginis, fac ut supra. Cunque omnia percocta sint, decoctum collato, cuius accipe libras tres, medullæ cruris uitulilibræ unius semis, bulliant ad lentum ignem quousque permisceantur. Dato ut sorbeat bis in die aut ter, quod si iuuenibus, aut alijs natura calidis cibum similem parare uelis, loco chamæmeli utere uiolis, cum pullis duobus, reliqua exerce, ut supra.

Sorbi-
tio ex
medul-
la.

Aceti albi libram unam, & semis, passularum enucleatarum man. unum, pulegij, chamæmeli, conquassatorum ana man. unum, & semis infunde in acetum per diem & noctem, deinde parum coquito, & collato. Hoc acetum dicatur pulegij.

Acetū
pulegij.

Huius accipe partem unam, olei amigdalorum dulciū recenter extracti partes tres, zucari alti partes duas,

coquito in duplici uase quousque permixta fuerint, dato coclearia quinque ut sorbeat ter in die. Quod si caput arietis coquas cum pulegio chamamelo, passulis, scolopendrio quod alias ceterach arabes nuncupant, efficies ius, & sorbitionem satis conuenientem ad siccum affectum. In Anglia expertum est mixtionem uini, & lactis his prodesse facta distillatione. Calidam, & humidam aquam ex ijs fore ratio demonstrat. Qua sanari posse eos qui frigida, & sicca intemperie laborant uerisimile est, si parum abcesserint à naturali temperie. quod si quartana à bili adusta ortum habeat, hoc uictu utere. Si iuuenis sit.

Sorbitio
ex capi
te arietis

Accipe hordei excorticati ab utroque cortice, man. unū & semis, uiolarum recentium, hepatica, chamameli, singulorum man. unum, coquito cum duobus pullis crassis quantum satis, deinde parum antea quam ab igne amoueas, addito florum uiolarum man. tres, collato accipitoque huius decocti libras tres, medullæ cruris uituli libræ unius semis, coquantur omnia simul donec permisceantur, dato ut ter in die sorbeat.

Sorbitio
ex flori
bus uiolarum.

Sorbitio quoque ex pedibus uituli decoctis cum hordeo uiolis hepatica pulegio scolopendrio, aut politrico passulis, croco, ualde utilis est ijs, qui a bile adusta febricitant, cum coquantur donec tenerrimi reddantur.

Aquæ decoctionis florum uiolarum, aut borraginis libram unam, amigdalarum dulcium, & nucleorum persicorum singulorum untias tres, excorticentur, et tritentur diligenter, & exprimito in decoctum toties donec aqua albescat, butyri recentis multoties loti untias

Q iij

DE VICTV FEBRICIT.

Lac nu
cleorū
perfico
rum.

tres, zucari albi quantum satis, sit cinamoni parum, bulliant ad lentum ignem donec permixta sint.

Lactucas quoque crudas ex melle offeres ijs, ut cum libuerit deuorent. Iis ante cibum dato syrupi uiolarum purissimi untias tres, uinum album dilutum ex aqua de coctionis politrici recentis, super bibant.

Sorbitio
ex adipe

Iis qui quartana ex phlegmate adusto laborant sorbitionem parato, ex pulla crassa cum chamæmelo, pulegio, thymo, passulis, satiregia, postquam herbas iam coctas abstuleris, axungie ab anate recenter extractæ, aut capi si illius copia nō detur, immitte untias tres, longi piperis grosso modo contriti, grana tria, bulliant simul adiecto croci modico, ius propina ubi oportet ex residuo fac sorbitionem.

Sorbitionem præterea ex fursure cum chamæmelo pulegio & melle administrato. Quam in fine huius libri cum de obstructione nobis sermo fuerit traddemus.

Sorbitio
ex alleis.

Pinguis arietis ceruicem, satiregia, chamæmelo, pulegio, tribusq; alijs integris ciceribus & sale coquito, cunque herbas iam coctas abstraxeris, addito adipis anatis, aut capi recentis partem quintam, croci parum fac ut supra.

Sorbi-
tio ex
camo-
milla.

Capum pinguisimum cum chamæmeli tribus man. coquito, & cum sale & croco fac ut bulliat sufficienter, consulite egrotanti ut bis aut ter in die magnum sorbeat haustum calidum. Commodissima his sorbitio hæc est, ad alios usus etiam utilis. Ante cibum ijs dato mellis uiolacei coclearia quinque.

Iis qui quartana ab adustione sanguinis laborant, hūc

administrabis uictū. Hepaticæ man. tres, hordei ab uno cortice exuti, capillorum ueneris recentis prunorum singulorum man. unum, passularum enucleatarum unum, eupatorii quod alias agrimonia à Dioscoride dicitur, foliorum pentaphilonis singulorum unum & semis, coquito simul cum duobus pinguisimis pullis, aut in uene capo, fac ut supra. Ante cibum sorbeat syrupi uio-
larum coclearia tria, syrupi borraginis coclearia duo simul mixta.

Sorbi-
tio ex
eupato-
rio.

CAP. XVII.

INTER medicos circa uictum qui quartanæ cōpe-
tit non satis cōuenit, sunt qui magis crasso in initio quā
in augmento & hic quam in statu utendum esse con-
tendāt, continuārū febrium rationem, ad omnia febriū
genera communem facientes. Sunt qui contra cēseant,
nempe in principio magis tenui, & crassiori semper ad
statum nutriendos esse ægrotantes, in eo autem tenuius
multo reficiendum esse. Sunt & alij mediæ opinionis,
qui à principio ad aliquot dies tenuiter febricitantes
reficiunt, deinde crassiorem exhibēt uictum. Multoties
quartanas febres in principio curatas esse tenui uictu
dicentes. Si enim febris parum sit duratura, & cras-
sum uictum in principio humoris resolutionem prohibē-
tem ministraueris longiorem eam efficies. Quod si lon-
ga futura sit, parum nocebis aut nihil, si tenui uictu
quo uirtus non absumatur per dies aliquot utaris. Qui
ita sentiunt pullorum carnes ad uigesimum diem pro-
hibent. Ego autem quid sentiam citra disputationis con-
tentionem dicam. In quartanis quæ aliarum febrium

Q. iij

DE VICTV FEBRICIT.

*successu fiunt, locū non esse huic dubitationi arbitror. Non est enim quod uirtutem multum defatigatam à præcedente febre, & aduentu alterius, iam languescen-
 tem, tenui uictu exoluas, ad certamen eam denuo im-
 pellens. Neque si detur ut tenui uictu laborantem ad
 uigesimū diem, serues, & morbi materiam absumas, ob
 id hominem à febre liberabis. Nam in quartanis febr-
 ibus quæ post alias succedunt, solent ab intemperie ali-
 qua, uiscera molestari, quæ morbum fouet, & duratio-
 nis eius præcipua est causa. Hac enim stante in uasis, io-
 cinere, aut liene, continua fit humoris regeneratio. In
 quartana igitur febre quæ successu alicuius alterius fa-
 cta est, præcipuus sanandi hominis scopus est, ut uisce-
 ra ad pristinam reducamus temperiem. Cæterum alte-
 rantia medicamina cibus immiscere melius esse supra
 ostendimus, quam si nuda exhibeamus. Vt consueuere
 triuiales nostri temporis medici, quorum nisi quis syru-
 pos, apozimata, distillationum aquas, electuaria, purgā-
 tia medicamenta exhibeat, se nihil bono medico dignū
 egisse putat. Et hinc fit ut ex reiteratione multiplici il-
 la fastidientibus infirmis, in uentriculo non recte ad
 actum reducantur, quæ causa est ut infæliciter operen-
 tur. Quapropter non solum non prodesse tunc tempo-
 ris, sed nocere certum est. Cum multoties propter illa
 cibos fastidiant infirmi, & imbecilliores ideo reddan-
 tur. Quicunque igitur medicam artem ita exercent, ne-
 cesse est, ut multoties ægrotantes lædant, præsertim si
 corporibus imbecilibus, & à longis ægritudinibus ta-
 befactis obuiant. Qui uero Hip. sequuntur, & eius in*

primo de morbis uulgaribus acquiescunt consilio, dicē-
tis. In hoc te exerceto, ut saltem si non prosis ne quid no-
ceas, longe melius esse existimabunt, ut huiusmodi cor-
poribus non tenuem uictum, non medicamina alteran-
tia, si nuda offerantur, sed ijs quæ nutriunt, & bonum
generant chymum, ea miscere, quæ paulatim ualeant
morbificas partium intemperies euertere. At in febre
quartana quæ repente incipit, subtilem uictum ut pote
qui facilioris coctionis sit, ad dies uiginti qui septē con-
tinet quartanæ periodos, probo. Hunc dico pullorum iu-
scula, sorbitiones, eo quo supra parauimus modo.

CAP. XVIII.

SED cum in quartana febre compertum sit ciba-
ria diuersa prauæ substantiæ, liberare multoties eos qui
hac febre laborant. Ita ut alios, uirides ficus, aut uuas
nocturno rore madentes, alios carnes porcinas ad satie-
tatem comedētes, sanatos esse sciamus, & plurima alia
id genus. Ad medicum arbitror attinere, si horum non
lateat rationes. Vt ijs quādo occasio affuerit uti sciat.
Præterea quātum medico dedecoris est, per plures dies
& menses uarijs remedijs abuso, et nihil proficienti, ac-
cedente rustico falsuginem offerente, sanetur ægrotās,
medico & eius arti irridente, tantum ei gloriæ est ea
non latere quæ multoties admirabili ui homines repen-
te ab antiquis liberant ægritudinibus. In febre igitur
quartana rationem reddere conabimur, quam ob rem
diuersa cibaria quæ prauæ substantiæ sunt, aliquoties
quartanam soluant. Secundo illud aliquoties, signis
manifestis describemus, ut cum occasio affuerit eam

DE VICTV FEBRICIT.

arripere diligens possit medicus. Paroxysmorum causa, motus est humoris putrescentis, cui naturæ expulsio cōiuncta est. Putridi humoris est, quodā putredinali irritamento naturam instimulare. Facultatis uero expultricis, humorem certis periodis irritantem, meliori quo possit modo, depellere. Contingit autem ut cum per sensiles repente excrementorum copia feratur partes, horrorem, rigorem, aut frigus excitari. Motus ergo ille quodammodo medius est inter naturalem, qui à natura sola naturaliter operante fit (ut cum post coëtricis facultatis actionem agit) et in naturalē, qui à sola causa præternaturali fit, ut cū mouetur furiosus humor. Nec igitur à sola natura fit paroxysmus. Nec à solo humoris irritationis motu, periodicè febres cōtingunt. Vterq; enim motus & naturæ & humoris concurrunt, in paroxismo, ut perdocte à Petro Aponensi peritissimo medico scriptū est, in hæc uerba. Quantum (inquit) ad naturā particularem comparando in quantum scilicet motus humorū ex actione uirtutis dependet, tempora periodū in morbis non sunt determinata, nec unius modi, ut possimus dicere quod morbus factus ex cholera habeat motū de tertio in tertium, et de phlegmate in diē, & ex melancolia in quartū, immo respectu cuiuslibet humoris hæc tempora sunt, & possunt esse diuersa. Ita ut aliquando periodicè morbus factus ex uno humore eueniat secundū dies, aliquādo secundū menses, uel annos. Quod ideo contingit quia uirtus expulsiua suā operatur actionē quocunq; tempore superflūū ei occurrerit, irritans eā per sui læsionem ad actum expulsionis,

¶ quia tale superfluum potest diuersis temporibus occurrere cum eius generatio dependeat à causis diuersis, nunc uno tempore occurrentibus, nunc alio, et alio iccirco tempus periodici motus non est unum, sed diuersum. Similiter & aggregatio superfluitatis, quæ depēdet ex defectu uirtutis digestiue non habet tempus præcise determinatum, sed diuersum secundum diuersitatem eorum, quæ occurrunt intrinsecus, & extrinsecus. Hæc ille, interceptio ergo paroxysmorū dupliciter contingere potest, aut ratione expultricis facultatis, aut ratione superflui aggregati, primū adhuc dupliciter, aut quia non instimulatur, factō sensu hebetiori, aut ob fortem animi motionem expultricem ab opere suo perturbantem. Ad primum modum reducuntur medicamenta ea, quæ uirtutes habent narcoticorū, ut theriaca, athanasia, philonium Romanum, quæ sanare quartanas febres experientia compertum est. Id etiam discimus ex Gal. ijs diuersis locis utente, ad sanationē febris quartanæ. Ad secundum reducitur quod ab aliquibus dictum est ob uehementem letitiam plures quartanam euasisse febrem, sensoria facultate munere suo non fungente. Ob quamlibet prædictarū causarum uirtus expultrix non irritata, expulsionis opus non aggreditur. Non facta expulsionē interrumpitur paroxysmus, ut supra habitū est. Ratione superflui dupliciter, aut quia non aggregatur, aut si aggregatur euacuatur. Primo modo adhuc dupliciter, aut ob uigorem uirtutis coëtricis, aut ob defectum causæ aggregatricis. Et hoc adhuc dupliciter, aut ut efficiēs, aut ut materia. Hoc modo alimus febr-

DE VICTV FEBRICIT.

citatem febre quartana cibarijs, quæ suapte natura in melancoliam facile conuerti non possunt. Talia sunt cibaria calida & humida, non quæcunq; sed quæ non facile in melancoliam conuertantur, ut pulla gallinacea, capus, arietis caro. Sunt alia quæ calida & humida sunt & longe absunt, ut in melancoliam conuerti possint, talia sunt olea matura præcipue amigdalorum, sesameæ, axungie anatis, ficus aridæ, & similia. Omnia ergo huiusmodi cibaria calida & humida difficulter melancolicæ naturæ cèdentia, si cum hoc à coëtrice facultate facile uincantur, utroq; modo quartanas febres sanant, nempe efficientis causæ & materiæ ablatione. Id est quia melancolici humoris intemperiem aggregatricem, scilicet causam contraria qualitate euertunt, & quia ut materia inepta melancolico humori, cessare faciunt atra biliosi humoris regenerationem. Ad has duas causas reducuntur cibaria à nobis supra scripta, quæ quartana laborantibus administrari iussimus. Hoc modo oleum amigdalorum dulcium cum croco, aceto paulo bibitum, sanat quartanas. Hac de causa distillatione uini et lactis plures quartanam euasisse compertum est in Anglia. Tunc ob fortitudinem coëtricis facultatis ægrotantes euadunt quartanam, cum maior pars humoris qui ad paroxysmum aggregatur suppeditatur à cibis & potibus quibus quottidie laborans utitur. Cunq; hoc coniecero facultatem roborare coëtricem, quartanæ remedium esse scias. Roboratur dupliciter, aut absolute, aut respectu alicuius cibi, & potus. Pro comperito est ea quæ nimis delectant, & placent, melius à co-

Trice, coqui ab attractice trahi, à retentrice retineri, uberiusq; multo nutrire, et minus superflui ab ijs quàm ab alio implacido accrescere. Hoc modo cibum quem auidissime febricitans appetat quartanam posse sanare experientia compertum est. Quod si præter hoc quod magno appetatur affectu supra dicta habeat, quæ ad defectum aggregatricis causæ facere diximus, adhuc certius quartanam erradicare posse sperabimus. Hac de causa plurimos carnis porcinae usu, à quartana liberatos fuisse compertum est. Quia enim nimis appetitur recte coquitur in uentriculo, iocinere, & uenis, quare parum ex ea superflui colligitur, sed & intemperiem obiter siccam quæ humoris atra biliosi uelut scaturiens fons est, mire corrigit. Soluere igitur quartanam carnem porcinaam aliquando posse, ex dictis manifestum est. Quæ etiam absolute roborant coctricem facultatem, quartanam soluere possunt. Vinum ante omnia præcipuè odoriferum id habet, ut ualèter naturales roboret actiones, unde ebrietatem posse curare febrem quartanam, tum hac de causa, tum sensu facto hebetiori haud dubium est. Curantur similiter quartanæ febres ex superflui aggregati euacuatione. Hoc modo medicamenta melancoliam educentia, ut polipodium, epithymum, sene, corticem hellebori, sanare quartanas pro comperito est. Hanc partem solum sibi nostræ tempestatis medici reseruauerunt, reliquas omittentes, ac si non esset præter illā uia alia, qua à quartana liberentur homines, hoc modo qui uuas maturas nocturno rore madentes ad saturitatem ingerunt, & ficus magnas tempestiua ma-

DE VICTV FEBRICIT.

turitate cadentes, à quartanis febribus liberantur. Hi enim et similes fructus aliuū aliquando immodice cient. Cū igitur perceperis ex cibis, aut potibus humoris maiore partem qui paroxysmum efficit suppeditari, dandi ea quæ placent tunc occasio est. Illud autem ijs signis percipies. Primo subtiliori te utente uictu per aliquot dies, si imminuatur febris magnitudo & uehementia. Secundo, cibo id experieris, qui difficulter in melancoliam conuertatur, aut minimū habeat melancolicæ naturæ. Si enim hoc cibo te utente per dies aliquot, imminuatur paroxysmus, adhuc certiori cōiectura inniteris, à cibis & potibus humoris maiorem partem ad paroxysmum suppeditari. Hoc idem est ac si dicas si iuxta ciborum quantitatem & qualitatem quibus laborans utitur ita uariant paroxysmi, cōiectura assequeris exhibendi ea quæ ægrotanti placent occasionem adesse. Quare diligenter inquirito quem nam ex cibis febricitans ardentem appetat. Si ex ijs fuerit, qui qualitate atra bili contrarius est, & tali substantia, ut difficulter in melancoliā conuertatur, laboranti porrige hora cōsuetā, quæ ab initio uenturi paroxysmi duodecim horis ad minus distet. Comedat pro appetentia citra saturitatem. Quod si cibus quem appetierit melancolicæ naturæ sit, aut in melancoliam facile conuertatur. Considerare tum opus est signa cōctionis, quæ si sint, dato eo, quo diximus, modo, quod si non, modicum illius febricitanti abnegare nolli, sciens nonnulla fieri & plura posse, citra rationem homini manifestam. Parū insuper deterior cibus si delectabilis, &c. Quæ facultatem

expultricem respiciunt, tunc sunt administranda cum nimis uigilanti sensoria facultati præcipuâ continuationis paroxysmorum dederis causam. Tunc aut his quæ aliquâ habent narcotici uirtutem, aut forti & repentina aliqua motione, sensum ægrotantis oportet hebetescere, animum alio trahendo. Illud percipies si primo quæ nam sint corpora acuti sensus cognoscas. Hæc aliquando iusto quærentur, quandoq; iniusto. Cum initia paroxysmorû grauiter ferunt, rigore, frigore, uehementer quatiuntur molestantur, ipsam autẽ febrẽ paruam, magnitudine, duratione, uehementia intelligas. Scito sensoria in ijs facultatẽ parumper ob dormire remediũ esse. Sunt tales ij qui acerrima sunt præditi imaginatione, ita ut multoties cogitantes rideant, facies mutet, oculos, manusue moueant. Iis parua occasione, imaginatio coniuncta, multoties paroxysmum efficit. Quare hos tales curabis si eorû mentes alio trahas, ut mihi in Anglia contigit. Erat iuuenis habitu gracili sicco temperamento, laborans tertiana, cunque post aliquot dies abire Londinum decreuissẽ (nam in rure erat) ei dicturus accessi, quæ me discedente agere deberet. Cunque finem sermoni imposuissẽ, tu inquit discedis quia me moriturum certo conijcis. Cunque iureiurando contrarium ostendissẽ, repente in lecto sedens, uestem & calceos petiuit. Quid inquam cum istis agere uis, surgere inquit, ut experiar an me meis pedibus sustinere ualeam, quod si hoc detur abi. Cunque surgens in fenestram quæ in uirides campos late patentes prospectũ habebat concessisset, intuens, animi deliquio captus

DE VICTV FEBRICIT.

est. Cunque in lectū portaretur parumq; requieuiſſet, lachrymis obortis, domine inquit Brude non ne tibi dixi quia morior. Cunque uxorem clientes, & amicos conuocaſſet, omnibus aſtantibus dixit, ſcitis amici morior, medicus abire uult, ut me morientem non uideat. Cunque ei obieciſſem, quid inquam mihi dabis, ſi te ab hoc morbo liberum reddam. Repente mirō animi aſſectū commotus, pete inquit, non minus dabo quam poſtulas. Cunque peterem dedita opera aliquot aureos. Parum inquit petiſti, allato ſcrinio numerauit pecunias. Quia inquā ſtatim ſoluiſti liberalis uiri functus officio, non te relinquam prius, quā ad rus concedas, & perdices, et phasianos aliquot ex tua uenatione mecum in domum portē. Hoc audito clamauit ſanus ſum. Cunque aperte perſpexiſſem hominem acri præditum imaginatione, ut qui modo mortuum ſe eſſe putabat, nunc ſe ſanum fateatur, pectore hæc uerſatus, modum quo hominem à tertiana liberarem inueni. Die ſequenti cum febris hora decima eum inuaſura eſſet, nocte ante habito cum uxore, & clientibus conſilio. Iuſi ut omnes fenestræ ad horā nonam aperirentur (aperiebantur enim ante ſextam) tresq; horas hæro ſuffurarentur. Cunque hoc ita decretum eſſet, mane omnes ex conſulto non intrarunt in cubiculum. Cunque uxorem hora octaua uocaſſet, quotta inquit hora eſt, illa quintā dicens, dormireq; eum iubens abiit. Hora tranſacta clientē uocans, cum ab eo accepisset horā eſſe ſextam, quiete egit, poſt horā quam ſeptimā exiſtimabat, acceſſi. Cunq; in ſermonibus horam traxiſſemus, præcor inquam

quam domine Culpepare duas horas, quæ ante paroxysmum supersunt ad aleam teramus. Cunque annuisset, lusimus hora una. Cunque uxor eius rem risu dissimulare non posset, rem omnem homini pandimus. Meridiemque iam esse, duasque horas post paroxysmi tempus, & ita sanatus est. Superest nunc occasionem designare qua adhibitis ijs, quæ aluiū cient, curetur quarta na. Et si à medicis plurimis sciamus signis esse ostensam, nihilominus, quia id communibus non proprijs eger signis, in præsentī tantummodo libare nō ab re erit, ut compleamus sermonem. Cōmune illud medici observantes præceptum nempe concocta medicari, et movere non cruda, &c. Item inchoantibus morbis, &c. Pharmacō educēte utuntur. Nec itaque ob id quod morbus statim non curatur, male egisse censebitur. Nam non omnis euacuatio, quæ ab arte fit, ideo fit ut illico ægro tans sanetur. Neque etiam euacuationes quæ à natura regulariter operante fiunt, hoc obtinent, sed aut sanant, aut alleviant, aut in præsentī, aut in posterum. Sic sat est si quæ ab arte recte fiunt euacuationes sanent, aut allevient. Occasionem medici signis designarunt, qua pharmaca educētia adhibita alterum duorum efficiunt. Et est cum adest morbi cōstio. Tunc enim euacuatio adhibita, ut plurimum illico sanat, aut alleviat. Præterea cum materia nimis multa est, euacuatio adhibita alleviat in posterum. At occasionem signis designare qua euacuatio adhibita illico sanat, difficile admodum est. Adhuc difficilīus eam sensu assequi, ut pote nimis præcipitem. At plures scimus qui longas febres

R

passi medicorum opem inanem diu experti, à rustico fi-
licul am, aut rici semen, aut quod uis aliud ministrante
repente liberati sunt. Indeque arbitratur uulgus illa
pharmaca longe ab ijs quibus medici utuntur abesse, et
ea ut sacra ueneratur, ignorans quanti sit occasio ad sa-
nationem momenti. Hanc naetum medicum secure ope-
rari, cito sanare posse certum est, minimo humani cor-
poris damno. Morituris nullius occasionem esse. Adhi-
bendi ea quæ aluū cient in quartana, aut alia longa fe-
bre occasione, in principio morbi, aut inclinatione quæ-
rere oportet. Iis duobus temporibus intemperies non
est, quæ febrem ad longum foueat. Verum quandoque
intemperies febres præcedit. Oportet ergo, ut signis
proprijs singulas quas in corpore unaquæque febris ge-
nerat intemperies cognoscas. Cum has omnino abes-
se scias, humorem autem collectum in loco uno ex hy-
postasi laudabili, coniicies occasionem adesse pharma-
cum offerendi. Fructus autem qui medicamēti educen-
tis uim habent, plus prodesse quia citra abhominatio-
nem assumuntur, quinimmo appetuntur, ut pluri-
mum. Quapropter recte in uentriculo ad actum redu-
cuntur, & per totum distribuuntur corpus. Vnde qua-
dā naturali, & consueta naturæ corporis actione, suum
opus agunt. Quare multo commodius id quod noxium
est educunt. Contrarium euenit ijs quæ cum uiolentia
operantur pharmacis, naturæ corporis uim inferētibus,
quadam præter naturali commotione, bonū simul cum
malo educentibus. In ea autem commotione noxiij con-
tactu bonum posse affici certum est. Vnde fomentum

dari recidiuæ. Quare habita occasione ijs quæ citra commotionem edunt utere.

CAP. XIX.

MALITIA morbi quam Græci κακοήθεια uocant, dupliciter dicitur, aut actionis, aut resistentiæ ratione. Primo modo malignum dicimus morbum, cum uiolenta actione substantiam spiritus qui naturæ unicum est instrumentum exoluit, aut sanguinem ad eorum generationem indisponit. Aut quia pertinaci resistentia uires coquentis facultatis obtundit. Primum malignitatis modum tetigit Gal. in expositione illius, & refrigera-
 4. de r
 tione
 uictus.
 rata extrema. Secundum quarto de methodo medendi aliquod ulcus cacoethes, hoc est malæ morigerationis uocans. Pestilentes febres primo modo malignæ sunt. Vtroque autem modo febris quæ à carbunculi inflammatione originem habet. Pestilens febris non eam quam reliquæ acutæ febres uictus rationem exposcit. Causa est quia tenuem uictum in illis, ob id maxime ministramus, ut natura coctioni materiæ morbi fortiter uacet. At in pestilenti febre id diligenter curamus, ut duellum inter naturam, & pestilentem humorem ceueamus. Nam ut plurimum ex tali certamine natura uincitur, ut scite à Gal. scriptum est in Apho. cū dixit. Nouimus plures ex crisi-
 bus sanatos quam mortuos nisi pestilens fuerit constitutio, &c. Cum ergo hoc ita se habeat, cessat in pestilenti febre una tenuis uictus causa. Quinimmo cum hæc febris substantiam spiritus fortiter exoluat, & materiam ad eorum generationem indisponat, oportet ut diligentia omni prudens medicus

R ij

DE VICTV FEBRICIT.

& cibo, & potu competentibus, materiam generationis spiritus suppeditet. Et quia ab antiquis medicis ostensum est spiritus unicum esse ad omnes actiones instrumentum, cunque in nullo, & si acutissimo morbo tanta fiat spiritus consumptio ac in pestilente febre, recte quis colliget eo cibo utendum esse qui facillime sit coctionis. At huiusmodi cibaria tali sunt substantia ut prompte huc, & illuc mutetur, ita ut rationabiliter uerendum sit ne à pestilenti corrumpantur prius contagio, quàm à naturali calido uincantur. Crassa uero cibaria exhibenda non sunt, quia à naturali eorum calido, ut pote languido uinci non possunt. Quæ causa est, ut non solum spiritus materiam non ministrent, uerum, & in pestilentem causam addant. Cùm necesse sit alterum duorum eis dominari. Quæ facillime coctionis sunt, & mediocriter nutriunt, ut oua, & carniū succus, fugienda esse uidentur, nam promptus à pestilentis contagij ui, quam à natura uincantur. Difficile igitur nimirum est conuenientē cibum in pestilenti febre reperire. Talem dico qui materiam spiritus abunde suppeditet, facillime sit coctionis, difficulterque pestilenti cadat contagio, in simplicibus hæc inuenire raro admodum est. Quare in ijs, quæ adinuicem miscentur, quod conueniat reperire tentandum est. Iis quidem, quæ spiritus multitudinem creant, et facilis coctionis sunt, ea miscere, quæ pestilenti contagio obsistant. Et autem sunt, quæ natura sunt sicca, et in altum corporis cita penetratione semergunt exiccantem facultatem toti communicantia. Quod si præter hæc à tergo astrictoria polleant ui, quæ cor-

poris vias compescant, quodcunque id sit pestilenti contagio obstare recte dicetur. Sal in primis habere locum usus ostendit, quo corpora incorrupta ad longum tempus seruamus. In eo igitur iam dicta percipimus nempe exiccationem, penetrationem, & astrictionem. Secundum locum habent omnia acetosa, ex quibus acetum in primis se offert, deinde succus arantij, & succus maligni granati acidi, ab ijs amara, sed quia calida sunt, minus conueniunt. Oua recentia facillime sunt coctionis, et ad generationem spiritus materiam prebent. Ne ergo in pestilentem materiam conuertantur, ea hoc modo exhibere expediet. Ouum recens integrum immittito in aquam frigidam mixtam cum aceto, ibique esse finito tribus horis, tandem ouum rumpito, & album extra mittito, succo arantij, aut aceto albo capacitatem impleto, salis tantum addito, ut mediocriter salsum efficias, coquito supra cinerem calidum, miscetoque donec crassum reddatur. Vtere eodem cum succo mali citrei loco arantij aut aceti. Item perdicis carnosae, aut phasiani, aut iuuenis colombee viscera effodito, eamque salem condito, ita ut perdicem mediocriter salitam efficias, eam sic esse finito die una in aestate, aut duabus in hyeme. Postmodum in eam mali citrei frusta immittito, & petroselini folia, ut quod inane in perdice est impleatur, eamque ad ignem lentum coquito. Cunque humor intrinsecus extra erumpat, & perdix tota humecta fiat, super eam sal undique spergito. Cunque mediocriter assa fuerit, humorem qui ab ea deorsum destillauerit digito excipito, experieque an salsus sit, quod si non, adhuc iterum.

R iij

DE VICTV FEBRICIT.

sal inſpergito, ut tandem ſuccus mediocriter ſaluſ red-
datur. Tandiu ad ignem perdicem eſſe ſinito quouſque
humor exiccetur, poſtea ab igne amoueto, perdicemque
in parua fruſta ſecato, & in linteum demittito, duo-
buſque in contrarium retorquentibus pro uiribus to-
tus eius ſuccus extrahatur. Quem ægrotanti miniſtra-
to. Multum quidem nutrit, ſpiritus ſubſtantiam auget,
uentriculū roborat, & peſtilenti infectioni ualde obſi-
ſtit. Idem è capo, aut pulla gallinacea ſi illorum non de-
tur copia efficere poſſis, & alijs montanis paſſeribus.
Neque aliquis admiretur, nos, & ouum, & ſuccos ex
carnibus ſaluſa ex conſulto efficere. Cum enim abiiciens
animo uoluat, peſtilentem febrem naturales priuatim
actiones corrumpere, nempe cordis, iocineris, & uentri-
culi (ut ex uomitu fluxu uentris, urinis rubeis cõturba-
tis, & ex inordinato pulſu, oſtenditur) peſtilentemque
infectionem citius ijs partibus quæ humidiora ſunt com-
municari (humiditas enim peſtilentis contagij fomen-
tum eſt) haud quaquam præter rationem eſſe ea, quæ
diximus exiſtimabit. Quinimmo ab ipſa rerum natura
in id ducimur. Eas ſi quidem corporis partes, quæ pe-
ſtilenti contagio affectæ ſunt, ſcimus præter naturam
humectas eſſe, actioneſque earum ob id reſolui. Qua-
re uel cibaria ipſa natura ſicca eſſe oportet, aut ſi talia
propter duram coctionem non conueniant, ſaltem cibus
ea quæ exiccare ualeant ſunt miſcenda. Sal autem, ut
diximus omnium eſt efficaciffimum aduerſus omnem
corruptelam, maximeque humano generi familiare.
Quare ſaluſa omnia huic feбри conuenire rationalis me-

thodus docet. Neque ob id quod sitim generant reiij-
cienda sunt, quin immo hoc nomine amplectenda. Nam
saluberrimum est in hac febre sitire, duplici ratione, &
signi, & causæ. Indicat enim actionem sensoriæ facul-
tatis oris uentriculi incolumen esse. Sitiens præterea
frigida delectatur. Potum autem aquæ frigida ijs sa-
lubrem esse communis medicorum schola fatetur. Sed
non deerunt qui salsa ijs damnent, tanquā febri, et eius
causæ incommoda. Nam salsa febri non sunt contra-
ria. Potius enim frigida, & humida. Nam omnem fe-
brem calidam, & siccam esse intemperiem, medici asse-
runt. Putridus præterea humor non salsis, sed ijs, quæ
per aluum, aut urinam, aut sudores educere possunt ex-
tra corpus pellitur. Sed si quis accuratius cuiusque hu-
moralis febris remedia consideret, inueniet, medicum
utraque artis medicæ parte uti, tum ea quæ curat, tum
ea quæ præcauet. Frigidam offerens medicus, febrem
præsentem curat. Exhibens pharmacum, futuram præ-
cauet. Vomitus, sudores, urinas euocans, humorem
putridum febrem efficientem extra corpus pellit. Poros
autem corporis aperiens, aut abundantiam euacuatio-
ne minuens, perspirationes liberas efficit. Exindeque
præcauet ne ulterius putredinalis affectio grassetur, et
sanos corruptela ne afficiat humores. Hoc autem est
causam corruptionis tollere. Hocq; est ultimum quod
rationali deuenimus methodo. Idque primum quod
opere exequimur. Nempe cum aliquis intra corpus pu-
tridus humor sit, febrem efficiens, ut qui sani sunt ne
eius contagio afficiantur humores in primis curare. Si

R iij

DE VICTV FEBRICIT.

igitur in omni humoralī febre id agere tenemur, multo
 p. oſectō cauſatius impeſtilenti, quæ efficaciffima ui qui
 bus obuiat afficit, id in primis nos agere iuſtum eſt. Qua
 re non ſolum ijs, quæ perſpirationes liberās efficiūt, nec
 potionibus, & medicamētis quæ intro aſſumūtur (quid
 alias in alijs febribus ob imbecillē putridi humoris
 uim feciſſe ſat eſt) ſed, & cibus id tentandum efficere,
 ut pro uirili corruptioni exitialiter graſſanti obſtemus.
 At ſalſa, ut diximus primum habent locū, ut experien-
 tia, & ratio oſtendunt. Melius ſi quidē res ſaliſ quam
 acetōſis ſeruantur. Efficacius ſale quam aceto. Neque
 ideo quod febrilem calorem acuunt, ab eorum uſu ceſ-
 ſandum eſt. Nam prudentis eſt inter damna minus eli-
 gere. Inſuper præceptum eſt nobis à Gal. in de compli-
 catis affectibus ad id quod uicem cauſæ habet, aut ma-
 gis urget, præcipuam indicationem habendā eſſe. Quæ
 propter utraq: ratione peſtilenti contagio prius obſta-
 re debemus. Tanquam ei quod magis urget, & febris
 futuræ uicem habeat cauſæ. Medici præterea cibos exic-
 cantes miniſtrare iubent. Vt acetum, & multa, quæ po-
 teſtate aſtringunt. Vt ſuccus granatorum, arantij, ace-
 toſæ herbæ, et ſimilia, quæ omnia humoris corrupti ex-
 cretioni obſtant. Corruptionem graſſantem, magis
 quam febrē, & eius cauſam reſpicientes. Ad hæc in pe-
 ſtilenti febre diligente proſpiciendum eſt uentriculo,
 ut id quod aſſumit æger retinere poſſit, alioquin neque
 uirtuti opitulari, neq: morbo occurrere poſſimus. Qua
 re eo me hæc adduxit ratio, ut mihi perſuaſū ſit, ſalitoſ
 piſces ijs fore ex uſu. Si ſint ex ijs qui facile coquantur

Hos si quidem uentriculum ualde exiccare, roborare, appetentiam excitare. sitim immoderatam inducere, subuersum uentriculum, et nauseantem componere certum est, cum hac scriptis mandarem, mihi relatum est, chirurgum senem in Anglia solitum esse piscibus salitis quos herinches angli uocant, pestilentia laborantes feliciter nutrire. Quorum si copia non detur eorum loco ex paruorum piscium genere utitor, quod sal & fumum melius recipiat. Cæterum oportebit ab usu salitorum piscium ægotantem admonere, ut à potu hora una abstineat. Postmodum frigidam quantum haustu bibere possit dato. Vsus huiusmodi piscium aduersus humiditatem tenuem corruptam in uentriculo efficacissimus est. Quantum autem huiusmodi saliti pisces uentriculum robovent, & nauseantem reprimant, & appetentiam excitent, odor eorum declarat, quo nō parū uentriculi appetentia elicitur. Qui ergo ijs assentit rationibus, eis utatur assis infusis in aceto, aut in succo acetosæ herbæ. Carnibus autem sale conditis quibus borealior Hispaniæ pars utitur, ob id quia duræ sunt coctionis uti consilium non est. Earum tamen succo cum decenter assæ sunt uti melius erit. Spiritus abunde carniū succus generat, & uentriculum roborat. Proinde id summo opere cauendum est, ne eundem cibum toties offeramus, ut eum fastidiat æger. Quare oportet medicum diuersa cibaria mente concipere, ut eorum singulis utatur cum opportunum fuerit. Dulcia omnia, & unctiosa & quæ calida sunt, & humida diligenter cauenda sunt. Lentes cum multo aceto, & sale croco,

& petroselino coctæ, ut supra diximus cōueniunt. Grā nata acida cum uoluerit laboranti dato. Soleas conditas salsamento salubriter ijs ministrato. Quas ita parabis. Lauato & sale eas conspergito, & oleo coquito, postmodum eas refrigerari finito, eas tandem in acetum acerrimum infundito. Et frusta mali citrei, & limonum, & folia lauri projcito, quantum earum copia poposcerit. Iis ad diem tertium utere. Carnes ad hunc modum quæ sub renibus sunt uitula sale conspergito, & in acetum acre cum origano, & mali citrei, aut limonum segmentis, & alijs infundito. Ad diem quintum percoctarum ad ignem succis utere, ut supra dictum est. Quod si ager carnes huiusmodi edere appetierit parum dato, & cultello minutatim incidito. Simili modo perdices, phasianos, & montanos, passerēs condire possis.

C A P. XX.

E S T quidem unus è nostris qui cum de cibis, & potibus ageret, qui præseruant ab epidimia dixit. Non auscultetur opinio illorum, qui dicunt allium ualere quia falsa est, quia generat, inquit fumositatem, & super calfaciendo adiuuat ebullitionem, & sanguinē adiurit, ex quo adusto generantur apostemata mortifera. Sed non ab re fuerit, an allia in pestilentia conueniant gratia præseruationis inuestigare. Et postmodum an in cibis miscenda sunt gratia curationis. Primum illud quærendum an præseruandus ijs assuetus sit bona ualitudine, quod si sic haud dubio dimittenda non sunt. Nā imprudentis fuerit hominis consuetudinem in pestilen-

tiali constitutione demittere. Nam eius demissionem efficacissimam morborum causam esse à peritissimis medicis ostensum est. Aegrotandi autem occasionem dare in pestilentiali constitutione stultissimum est. Quod si ex ijs fuerit, qui allijs aliquoties utatur, et quandoque non (ut sæpe accidit) neq; capitis gravitatem, nec præter solitum se calidiorem ab eorū usu sentiat, huic profecto ad præseruationem pestilentis contagij allia ministranda fore prout eis alias usus est censeo, præsertim si hyems sit. Hoc ut ostendamus experientiam aliorum in medium adducere non ab re erit. Messeres æstate feruēte incalescente sole post meridiem allia cum panē uorant, ut minus ab æstu offendantur, et in sudores eorum minus soluantur corpora. Nam allij ui continentis æstui fortius obsistunt, quàm ij qui eis usi, non fuerint. Adde quod ab externo frigore idem corpora tuetur, & ei minus obnoxia ea reddit. Hos effectus allium sola, ut agat qualitate fieri non potest. Nam in symbolizantibus facilius est transitus. Necesse est ergo hoc in esse allio ob id, quia calidum roborat naturale. Quo fit ut corpori ualidius dominetur. Ita ut ab externa causa quæcunque sit difficilius uincatur. Fieri quidem nequit, ut exterior occasio in corpus humanum suam imprimat actionem, calido naturali ualido existente. Quod cum ita sit, quis negabit pro pestiferi contagij, aut cuius uis impressionis præseruatione, ea fore omni diligentia quærenda auxilia, quæ natium calidum roborare queant. Cunque hoc insit allijs, recte ministrari ijs, qui citra læsionē eis uescuntur quilibet sanæ mē-

il

4. de ra
tioe ui
ctus.

tis concedet. Iis autem qui alijs usi non sunt, pestilenti cōstitutione incipere eis assuescere, an rectum sit, apud me decretum non est. Nā calidis tēperaturis, & ijs qui gracili sunt habitu, prater ea pueris, & imbecilibus, in summa ijs quorum facile digeruntur corpora, crediderim alijs in pestilenti cōstitutione primo uti incommo- dum fore. Qui autem crasso sunt habitu, aut frigido temperamento, & difficulter in halitus soluantur, præsertim si hyems sit, eos arbitror ex usu alliorum uotum consecuturos. Iis adde allium à crapula, & ebrietate optime præseruare, ut ab Hipp. & Gal. scriptum est. Quantum autem crapula, & ebrietas corpora ad quālibet impressionem externā suscipiendā disponant, declarāt male habitudines quæ ijs exinde nascūtur. Qui ergo inordinato utuntur uictu in pestilenti commoran- tes aëre, illis allium uorare sanum esse censeo. Quod si ijs addas illud Dioscoridis dicentis, magnæ & allio utili- tates contra aquarū mutationes, non solum uia præser- uationis sed gratia curationis concedenda esse allia re- cte colliges. Huic fortasse assenties opinioni, in mentē si reuocet, hāc febrem adeo perniciosam esse, ut nostro- rum medicorum quidam dixerit, remedia in hac febre cum temeritate esse sumenda, alijsq; curationem Deo cōmittat. Cunque medicamentis utentes medici omnia & si temerarie tentare non uereantur, cur nobis idem non licebit, qui cibis tentamus. Minoriq; damno huma- ni corporis si aliter eueniat, rem tractamus. Quod si eo tentemus quod longa experientia scimus naturale roborare calidum, appetētiam uentriculi excitare, co-

etiones, et reliquas naturales actiones acnere, cibumq;
 corrumpi non sinere, quæ omnia in allio scimus esse, ho-
 rumq; omnium contrarium corpora pati à pestilenti fe-
 bre, non ne ob iam dicta allium cum cibus ei qui pestilen-
 ti febre laborat citra temeritatem miscere nos iudica-
 bis. Quod si allium uentriculum exiccare ut de eo scri-
 psit Dioscorides consideres, in pestilentiali uero febre
 humiditatem prauā esse in uētriculo à qua omnes eius
 actiones corrumpuntur, præsertim qua cibus coquitur,
 et ea qua retinetur, has omnes utilitates ob id nihil fa-
 ciendas esse rectum esse existimabis? quod allium plus
 iusto calfacit. Ego sanè ob id ab alliorum usu non desi-
 sterem, sciens minus mali pati laborantes à caliditatis
 quàm à pestilentis putredinis additione. Si enim contra
 aquarum mutationes magnæ sunt allio utilitates ob id
 quod naturale calidū roborat, hac ipsa de causa, & con-
 tra mutationes aeris pestilentes ualere haud dubiū est.
 Naturale si quidem calidum cum potēs est, humido na-
 turali ualidius dominatur, extranearumq; causarum
 impressioni fortius obsistit. Caliditas etiam allij in ter-
 restri parte non est, ut caliditas rei amaræ, sed in parte
 aquosa quæ statim in halitus soluitur, ab internis ad
 partes externas statim migrans. Quod in pestilenti fe-
 bre non parū conducit, ut alias demonstrabimus. Neq;
 te dictū Hipp. turbet, alliū flatū parere, caliditatemq;
 in thorace, & capitis grauitatem, & cibi fastidium fa-
 cere. Nam contraria efficere, asserit Gal. ipsa experien-
 tia edoctus. Quinimmo ait capitis soluere grauitatem
 si post inuacuationem detur. Omnibus igitur pestilen-

In 4. de
 ratione
 uictus.

DE VICTV FEBRICIT.

ti febre laborantibus alij uirtutem in cibus niscendam
ut saluberrimum consulo. Vt exiccatione sua, natura-
leq; calidum roborando, corruptioni exitialiter gras-
santi obstet. Et ut uidelicet quod corruptū est, aut per
uias urinæ, aut suo uiolento motu ad circumferentiales
partes detrudat. Et non minus symptomatū uentriculi
gratia, nempe uomitus, & ciborum abominationis. Cæ-
terum scire oportet, omnibus nec similiter, nec quanti-
tatem eandem fore exhibendam. Sed cuilibet pro con-
suetudine, & uehementia febrilis caloris, pro ætate, tē-
peratura, & anni tempore. Sed ut ijs morem geramus,
qui cum de aliqua re plura cōmoda, & magni momenti
audierint, ob aliquam & si læuissimam qualitatem cō-
trariam, eam tanquā infestā damnant, non consideran-
tes difficile esse aliquid inuenire quod citra læsionē ma-
gnifice prosit, ut Gal. prudenter scripsit in libris de me-
thodo medendi, libet igitur ea quibus alij caliditas re-
frangitur referre. Quam ob rē illos ob id bona esse mē-
te hortamur. Alij caliditas coctione plurimum euane-
scit, ut scripsit arabum præcipuus medicorū Auicenna.
Quare qui allio integro uti uult, citra aliam præpara-
tionem simul cum cibus coquat. Quod si frangere quis
uelit, in acetum, aut in succū acetosæ die una infusum
sinat, postmodum utatur. Nec silentio prætereundum
est, commodum quod ab allio ij qui pestilenti febre deti-
nentur habent. Formidinem pellere de eo proditū est,
præcipue in decoctione oliuarum & nucis, ut tradidit
dictus uir, qua ut ait utuntur christiani. Pro comperto
est eos qui pestilenti febre detinentur, ab horrida con-

cuti formidine quæ omnium maxime animi motuum spiritus absorbit. Quod inhibere modo quo possit curabit prius medicus. Iudico igitur allium in omnibus edulijs, quæ pestilenti febre laborantibus offeruntur commode misceri. Opinorq; non solum fore innoxium, sed ex eo quàm plurima sequi cōmoda. Ad natiui caloris robur, & grassantis pestilentis contagij inhibitionem, & ad corrupti humoris ex omni parte cutem uersus expulsionem. Vnus è nostris medicus sal commendat, dummodo tantum non sit, ut sitim inferat. sed paucis agendum est cum nostro medico. Si sitim inducere noxium est, similiter ea censenda sunt noxia, quæ hanc nata sunt efficere. At talia sunt omnia, quæ corpus exiccant. Cibos igitur qualitate exiccantes damnabit. Quapropter humidos laudabit. Quos & ratio, & experientia in pestilenti febre noxios esse monstrant. Cum igitur periti medici cibos exiccantes laudarunt, necesse est ut quod ex ijs necessario sequitur non damnent. Quinimo si rem exactius tractemus inueniemus, ea fore exhibenda, quæ uentriculum exiccare, & sitim inducere ualeant. Exiccatio enim quæ effatu digna est, & sensu percipitur, sitim infert. Quæ citra hanc sit, parui aut nullius momenti est, utpote ob imbecillitatem sensum immutare non ualens. Humectum autem, & nimis laxum uentriculum prout in hac febre est, non utcunque exiccare oportet, neque paulatim id agere tentandum. Nam ægritudo maxime exitialis (ut hæc est) præsentaneum exigit remedium. Exiccandi igitur eorum uentriculi adeo sunt, ut exiccatio sitim ualeat in-

22. Con-
tinētis.

ducere. Per hoc enim humiditates quibus pestilens contagium primo cōcipitur, & alijs communicatur exiccabuntur. Humectus præterea præter modum uentriculus, & relaxatione laborans, & ob id cibum cito euomens, tali exiccatione curabitur. Meliusq; retinebit ea quæ ingeruntur ex cibis & potibus. quod non parui momenti est in huius febris curatione. Cuius gratia salitos pisces supra concessimus, ut qui maxime ad uomitum ualent. Vt scripsit Rasis in hæc uerba. Pisces inquit saliti calidi sunt & sicci, incidunt phlegma, & cōferunt uomitui eo quod emittunt phlegma uiscosum de Stomacho. Et quanto uetustiores tanto magis calidiores & sicciores. Sed laudabiles ij sunt qui condiuntur cum aceto hæc ille. Aetio præterea facultatis, quæ potum appetit salitorum piscium siccitate acuitur. Vnde fit, ut frigidam appetant, bibant & retineant, quæ non parum ijs prodest. Sunt præterea huiusmodi exiccantia, ut signum appetentis facultatis quæ in uentriculo est, nempe superstes sit an mortua. Si enim adhibitis ijs quæ exiccant, & sitim ualent inducere, laborantes nō sitiant, signum est appetentem uentriculi facultatem mortuam esse. Quod in pestilenti febre non raro contingit. Vanum ergo est sitim uereri in hac febre, ob id quod alijs in febribus ægrotantibus sitire noceat. Neque ideo quod contra sitim multa tradiderunt medici remedia ut Hipp. in libris de ratione uictus in morbis acutis, in pestilenti febre ea prohibenda esse, quæ sitim inducunt opinandū est. Sed neq; obscurū erat ex præceptis medicorum intelligere, alia fore incuratione pestilentis

Stilentis febris methodum obseruandam, ac longe diuersam ab ea quā alijs in febribus tradiderunt. Quod ex cibis exiccātibus, et ex ijs quæ astringūt, & ex crasso uictu, & ex eo quod in hac febre, ut comedant, & bibant ægris persuademus. Quæ omnia alijs in febribus diligenter prohibemus. Sal igitur tantum edulijis miscendum est, quantū sano homini sitim inducere ualeat. Vnde celsō sitim excitandam esse in hac febre recte uisum est. Sunt qui uinum prohibeant, alij qui suadeant, albumque consulant, sic temperantes. Vini pars una, aquæ partes quinque. Qui exhibendum putant, dicunt familiare humanæ naturæ uinū esse, imbecillitatibusque subuenire, spiritus materiam abunde ministrans. Quapropter in pestilenti febre ubi magna fit spiritum exolutio ministrandum fore. Et quia calorem, & commotionem timent ob id multa aqua diluunt. Ego uero potum quem solummodo morbus ipse indicat, referā. Quē enim ægrotantis uires, & consuetudo indicent, abunde in superioribus sub uniuersali sermone tradidimus. Hic solum potū curantē indicatione solūmodo ab ipso morbo sumpta apponemus, ut in singulis febrium speciebus fecimus. Cæterum quicumque potum nosse cupiat qui Socrati quauis febre laboranti conueniat, percepta uirium dispositione, & uiri consuetudine, habito simul potu quem in singulis febribus apposuius, ad tabellas quas suprascripsimus recurrat. Ab eis iuxta ea quæ ibi tradidimus documēta facile conuenientem potū quauis eliciat. Quapropter non est quod hic de potu differamus qui pestilenti febre imbecillitatis uirium aut con

S

suetudinis ratione conueniat. Curantem potum diximus eum qui morbo, aut eius causæ contrarius sit. Proinde cum in ijs, quæ supra diximus ostensum sit, curantem potum eum esse qui morbo, aut eius causæ contrarius sit, pestilentemq; febrem immoderate calidum, & humidū corpus humanū reddere, et singulas eius particulas potum frigidum, & siccum conuenire huic febrisumpta solummodo indicatione ab ipso morbo haud dubium est. Non immerito igitur nonnulli aquam cum aceto in potum pestilente febre laborantibus concesserunt. Ego succum mali granati acidi defæcatum, potū huic febre conuenientem esse arbitror. Cui si aquam plātaginis, aut acetosæ miscere uelis nihil nocueris. Modus sit, ut aquæ partem unam, succi duabus misceas. Quod si succi mali granati non detur copia, sic agito. Capillorum ueneris, aut politrici man. duos, berberorum tres, coquito in decē libris aquæ ad tertias agrotanti propinato. Cæterum scire oportet in pestilenti febre laborantium uirtutes semper urgere, tum ob incessantes uomitus, tū maxime ob ingentē spiritus exolutionem. Hanc medicorum nonnulli respicientes uinum ministrandum suadent. Vt celsus qui uinum calidum meracius dare iubet. Qui uero ad morbum magis mentem dirigunt, uinum recte prohibent, aquamq; mixtā cum aceto ministrant. Cæterum cum urgentis uirtutis aut consuetudinis ratione, uinum ministrare oporteat, cum succo mali granati, aut aqua berberorum misceamus. Aut cū aqua plantaginis, aut acetosæ si illorū non detur copia. Modum iuxta rationem indicantium ex

tabellis inuenies. Cæterum quia in pestilenti febre acci-
dit laborantibus nauseantem, ut plurimum habere uen-
triculum, ita ut statim quæ deuorant, aut bibant uomi-
tu eiijant, incassum nostræ forent de cibo, & potu lu-
cubrationes, nisi ea addiderimus, quæ extra posita ad
retentionē ciborum, & potuū iuuent. Hæc autem sunt
frigida astringentia, quæ non solum ad id, uerum ad in-
fectionem pestilentem à uentriculo repellendam non
parum proderunt. Succi cimarum tenerimarum uitis,
aut uinæ acerbæ, partes tres, succi semper uinæ maioris
partes duas, aceti decoctionis absinthij, & mentæ par-
tem unam, & semis, cinamomi parum, misceto. Apponi-
to multoties spongiam dictis succis frigidis madentem
uentriculo, ante cibum.

Panem assum uino odifero madentem modico cinamo-
mi super asperso, uentriculo apponito. Linteum mul-
tipliciter plicatum succo uinæ acerbæ madentem desu-
per imponito. Præterea aceti acerrimi partes tres, olei
rosarum ex eo leo immaturo partes duas, succi citoniorū
partem unam, misceto tandiu donec crassescat, & per-
mixtum sit, utere ut supra, efficacissimū est. Vsum cā-
phoræ in ijs epithematibus, quæ uentriculo apponuntur
non laudo. Ea si quidem, quæ præter modum refrige-
rant citra astrictionem, principi parti apponenda non
esse, rationalis docet methodus. Sed de his alibi. Aceti
acris untiam unam, pulueris reubarbari tosti drachmā
unam, misceto, & ita esse finito per diem, & noctē. Post
modum utere cum aqua rosarum, ut supra. Nec præ-
termittendū est eisdem epithematibus multoties uten-

DE VICTV FEBRICIT.

dum non esse. Cunque nouum epithema apponere uolueris, exiccare uentriculum lintheo oportet ut uestigium præteriti non sit medicaminis.

C A P. XXI.

In 4. de
ratione
uictus.

FEBRIS colliquantis uictum infrigidantem, & modico astringentem, et crassiores quàm pro morbi ratione esse oportet. Id sicut, & reliqua ab Hip. discimus qui cum de febrium curatione ageret cum aluo liquida absumente, & contabefaciente corpus, ijs sorbitiones frigidiores, & crassiores exhibendas docuit. Potusque uinosiores, & astringentiores delirio non obstante pro pinare iubet. Vnde colligimus, eum esse in colliquante febre uictum exhibendum, qui corporis dissolutioni ualeat subuenire, & si in morbum, aut eius symptomata addere uideatur. In tertio cum de mulsa agat nocumentis, signa liquefacientium febrium in hunc modum scribit. Biliosa quoque alui deijcit magis interdum quidem, bona sed interdum quam decet redundantiore, spumantioraq; quod biliosis magis, & his quibus tumefacta sunt uiscera contingit. Magis præterea, quæ dilutior est sputum educit, magisque pulmonem lenit. Meracior uero spumosa excrementa atque plusquam conuenit ualde biliosa calidioraque quam dilutior agit magis. Deiectiones autem huiusmodi habent quidem, et alias, quæ graues sunt, offensas, neq; enim hypochondriorum extinguunt ardorem sed excitant, inquietationemq; & membrorum iactationem faciunt, intestinaq; & sedem exulcerant. Qui ergo in morbis huiusmodi relictis sorbitionibus malsa potius alterius uice, utetur, is

si multa fœliciter consequutus fuerit, nonne, & multa ei succedunt præter animi sententiam. Quibus in uerbis Hip. duplici nomine taxauit antiquos medicos, tum quia sorbitiones liquefacientibus in febribus demittebant, tum quia alterius potionis uice, mulsa utebantur. Quod autem alias in huiusmodi acutis febribus exceptis liquefacientibus sola mulsa ad iudicationem usque ægrotantes alat, Gal. docet in hæc uerba. Significauit, et nunc manifestissime ad morbi usque iudicationem, sola uti mulsa consulens; nēpe in solis, qui colliquefaciūt, morbis, uel in quibus hominum uirtus ad morbi usque iudicationem sufficere non possit, ad ptisanæ cremorem perueniemus. In alijs uero sola mulsa est commodius. Quod autē fluxus uentris syncere biliosus spumofusq; liquifacientem febrem indicet, asserit Gal. in expositione illius, quæ dilutior est sputū educit magis cū inquit. Hipp. igitur non immemor cum uel ex mulsa epota uel absque ipsa qui spumosa simul, & syncere biliosa deiecerit, febrem sciueris esse quæ liquefaciat, & ad tabē perducatur, &c. Quare hos tali cibo nutries. Sumpta in presenti à sola corporis dissolutione indicatione. Viētum uero iuxta febris acumen conuenientē, ex ijs quæ in superioribus diximus colliges. Quæ dissolutioni corporis obstant triplicia sunt, nempe quæ corpus, & quæ humorem respiciunt, & quæ utrunque. Ad primum modum spectant ea quæ multum prestant corpori nutrimentum, & facilis coctionis sunt. Quæcunque potestate infrigidāt, ad secundū. Infrigidantia uero cibaria quæcunq; astrictoria participāt ui ad tertium opti

DE VICTV FEBRICIT.

mus igitur in colliquantibus febribus cibus fuerit, qui corpus nutriat infrigidet, & modice astringat. Capum igitur iuuenem crassum ita coquito. Hordei excorticati man. tres, uuae acerbæ, portulacæ, plantaginis, uiridis coriandri, singulorum unum, bulliant simul, deinde collato ius, cuius accipe partes tres, succi granatorum acidorum partem unam, sorbitionem cum pane crassam conficito. Panis infusus in succum granati acidi conuenit.

Ptisanam hordei non collatam parato in hunc modum. Duos pullos crassos coquito cum tribus hordei excorticati pugillis, portulacæ uno, modicum antequam ab igne amoueas, immittito granorum mali granati acidi pugillum unum, finito ut coquatur tandiu quod rumpatur hordeum, & tenerrimum fiat, extrahito deinde hordeum, & adiecto pauco zucaro administretur ijs. quorū uirtutes ob imbecillitatē laborāt. Cōuenientissimus cibus fuerit ijs qui colliquantibus febribus laborant. Infrigidat, roborat, & facillimæ coctionis est, Aqua frigida cōmodissimus ijs potus, & remedium est, utrumque respiciens, & corpus, & humorem. Ad quā exhibendam exiguæ coctionis signum spectandum esse nos docet Gal. quarto de ratione uictus, & in libris de Methodo. Mel ijs aduersissimum esse ab eodem didicimus. Sciendum præterea rectam uictus administrationem, & frigida potum, præcipuum esse ad liquefacientes febres remedium, parumque auxilij præstare medicamenta. Quare diligenter obseruandum est, ut boni sint nutrimenti, et facillimæ coctionis cibaria, quæ

In fine
ro. de
metho.

ijs offeremus. Quibus cum admiscere ea quæ refrigerare, & parū astringere ualeant utile erit. Optimusq; omnium quem sciam his cibus est, ptisana hordei, eo quo diximus modo parata. In ea si quidem omnia quæ necessaria sunt, insunt. Boni nutrimenti est, facilis coctionis, infrigidat, parumque astringit. Quæ enim insigniter astrictoria ui polleunt, ex eo incommoda sunt, quod causam morbificam intra corpus detinent, cum ad omnem euacuationem uias obstruant.

CAP. XXII.

MORBILLVS, & uariola differunt, morbil-
lus in cute est instar morsus pulicum, à sanguine nimis bilioso ortum habens. Variola cutē magis in tumorem attollit, diuersique coloris est. Albæ uisuntur, ut plurimum, quandoque citrinæ, raro nigræ plumbeæ. Morbilli consimiliter non unum seruant colorem. Proinde uariolæ à sanguine nimis aquoso fiunt. Inter morbillos, & uariolas in eo conuenit, quod utraque pustula ab ebullitione sanguinis fit, natura prauum ab eo quod purum est separante, & ad cutē detrudente. Quapropter à tali expulsiōe naturam, crasso cibo, aut multo, aut duræ coctionis, tunc temporis distrahendā non esse recte quis colliget. Vt uero opus melius compleat, & ab internis ad cutem uersus cōmodius noxios humores depellat, et ne in aliqua interiorum partium humor detineatur, cibum parum infrigidantē leuiter astringentē his ministrare oportet. Qui enim huiusmodi est, particulas roborat, ut ualidus à se quod contristat depellant. Vim præterea repellendi calidū humorem habet.

S iij

DE VICTV FEBRICIT.

Qua propter ius Hispanarum lentium cum acetosa herba uiridi coriandro, oleo, aceto, & sale, & modico croci ijs conuenit.

Cucurbita etiam cocta cum portulaca, acresta, oleo, aceto, & sale,

Ptisana prout parauimus supra in colliquantibus febribus commodissima his sorbitio est. Fugienda omnia ea sunt quæ, aut sanguinis copiã augeant, aut in eius ebullitionem addant. Quare inter initia dummodo uires constent, gallinaceorũ iura uitanda sunt, & omnia dulcia, & unctiosa. Facta euacuatione totius nisi copiose erumpant, bonum erit in cibis minuere ea quæ astringunt, & eorũ quæ aperire ualeant, aliquid imponere, ut folia api, aut petroselini. At cum eruptio subsidere iam incipit, bonum est in cibis ea quæ uentrem leniunt miscere. Vt prunas, uiolas, borraginem, & similia. Prunis autẽ, quæ astringente participant facultate, cuiusmodi Gallica sunt, & Hispana, per omne tẽpus uti licet decoctis cum politrigo plantagine, aut portulaca. Potus autem ijs, qui patiuntur morbillos, aut uariolas, sit aqua hordei cum politrigo, & malo granato cocta. Sunt qui lactucas decocta in aceto, medullam citruli, & anguriæ ijs qui uariolas, aut morbillos patiuntur exhibeant. Sunt, & qui aquam anguriæ in potum ministrent. Sed quantum sentio, huiusmodi cibaria his damno potius quàm iuuamento sunt. Quandoquidem expulsionem naturæ obstant, & eruptionem pustularum retardant sua uehementi frigiditate. Nam huiusmodi ab intro ad cutem expulsionem à natura fiunt, ma-

teria ob ebullitionem eo inclinata, utpote iam in uaporem transeunte ob substantiæ eius tenuitatem. Quapropter sicut ijs quæ calida, & fumosa sunt augenda ebullitio non est, sic nec ijs quæ ualde refrigerant extinguenda. Solum igitur ea ministranda sunt, quæ modicum refrigerent, & astringant. Ut per hæc roboratis siue in se collectis particulis melius fiat. ab intro ad extra expulsio. Quapropter ficuum aridarum exhibitionem in ijs qui morbillis, aut uariolis laborant, ut pluribus nostrorum medicorum uisum est, ob id quod malas materias extra pellunt, non probo. Nam ob id ipsum quod caricas commendant, ego damnam. Aiunt earum usu materias ab intro ad extra pelli. Cuius argumentum esse scabiæ ex earum immodico usu euenientem aiunt. Sed profecto ut opinor ipsa decipiuntur experientia. Non. n. id agunt caricæ quia malos humores ab intro ad extra pellunt, aut quia sanguinem mundificant ut opinantur, sed quia eum nimis calfacientes, ebullitionis modum ei præstāt. Vnde accidit, ut id quod in fumum, aut fuliginem ob calfactum sanguinem uersum est ad cutem à natura detrudatur. Quare non immerito uulgus fert, caricas scabiæ, & pruritus peculiariter inducere. Quapropter eas pueris, & iuuenibus prohibent. Quod autem nimis calfaciant, docet Dioscorides qui eas sitim inducere asseruit. Rasis etiam tertio Almanforis ex multo earum usu fieri pruritus, & pediculos affirmavit. Nec id alicui admirationi sit. Nam in ipsis est occultum lacticinium, ut recte sensit Auicenna. Haliabas etiam 5. theoricæ, cap. 19. eas in colericos mutari humoris scripsit. At si in

18. 3. tra
stat. 2.
cap. 12.

DE VICTV FEBRICIT.

uentriculo humores superflui fuerint, inquit ille dura fit ad digerendum carica, & ad corruptionem mutatur. Et inflationem uentositatemq; generat, & pessimum sanguinem. Auicenna similiter idem asseruit in hæc uerba. Et sicca quidem inquit in suis operationibus laudabilis est, uerum tamen sanguis generatus ex ea non est bonus. Verum id est, aridas ficus nimis abstergere, aperire & incidere. Quapropter commendantur à Gal. secundo alimentorum cap. VII. præcipue cum nucibus & amigdalibus. Vt cunque res habeat caricas ob earum superfluam calfactionem uitandas esse in morbillis in caloris febrilis præsentia opinamur. Senibus tamen frigidis natura, ubi eruptio nimis diminuta est, utiles sunt & secure concedi possunt, præsertim in remissione caloris febrilis. Sua enim arida ficus apertione, subtiliatione, calfactione, humores adeo attenuat ut ad cutem facile ferantur. Vnde uariolas tunc temporis absq; læsione euocare solet. Quod Petrus Apennensis uir disertissimus asseruit, de morbillorum & uariolarum curatione agens.

C A P. XXIII.

ET ut speculationi huic nihil desit, non ab re fuerit de eo uictu differere quo uulgus utitur in uariolis, & morbillis, nempe salitis piscibus. Siue enim ab ipsa experientia percepto commodo, siue ratione id ostendente, apud Lusitanam plebem salitorum piscium usus longæuus obtinuit, ut parua aut nulla medicis fides adhibeatur contrarium suadentibus. Aliud tamen unus è nostris medicus natione Italus sentit, piscium salitorum

usum in morbillis, & uariolis reprobans. Nam ut ille ait apud non nullos è plebe Itala aut scholares opinionem esse, in uariolis recte ministrari. Verum si ab Aristotele recte dictum est, non uanam esse omnino famam quam uulgus ferat, non uanum utique erit inquirere an ratione aliqua qui salitis piscibus in uariolis utitur innitatur. Percipimus ex quottidiano usu salitos pisces pruritus inducere. Siue id salitorum piscium substantie concedas, siue caliditati & siccitati eorum, quibus ebullitionem sanguinis excitant. In omni autem ebullitione constat crassos humores in tennes solui, tennes in fumum digeri, fumos & fuligines ad cutem migrare. Huncq; esse modum quo generatim salita edulia pruritus ob qualitates inducant manifestas. Siue id eorundem substantie in uaporem digestæ, rapidæ ad cutem lationi ob salis incisiuam qualitatem, & acutam penetrationem tribuas. Quod non nulli caricis inesse firmiter credere. Siue utrunque simul in causa sit. Verum est salitorum piscium usu, ab internis corporis partibus ad externas nonnullorum excrementorum lationem fieri. Quod cum ita sit, dubium non est quin aliquando in ijs morbis salitis piscibus locus sit. Nempe ubi natura segniter opus expulsionis aggreditur. Id autem si præter naturæ imbecillitatem accadat, aut deferuescente ebullitione fiet, qua iuuatur natura, ut melius excrementa ad cutem detrudat, aut ob crassos, & lentos humores ad expulsionem talem ineptos, aut ob uiarum occlusionem. Quodcunque horum trium adsit, aut omnia, pisces salitos prodesse ratio demonstrat,

DE VICTV FEBRICIT.

& ob caliditatem, & siccitatem salitorum piscium, & non minime ob eorum incisionem, & acutam penetrationem. Cum ergo in frigido natura corpore non satis uariolæ erumpant ob aliquam trium dictarum occasionum, febrili calore non obstante, dandos esse pisces salitos cum plebe sentio. In succo tamen acetosæ per diem integram eos prius macerare oportet. Sitq; mediæ ætatis salitura, quāto enim antiquiores sunt, eo calidiores, & sicciores euadunt. Vt supra ostensum est. Ad hæc pisces saliti partes corporis ob salis compressionem in se inuicem collectas roborant. Quod siccis ficibus non inest, quinimmo contrarium. Id unum est ex ijs quæ cumulationem efficiunt expulsionem. Quod cibis inesse qui in uariolis ministratur, supra optauimus. Præterea si eueniat ut fit, pustulas intro erumpi, profecto nullo medicamine efficacius rumpes, saniem purgabis, exicca bis, putredinemq; inde emanantem nullo alio citius castigabis, ne ulteriorem concipiat corruptionem, sanas tandem particulas nullo alio quàm ex salitis piscibus cibo incolumius, ne emanantis corruptionis contagio afficiantur, seruabis. Nec ab re fuerit, ut cum intro erumpuntur, pro earum maturatione ficus aridas primo uorare, deinde piscibus uti. Meminisse tamen oportet in morbillis cauendum esse piscium salitorum usum. Et in ijs qui calidi, & sicci sunt natura. Vt igitur summatim dicam ubicunque eruptio incompleta est, si crassi & leni humores, aut uiarum obstructio in causa sint, febre non obstante, nec calido & sicco hominis temperamento, ficus aridas, & salitos pisces audacter ministrato.

Nec audienda est illorum sententia qui salitorum piscium usum ægris non conuenire scribunt. Nam absurdum est putare contraria salitorum piscium qualitate ægros affici non posse. Præterea tertio Almanforis scriptum est salitos pisces nullo modo fore ministrandos, nisi in die quo aliquis sibi medicari uoluerit, hoc est non cibi, sed medicinæ gratia cōmendandos esse salitos pisces. Quod Auicenna asseruit cum dixit, unum est quod ipsorum nutrimentum est malum, unde plus uia medicinæ sunt accipiendi quam uia cibi. E piscibus salitis laudauit Gal. sardam cum ait, in tertio de alimentorum. Pretiosissima est sardæ salitura.

CAP. XXIII.

HEMITRITEVS uerus, nempe quotidiana continua, & tertiana interpolata, mediæ rationis uictum exposcit. Hunc dico qui subtilior sit, quàm qui febribus interpolatis conuenit, crassior uero quàm continuis ab uno simplici humore. Cū singularū qualibet longior sit. Cunque naturæ duobus qualitate, & substantia contrarijs humoribus pugna sit, uiribus & tempore indiget, ut ambos uincat. Vtriusq; igitur causa, nēpe ut ad longum seruetur tempus, & ut uires contra utrunq; hostem habeat, ampliori opus habet alimonia. Cunque in superioribus in singulis febribus cibis ea miscuerimus, quæ peccantis humoris qualitates reprimāt, oportebit in hemitriteo, aut simul ea quæ cōtrariarum sint qualitatū, miscere, aut cibis uti temperatis. Ea quæ alterum illorum solum respiciunt administrare nō icet. Nam utriusque febris medicus sit sollicitus oportet.

tet. Cibus temperatum dico, qui à naturali calido solum patitur. Hunc hemitriteo laborantibus idoneum non esse ex eo intelliges, quod sanguinem qui ab eo in febribus generatur vitiose fore qualitatis necessum sit. Nam in tertiana febre ob bilis putrescentis calorem & acredinem, pars effectiua sanguinis extra naturalem temperiem est, nempe calidior & siccior. Quapropter cibus temperatus ob id quod à naturali calido solum patitur, nec particulæ intemperiem contrarijs qualitatibus ualet corrigere, eisdem afficietur. Quare sanguis qui ab eo generabitur calidior & siccior euadet, prouisceris intemperie. Qui statim paulo momento in bilem uertatur. Simile iudicium in febre, quæ à pituita corpus præter naturaliter humectum efficiente, ortum habet. Quapropter miscenda sunt in cibo, quæ contrariarum sint qualitatum, aut id accipiendum in quo utraque qualitas reperiatur, quod magis probo. Quod si præter hæc incisium id sit, ante alia eligendum. Simplicium medicamentorum unum est acetum, quod præfatis sit facultatibus insigne. Vtrique enim conuenit humori, partibus insuper tenuibus præditum est, quibus incidit. Quapropter si id cum eo quod abstergere ualet miscueris, habebis id quod quærimus. Moderate abstergentium zucarum unum est, quod febricitantibus plus conuenit. Quare mixtionem ex zucaro, & aceto quam syrupum acetosum medici nuncuparunt, hemitriteo maxime conuenientem esse putato. Quouteris in hunc modum.

Thymi, petroselini, hordei ab uno cortice exuti, singu-

lorum manip. unum, passularum enucleatarum unum, corticem unum raphani linguam uellicatis, salis parū, bulliant cum pulla crassa quantum satis, huius decocti accipito lib. unam, syrupi acetosi acris quantum tollerauerit ægrotantis palatus. Iterum bulliant quousq; misceantur, dato ut bibat cum oportuerit, ex reliquo fac sorbitionem. Hac utere ante accessionem uehementiorem, & in eius inclinatione, in die uero mitiori eisdem utitor, pullæq; extremitates ægrotanti ministrato. Siluestrem capū, qui escam pererrans quæritet, coquito cū hordeo, radicibus apij, aceto, & sale, fac ut supra. Succi uiolarum mediæ magnitudinis uncias tres, piperris nigri grosso modo contusi grana triginta, infundito in succum uiolarum, & ita esse finito quousque transeant dies tres, postmodum cum iure misceto, ita ut ad uncias decē iuris, unciam unam succi imponas. Et quia uiolarum succus omni tempore haberi non potest, succus simul cum pipere coaguletur, et ad formam trochiscorum reddatur, ut singuli drach. unam contineant. Mixtionem ex pipere & succo uiolarū magni esse iuamenti in hemitriteo in quo pituita, & bilis pares habēt uires compositio ostendit. In eo enim in quo alter humorum superat, nec uerus, nec certus hemitriteus dici potest. In quo uero bilis, & pituita pares sunt robore, quem uerum & certum uocamus hemitriteū, meminit Hipp. in libro de morbis uulgaribus, horrificam febrem hemitriteum uocans, quia multoties in accessione una febricitantes horrescant. Nam horror medius est, inter rigorem quem bilis, & frigus quod pituita inducit.

DE VICTV FEBRICIT.

Cunque alter humorum superat, ita rigoris uel frigoris plus sit horror particeps. Quod si humor qui præualet in hemitriteo pituita fuerit, hoc cibo utere. Pullam, aut capum cum hordeo, radicibus apij, & ciceribus, aceto & sale coquito, fac ut supra. Ptisanam cum radicibus apij coctam, pipere & oximelite optimam ijs esse sorbitionem iudicato.

Quod si bilis superior fuerit, ita ut horror plus ad rigorem accedat. Pullam aut capum cum hordeo hepatica thymo petroselino, & apij radicibus sale et aceto coquito. Aqua hordei cum radicibus apij cocta, conueniens potus est uerum patientibus hemitriteum. Iis uero in quibus pituita superior est, aqua decoctionis radicis apij & seminis fœniculi dulcis. Potus uero qui hemitriteo laborantibus ratione uirium, & consuetudinis competat, ex potus tabellis quærendus est. Iis uero qui hemitriteum pituitosum patiuntur, si temperamento sint frigidus, non ab re erit radiculam zinziberis in cibis, & potibus addere, ut simul integra bulliat. Est unus ex arabibus medicis, qui hemitriteum patientem alit in die accessionis cucurbitis, spinacijs, attriplicibus, & similibus. Sed errat quantum sentio duplici ratione. Altera ab ipsa natura corporis sumpta, altera ab ipso cibo. In hora in qua natura intenta separationi est, frigida exhibenda non sunt cibaria, ne separationi naturæ obstant, & ne expulsionem periodicam, quæ ab internis partibus ad exteriores fit, ad contrarium repellant porosque occludant. Quorum causa paroxismus longior efficiatur. Vt ijs, qui diligenter cibariorum

bariorum naturas quid singulis horis ualeant efficere
crutantur, manifestum est. Iis adde cibos qui ex herbis
oleribusue parantur corruptioni ob noxios esse, ex eo
quod aquosum generent sanguinem, qui promptissime
calorem extraneum concipiat. Prudentis consilij igitur
non est, huiusmodi cibos tunc ministrare, cum causa
corrumpens ualidior est. Non aliter quam si ignauum, &
imbecillum militem strenuæ inimicorū cohorti obijcias.
Sed de hoc abunde supra diximus, ubi ostendimus cibū
ex herbis, aut oleribus inutilem esse acute febricitan-
tibus. Eosque in ægrotantium damnum errare, qui
citra occasionem herbis in cibos frequenter utuntur.
Graviusque eos peccare, qui ante accessiones herbas,
aut olera ministrant, putantes se scopum attigisse. Qua
in re nostrorum medicorum plurimi quottidie labun-
tur. Quando autem herbis, & oleribus in cibo utemur
infra deo inspirante dicemus.

CAP. XXV.

FEBRIS in qua exteriora frigent, & calent in-
teriora, à bili putrescente ortum habet. in qua febrili
calore phlegmata crassa in exterioribus existentia dis-
soluente, accidit, partes externas infrigidari, æstuantibus
internis. Subtili ideo indigent uictu, quia febrilis
calor multoties in seipsum reduplicatur trāspiratione
prohibita. Quapropter periculo non uacat hæc febris,
sicut cum à reuocatione natiui calidi exteriora frigēt.
Cibus ijs conuenit refrigerans. Cui misceantur ea quæ
aperire, & ualenter incidere ualeant. Post calidam, &
asperam totius corporis fricationem, hunc febricitanti

T

cibum ministrato.

Ptisnam cum radicibus apij, & petroselini, & lenticula aqua parato, coquitoque sufficienter. Et cum syrupo acetoso, aut oximelite agrotanti si frigida sit natura ministrato.

Alium, coquito pullam eisdem herbis, folijs raphani, hordeo, & aceto fac potionem, et tenuem sorbitionem. Præterea infundantur in libra una aceti accerrimi, ficu siccarū lib. unius tertiam finito per diem, & noctē, postmodum colletur. Huius aceti untias tres accipito, aqua decoctionis radicis apij lenticula aqua untias quatuor, zucari quantum sufficit, coquito, & fac syrupum acetosum ijs conuenientē. Cūq; hæc febris ab uno simplici accidit humore, ut à pituita ualde crassa, quæ putrescens exteriora nō ualet calfacere, aut suæ crassitie aut leuis putredinis occasione, ad febres phlegmaticas, aut melancolicas, aut colericas pro uictu eliciendo recurrendum est. A singulis enim prædictorū humorum originem posse habere, doctissimis uiris placitum est. Vnde bene dixit arabs, tu uero inquit non debes ad paroxismos respicere, nam potest esse quod sit quotidiana, tertiana, & quartana, & quæ quinto, & septimo periodicant. De ijs uero quibus à reuocatione caloris ad intro, accidit in frigidari in febribus extrema, alibi nobis sermo erit. Est alia febris in qua exteriora calent & interiora frigent. Quæ ab aliquibus empiala nominatur, à non nullis liparia ab alijs tenedos, sed nomina secundum Platonem contemnere oportet eos, quibus aliarum rerum incumbit inuestigatio. Hæc accidit cum

à putrescente bile caloremque febrile excitante, phlegmata crassa in interioribus concreta dissoluantur. Accidit, ut ijs solutis partes internæ frigefiant. Viñtus ijs copiosioris alimonie exhiberi potest. Minus enim periculosa hæc ægritudo est, ut pote præternaturali calido in externas solum seuiente partes. Miscenda igitur ea sunt quæ ualenter incidant, & abstergant cum mediocri calore. Quapropter ijs cibis utere, quos hemitriteo phlegmaticæ conuenire diximus.

Gallus antiquus post lungam dimicationem cum altero, occidatur. Coquaturque cum hordeo, passulis enucleatis, pulegio, hyssopo, thymo, & uiolis, tempereturque cum oximelite acri, propinato quantum uno haustu sorbere possit, sorbitionem ne facias.

Præterea in aqua hordei conficito sorbitionem ex fure, & fermento, ut supra docuimus in febribus phlegmaticis. Sunt qui hanc quoque febrem à simplici pituita quæ non putruit secundum totum euenire affirmet. Sunt, & qui à melancolia. Quorum uictus sunt ex supradictis petendi. Hoc tamen proprium ijs febribus inest. Omnia nempe quæ aperiendo exiccant ijs febribus iocommoda ideo esse quod materiam crassiore reddunt. Quæ magis tennes sunt partibus in halitus digestis. Cunque febrium quæ calorem & frigus simul operantur materias, crassos humores esse medici asserant, fit, ut qui ius cicerum, et muriam ijs concedunt febricitantibus, parum salubriter consuluerint. Rectius, profectò fuerit, ijs uti, quæ humida existentia, abstergere, et incidere possint. Cum igitur huic febre à simplici pituita dependente ob-

DE VICTV FEBRICIT.

uiaueris, præsertim in homine frigida naturæ hunc cibum ministrato.

Sorbi-
tio ex
adipe
anatis.

Senescentem gallum prædicto modo defatigatum parato ad hunc modum, chamæmeli man. unum, & semis, ficuum aridarum, passularum enucleatarum, singulorū man. unum, hordei ab uno cortice exuti man. tres, coquito sufficienter, et collato. Accipito iuris libram unā, adipis anatis recentis untias tres, aceti albi è pulegio untiam unam, salis parum, bulliant iterum donec permisceantur. Dato calidum quantum uno haustu sorbere possit. Efficacissimum est ad crassos humores, & lentos febrem generantes. Idem cum capo, & pulla efficere possis sed inefficacius. Dicatur hæc sorbitio ex adipe anatis. Superest de ea in qua simul calor, & frigus per totum sentiuntur, febre sermonē facere. Hæc à bile putrescente similiter ortum habet. Calore febrili crassa phlegmata partes internas, & externas occupantia dissolvente, accidit, ut agrotantis sensus minimas non percipiens differentias, calorem, & frigus in eadem parte esse iudicet. Victus ijs conueniens est, qui incidere, & abstergere, & exiccare utcunque ualeat. Phlegmata si quidem in hac febre facilius dissoluuntur quam in prædictis. Signum est frigus intro, & extra perceptū, quod lationem materiæ per omnes indicat partes. Latio uero eius liquefactionem, liquefactio obedientiam materiæ dissoluenti. Phlegmata igitur cum in duritiem non occaluerit, aliquali indigent exiccatione. Quapropter talem ijs uictum ministrato.

Gallum senem, ut supra defatigatum coquito cum hor-

deo, radicibus apij, petroselini, passulis enucleatis, ciceribus. Hora una antequam ab igne amoveas, projcito aceti albi è pulegio quantum satis, salis modicum, fac ut supra. Potus omnibus ijs sit aqua hordei cum semine fœniculi, & radice apij cocta. Iis uero qui intus frigent, & extra calent, uinum album prædicta aqua dilutum administretur.

CAP. XXVI.

SED quos nam uictus exigant singulæ febres, indicatione sumpta ab affectu, & ab eius causa abunde quidem dictum est. Nunc uero quos nam uictus symptomatum simul habita ratione adhibere conueniat tempestiuum est percurramus. Nam quemadmodum symptomata curationis quandoque indicationem ad se trahunt, sic, & uictus rationem. Uictus enim administratio pars curationis est. Id etiam sicut, et reliqua ab Hip. didicimus, quem à symptomatum etiam natura, et uehementia, uictum conuenientem inuestigare obseruamus. Ut in eo ubi autem dolor aliquis uexauerit, oximeli bibendum dabis, hyeme calidum, æstate frigidum. Quod si multa sitis fuerit melicrato utendum, et aqua Gal. in expositione ita ait. Nempe quantum ad morbum spectat, oximelite magis est utendum. Verum si æger accepto multo oximelite adhuc sitiuerit, melicratum dare oportet. Quod si ab ea re sitiuerit, aquam offerendam putato, & si aqua per se pota culpa non careat. Præterea infra ratione symptomatis superuenientis sorbitionis modum mutare iubet, cum inquit. Postea si dolor quispiam uel periculum comparuerit sorbitio

r. de rōe
uictus.

DE VICTV FEBRICIT.

nem dare oportet neque multam, neque crassam, &c.
Sed inuestigare diligenter oportet, qua symptomatis
magnitudine mutare uictum oporteat. Initium huius
inuestigationis ab Hip. etiam sumendum est, uiro sapien-
tissimo. Ille enim uictus rationem in sola effatu digna
symptomatis magnitudine immutare uidetur, ut cum
dixit. *ἐὰν δὲ πολλὴ δίψα ᾖ καὶ μελικρήτω καὶ ὕδατι.* Hoc est
si multa sitis fuerit melicrato, & aqua. Ratio id quo-
que suadet, ut non à symptomatum quacunque magni-
tudine sed ab ea quæ effatu digna est, curationis scō-
pus mutandus sit. Nam cum symptomata, morborum
effectus sint, ablatione causarum euanescent. Qua-
propter, ut effectus sunt nullius sunt capacia indica-
tionis. Cum uero ad effatu dignam accrescunt ma-
gnitudinem, indicationem curationis præstant. Pro-
inde cum effatu dignæ symptomatum magnitudines,
sicut & cuius uis rei innumerae sint, sola ipsius magni-
tudinis ratione differentes, nisi aliquo signo magnitudi-
nem symptomatum diffiniamus, incompletus, & omni-
no inutilis noster sermo esset. Sic igitur symptomatum
magnitudo diffinienda est, ut eorum ratione uictus mu-
tetur. Nempe cū alicuius præter naturalis dispositionis
sunt causa. Quæ aut in morbum addat, aut naturæ ui-
res exoluat. Quodcunque horum in corpore eueniat
symptomatis magnitudinis causa, iusto tunc symptoma-
to uictus rationem, et curatiuam indicationem suppedi-
tāt. Vt pleuritico parū sitienti oximeli, aut melicratū
quæ ipsæ morbus exegerit offeres. Quod si multa siti ue-
xetur, nō iis, quæ morbū, et eius causam respiciunt, sed

ijs quæ sitim mitigant uteris. Nam multa sitis sputum exiccat, & morbum incoctibilem reddit. Febrisque calorem auget. Quapropter melicratum, & aquam exhibebimus à symptomate indicatione sumpta. Nam aqua morbi gratia exhibenda non esset. Ob id quod doloris maturationi aduersa est. Sic ergo symptomatum magnitudo diffinienda est, ut ab eis ratio curationis et uictus indicationes sumantur. Cæterum huiusmodi symptomata cum ad dictam perueniunt magnitudinem hoc est uicem habent causæ ad morbum relata, aut urgentis, aut causæ sine qua morbus curari non possit uicem habent. Quapropter potior est quæ ab eis sumitur indicatio quam à morbo. Vt ex dogmate de complicatis affectibus colligitur. Hoc etiam manifestum est ex eo quod Hip. pleuritico ualde sitienti aquam concessit. i. de rõe
uictus. Quam, si potiolem à morbo indicationem faceret, non exhiberet. Manifestum igitur est ex doctrina Hip. ut cū symptomata ad eā magnitudinē perueniunt ut in morbum addant, aut uires naturæ exoluāt, ab eis potiolem sumendam uictus esse indicationē. Danda nihilominus est opera, ut ea ministremus, quæ aut morbo si fieri possit conueniant, aut saltem incommoda non sint.

CAP. XXVII.

FABRICITANTI patienti uigiliās à bilioso humore ortum habentes hunc cibum ministrato.

Ex aqua hordei lac amigdalorum conficito mediocri crassitie, cunque semicoctum fuerit, man. unum coriandri uiridis in mortario conterito, addito modico croci simul in ollam projcito. Zucari quantum satis ad-

T iij

dito. Fac ut diccenter coquatur ad lentum ignem sem-
 per cum cocleari agitando quousque mediocriter cras-
 sum reddatur. Extrahito ab igne, & linteis circum uol-
 uito, & tepidum ministrato. Hac sorbitione usus fui
 olim in Anglia. Erat Anglus dicturus coram Henrico
 Angliæ Rege inuidiſſimo, & regni primoribus. Cu-
 rabatque ut ſuo cum honore rem ageret. Cunque tem-
 pus inſtaret, paucis ante diebus in moderato ſtudio, ui-
 gilanti cura, cerebrum adeo exiccavit, ut in uigilias in-
 cideret. Cunque apud amicos de ea re quæreretur,
 nec diacodion, nec ſyrupo de papauere nec alijs id ge-
 nus quæ in ei rimedimmi miſerant ſomnum ſibi cõciliare
 poſſet. Tertiusq; dies inſtaret, quæ ſibi ſano capite opus
 erat, cunque ob imbecillitatem quæ uigiliæ induxerāt
 parum ſibi crederet, in maxima erat ſollicitudine quid
 ageret. Accedens forte amicus hominem ſalutandi gra-
 tia rem audiens, conſuluit, ut mea uteretur opera. Re-
 pente ipſe ueniens, hominem inueni præter modum cal-
 factum. Cunque arteriam tangerem, conieci parum ab-
 eſſe hominem à febrili diſpoſitione. In eamque lapſu-
 rum niſi præſentaneo remedio ad propriam reuocare-
 tur temperiem. Cunque hæc ei retuliſſem, acclamauit
 ut omni diligentia id præſtare uoluſſem. Cunque homi-
 nem bono eſſe animo iube rem, abi, ſero rediens, ſolò
 iam occumbente hominem in capaciſſimo labro aquæ
 tepidæ ſedere iuſſi. Ibiq; hora una immorari per-
 miſſi. Exiens lectum petijt, ibi cum parum quieſceret,
 homini lac ſupradictum exhibui, abi que. Pueris ad-
 monitis, ut ſtrepitum uitarent. Sequenti die mihi acce-

denti occurrerunt famuli gratias agētes quod heri uigilias & famulorum uno remedio sanassem, inquiabat enim eos, referentes herum solidam dormisse noctem. Quod si inconficiendo lacte micam panis in aqua rosarum infusam simul cum amigdalīs teras, crassiorē efficies sorbitionem magis nutrientem, & humectantem. Quod si crassiori uti uelis sorbitione hoc modo conficito.

Panem purissimum mediocris ætatis in exiguas abrađe particulas, tribusq; aquis lauato, deinde amigdalārū succum ex aqua hordei extrahito, simulq; cum pane coquito, ad lentum ignem semper agitando, cunque semicoctum fuerit, coriandrum uiridem quantum manu capi possit in mortario cum pauco croco conterito, & cum sorbitione quæ ad ignem est dissoluito, adiecto zucaro, simul omnia coquito, quousq; permisceantur, coctleari panem ad ollæ parietes atterens. Cōueniens hic cibus est exiccato & super calfacto cerebro, frigidos et humidos halitus ad caput mittit, naturæ cerebri nimium familiares. Lusitanarum quæ in ægrotantium commodum diligentiores sunt fœminæ, cum somnum conciliare student, sorbitionem sic parant.

Micam panis post ablutionem in aqua hordei coquunt, butiri recentis parum pro panis portione, aut oleum purissimum oliuarū eius loco iniiciunt. Cunque ferè coctū est. Coriandrū uiride & croci parum conterunt, & in mortario cum sorbitionis modico dissoluunt. Qui recentis (in aqua frigida horis tribus infusi) uitellum, cū sorbitione, quæ in mortario est, coctlearis conquassatione

DE VICTV FEBRICIT.

permiscent, in ollam reijciunt, & cum zucaro simul co-
quunt, semper agitando cum cocleari donec percoctum
sit. Valens hic cibus est ad conciliandū somnum. Attā-
men quia multi nutrimenti est, continuus febris, &
acutis non conuenit. Nisi facultatis imbecillitas id sua-
deret. Febris ijs quæ periodicæ intermittunt, &
quiescunt bono temporis interuallo concedi posset.
Lactucas quæ mediæ sunt ætatis in aqua coquito, cunq;
percoctæ fuerint, aquam ab eis forti compressione ex-
trahito, cultello in exiguas portiunculas percite, oleo,
aceto, sale, & zucaro pro portione inspersis, uigilias pa-
tienti dato ut cum pane deuoret. Qui uero uigilias ob
doloris uehementiam patiuntur. Cibus somnum indu-
cere ne speres, sed confestim relicta ea artis medicæ par-
te quæ uictus rationem docet, ad utranque & quæ de
medicamentis agit, & quæ circa manus operationem
uersatur te confer, ab illis, quo hominem à dolore leues
auxilium petas. Sciens in hora doloris cibum quemcun-
que culpa non uacare. Præcipue qui facile acescunt,
aut in fumum abeunt. Vtraq; enim causa dolorem au-
get. Nam ptisana quæ ab Hip. ut conuenientissimus ci-
bus acute febricitantibus receptus est, in uehementia
doloris ab eodem damnatur in primo de ratione uictus
in morbis acutis, in hæc uerba. Nisi quis inquit dolorem
uel alui subductione, uel insecta uena, pro utriusuis
exigentia soluerit, ptisanam ita affectis dederit, præci-
pitem aget in mortem. De reliquis cibus in hora doloris
ita ait. Præbendunt hæc non solum si ptisana intempe-
stine utantur, uerum & multo magis si quippiam aliud

quod ptisana inconuenientius sit, uel ederint uel biberint. Sed fortasse quis nobis obijciat Hipp. in prædictis locis ptisanam prohibuisse sicuti & cibos alios, non doloris sed inflammationis membranæ succingentis coctas ratione, de qua ei sermo erat, quam dolorē appellauit. Vere ita res habet, non ob id tamen aufertur quod diximus, nempe in hora uehementis doloris; cibum quemcunq; & si leuissimum culpa non uacare. Quinimmo magno esse nocumento assero, hac ductus ratione. Dolor est ex ijs quæ maxime uirtutem corporis prosternunt ut Gal. uisum est. Ita ut nec uentriculus cibum recte coquat, nec hepar aut uenæ hunc in sanguinem commode mutant. Nec distributio præterea, nec appositio, nec excrementorum expulsio, nec ulla naturalium actionum commode peragatur. Tum ob dolorem actiones ledentem, tum maxime ob id quod intenta natura ad id quod contristat, sanguinem & spiritus, qui commune ad omnes actiones instrumentum est, ad locum doloris mittat. Vnde fit ut loca coctioni deputata indigentiam patiantur. Quæ causa est, ut cibus perperam coquatur in uentriculo, hepate, & uenis, facileq; inde extraneum concipiat calorem. Et tandem additionis doloris causa fiat. Cum igitur loca coctioni deputata influentis calidi indigentiam patiantur, & obiectum in quod agunt calido extraneo obnoxium ob id (natura alio intenta) maneat, consulte medici agunt sanguinem in forti dolore mittentes. Ut quantum natura à consueta deficit cura, tantum sanguinis imminuatur. Iuxta illud minori curæ minus quod curet. Nec solum mittendus

DE VICTV FEBRICIT.

est sanguis, ut qui in iocinere & uenis est, succū ab extraneo calore incolumen tueamur. Sed & cibo qui in uentriculo est consulimus, uomitum prouocātes. Cūq; hæc ita se habeāt, dementis consilij fuerit, cibum ea hora ministrare, qua eius à corpore eductio doloris remedium est. Qua in sententia Gal. est in expositione illius maius quidem malum est &c. Vbi ad hunc modum scribit. Contra autem qui ob dolorem uel morbi acumen, euacuatione interdum magis quam repletionem indigēt. Immo qui cibum his exhibet, maximum operatur malum &c. Cæterum cum dolorū plures sint differentiæ, ita ut alij alternis inuadunt temporibus & remittant. Alij perpetuo torqueant. Horum nonnulli talem consecuti sunt uehementiam, ut in uigilias laborantes deducant. Alij in inquietationes. Non una uictus ratio ab omnibus sumenda erit. Dolores igitur quicunq; laborantes inquietant omnem cibum & potum abscindunt. Ut in ijs quæ in primo libro differuimus abunde dictum est. Vbi ostendimus morbum cui continua coniuncta est inquietatio intra dies quattuor terminari ob eius uehementiam, & omnimodam ei abstinentiam conuenire. Vehementissimi quidem dolores sunt, qui laborantes in inquietationem deducant. De hoc locutus est citato loco Gal. cum dixit qui alimentum his ministrat, maximum operatur malum. Quod manifestum est ex ijs quæ in initio expositionis scripsit ubi uehementissimum dolorem ad hunc modum describit. Propter dolores sæpe quidem laborantes sine pulsu fiunt, & animi deliquia incurant, et in nullo motu moueri possunt. Similia bis ab

acumine morbi eueniunt. Sunt autem quibus non propter id uirtus laborat, sed ob uasorum quomodolibet factam euacuationem. Siue igitur ob excretionem sensui manifestam. Siue ob διαφύρῃσιν, id est in halitus digestionem, siue ob inedia, hi quidem alimento indigent & quàm celerrime refici. Contra autem qui ob dolorē, uel morbi acumen, euacuatione aliquando indigēt magis, quàm additione. Immo qui alimētum his porrigit, maximum operatur malum. Validum ex uerbis Gal. sumitur argumentum, laboranti uehementissimo dolore cum robore uirium, nullum exhibendum fore alimentum. Cum in eos qui ob dolorem imbecilles admodum facti sunt, ita ut absque pulsu fiant, & animi deliquio capiantur, maximum operari malum scribat. Ob dolores qui proxime à uehementissimis degenerant, unam decubitus formam seruare queunt laborantes. Somnū tamen capere non possunt. Quare talis ijs uictus ministrandus est, qualem morbis, qui ad septimum terminantur, conuenire diximus. Vigiliæ enim continuæ, ut in primo libro ostendimus unum sunt ex tribus symptomatibus, quæ morbum ad septimum terminant. Iis igitur qui ob dolorem perpetuas patiuntur uigilias uictus per pocula conuenit. Sic Hip. uti uero potu oportet, si dolor aliquis affuerit, oximelite, hyeme quidem calido, æstate uero frigido. Si uero multa sitis fuerit, & melicrato & aqua. Quo in loco Hip. uictus formam à ratione duorum symptomatum diffiniuit, nempe à dolore & à multa siti. Dicens κρείσθαι δὲ ποτῶ, ὡς ἀληθείᾳτι ἔχη, ὅξυ- μέλιτι, χαμῶνος μὲν θερμῶ, θέρους δὲ ψυχρῶ. ἐὰν δὲ πολλὰ δί-

DE VICTV FEBRICIT.

φαῖν, καὶ μελικρήτω καὶ ὕδατι. Vbi perperam quidam in
 hunc modum uertit. Vbi autem dolor aliquis uexauerit
 oximeli bibendum dabis. Non equidem id solū uult
 Hipp. ut oximelite cum dolor aliquis affuerit utamur.
 Sed duo nos in dictis uerbis docet. Nempe cum dolor
 aliquis affuerit uictu per pocula utendum esse. Secun-
 do declarat nobis conuenientem potum oximeli esse.
 Si enim eadem fuisset Hip. mēs ac traductor intelligit,
 breuius quidem sententiam protulisset ad hunc modum
 χρῆσθαι δὲ ὀξιμέλιτι ὡς ἀλγημάτι ἐχῆ. Hoc est uti uero
 oximelite si dolor aliquis affuerit. Id præterea facile
 erat ex media quietis signo quod dictioni ποτῶ, coniun-
 ctum est elicere. Sed quod semper dicere sum solitus
 hic præterire silentio haud æquum censeo. Solius Hip.
 scripta de uerbo ad uerbum trasferenda fore. Ut incor-
 ruptam grauiſſimi uiri sententiam habeamus. Nullo
 quidem breuiloquus uir ocioso usus est uerbo. Quicun-
 que igitur in uertendo Hipp. curant elegantiam ser-
 monis, caueant in diuinas uiri sententias corrumpant.
 Ad propositum redeundo. Cum dolor, tali sit uehe-
 mentia ut uigilias inducat, uictum per pocula indicat,
 sorbitionesq; tunc temporis ministrandas non esse. Sed
 forsā quis nobis obijciat. Hip. cum in dolore assidua
 sorbitiones & cibum subtrahit, non doloris sed inflam-
 mationis, & acutæ febris ratione prohibet. Ut in pri-
 mo de ratione uictus cum scribit. Ad hæc si adhuc la-
 teris dolor continuis fuerit &c. Non solum ubi dolor
 acutæ febris cōiunctus est, uictus qui poculis sit crassior
 incommodus est, sed ubi dolor absque ulla sit febre.

Quod cum ostendemus, manifestum erit in dolore acuta febre coniuncto, cibum & sorbitiones Hipp. ratione symptomatis potius quam morbi prohibuisse. Ille igitur inde uictu sanorum ita scribit. Quibuscunque dolores fiunt in uisceribus uel ex exercitatione uel alia quapiam ambulatione his confert sine cibo recreari. Potione uero uti &c. Ex ijs quæ statim subiungit, & apertius ex Gal. in expositione manifestum fit, de ijs qui absq; febre fiunt doloribus locutum fuisse. Si igitur scripta Hip. uigilanti lectiōni percurramus, nō solū cibum ijs prohibere, qui cū robore uiriū doloribus infestantur, reperiemus, sed in eos qui imbecilles ideo effecti sunt, si quis uictus formam, aut quātitatem ad maius augeat, magnum operari malum affirmat. Vbi ad hunc modum scribit. Ingens si quidem malum est, si ob dolorem & acumen morbi imbecillitato porrigat quis potū uel sorbitionis plus, uel esculētum, imbecillitatem eam ex uasorum inanitione contigisse arbitratus &c. Quo in loco potum, sorbitionem, & esculentum non asserit male ijs exhiberi qui ob dolorem, aut morbi acumen imbecilles fiunt, ut quidam opinatus est. Sed solum damnat additionem uictus formæ, aut quantitatis quibus ante imbecillitatem æger utebatur. Vt si tribus aquæ mulsæ cyathis Socratem acuta febre, uehementi capitis dolore, laborantem nutrias, ob dolorem autem, aut uorbi acumen in magnam incidat imbecillitatem, ita ut moueri nequeat, & absque pulsu fiat, caueas ut huic aut sorbitionem, aut plus tribus cyathis mulsæ ministres. Nam hoc quidem magnum malū esse affirmat. Quibus

DE VICTV FEBRICIT.

autem signis imbecillitatem, quæ à dolore aut morbi acumine & eam quæ à uasorum inanitione euenit discernere possimus supra ostensum est. Potus igitur quæ ijs concedemus talis sit ut aliquod præstet corpori nutrimentum, & doloris etiam causam respiciat. Vt oximeli quo utitur in lib. i. de ratione uictus ad lateris dolorē, ut quod eius causam respiciat. Et in libro de uictu sanorum ad dolores uiscerum absq; febre, qui ab obstructione ortum habent, potione utitur cuius minimum in corpus ingrediens plurimum educat lotium. Et quia hæc inuestigatio ad eam artis medicæ partem quæ morborum speculatur remedia (*ἡ περὶ τῆς νόσου* Græce dicitur) spectat, non est quod hic longiorem faciamus sermonem. Illuc te confer si quod reliquum huius speculationis est, quæris. Nos interim reliqua prosequamur præpositi. Vigilia interdum ex penuria uaporosi halitus cerebri humectantis euenit, & si quando ex defectu alimenti in uentriculo accidat, ut plurimum inclinante morbo fit. Iis præcipue qui bona ualitudine multum ingerere sunt soliti. In morborum incrementis, aut uigore, raro ob hanc solam causam uigiliæ accidunt. Difficileq; tunc id percipere, ui morbi uigiliarum magis perspicua causa, illam obscurante. Cum ergo hanc esse uigiliarum occasionem intellexeris, cibum dato qui facilis sit coctionis & substantiæ, quæ dulces ex se emittat halitus. Vt pisces petrosi, qui in hora uigeant, cocti cū anetho, petroselino, sale, & aceto, oleo, aut butiro recepti, & succo uuæ acerbæ, aut eius loco berberibus. Hunc cibum ministraui cū essem in Anglia præclarissimo uiro domino

ro domino Guilielmo cidne serenissimi principis Anglo-
rum, magno cubiculario dignissimo. Cum enim incli-
nante iam morbo uigilas pateretur, multaq; in huius
gratiam apparata nil quicquam proficerent, rogavi ho-
minem an uellet fluuiatiles ad cœnam pisciculos, quos
gudions uulgarī sermone Angli appellant. Annuente in-
ductoq; coquo modum apparandi impositi. Permissique,
ut eisdem ad libitum uesceretur. Abij, in crastinum re-
diens percepi hominem nocte dulces cœpisse somnos. Ad
huius cognitionem me potissimum induxerunt hominis
habitus, & eius assuetudo. Iis accessit quod inclinante
iam morbo nulla uidebatur ad uigilias inducendas iu-
sta occasio. Quapropter diligenter oportet medicum
contemplari actiones singularum corporis partium,
quando imminuuntur, aut deficiunt, ratione indigen-
tie nutrimenti, & quando acuminis morbi. Cunque pri-
mum contingit, cibus illico dandus est. Si secundum, ma-
xime prohibendus. Qua in re sæpe labuntur nostræ eta-
tis medici, non discernentes alterutram actionum no-
xæ causam. Quod antiquis medicis prior Hip. obiecit in
libro secundo de ratione uictus in morbis acutis in hæc
uerba. Neque sanè horum ita peritos uideo medicos qui
ut oportet dignoscant eas quæ in morbis contingunt ui-
rium infirmitates, quæ ob uasorum quam *νεκρωτικῆς*
Græci dicunt. Et quæ ob aliam quampiam irritatio-
nem, & quæ ob *πόνορ*, id est laborem, & quæ ob mor-
bi acumen fiant.

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. XXVIII.

SITIS febricitantibus quandoque tali est uehementia, ut indicationem curationis suppeditet. Id hoc modo discernas. Cum igitur sitis morbi materiae remouetur coctionem, aut nimia sputum exiccatione inhibet, aut ab ea corpus arefiat, rationabiliter ab ea uictus ratio sumetur. Quare tunc dare operam medicum oportet, ut sitim leuet. Idque fiet cibo, & potu qui actu & potentia frigidi, & humidifint. Omnium maxime, quæ sitim uincunt aqua frigida est. Præcipue quæ à medicis probatur. Secundo loco est aqua hordei. Tercio syrupus uiolaceus multa aqua dilutus, quem sic præparabis.

Aquam coquito in olla recenti ad unius quartæ partis absorptionem, ab igne amouens residere finito. Deinde aquam à sedimine separato, cuius accipito partes uiginti, syrupi uiolearum depurati, aut eius ulep partem unam. Bulliant ad lentum ignem, donec permisceantur. Deinde sub die exposito ad Septentionem. Et frigidum exhibeto. Simili modo confici potest aqua zucari quæ nostri recentiores multoties utuntur. Sed considerare diligenter oportet ne in uehementi lingua totius quæ corporis squallore utamur ea nec abstergente ullo. Nam talia corpus siccus reddunt. Vt me experientia olim docuit. Cum essem in Anglia, Hispanum puerum periodica febre laborantem inuisi, habitu gracili, & præter modum squallido, eius lingua præ nimio squal-

lore arida ultra modū erat, ut uis loqui posset, indomitamq; sitim patiebatur. Frigidā puero exhibere mihi uisum est. Zucarnmq; imposui, ut aquarum crassitiem corrigeret. Cunque à potu frigida non leuaretur sitis, uitio aquæ illud tribuens, aquam destillationis buglosæ ut pote in qua nil crassum est cum zucaro ministraui. Cunque à copioso, & crebro illius potu siccior etiam euaderet, intellexi tandem in uehementi squallore, nimium aduersa esse quæ abstergendi facultatem habet. Ex eo quia corpus, & humores sicciora reddunt. Nam non aliter corpori quod uehementer exiccatum est, ea quæ abstergunt adhibentur, quam si lintea sordida absque aqueo humore sapone deterforio unguento diligenter perfrices, ut sordes detergeas. Quāto enim plus deterforij adhibueris eo nihil proficies. Nam sordes magis tenacius impinges. Oportet enim lintea aqua prius macerare, ut sordities quam abstergere cupis humecta fiat. Ut consueuerunt fæminæ, quæ doctiores in ea arte sunt, ut minores faciant expensas, diutius lintea in aqua macerare permittunt, rem illis usu monstrante. Cum igitur hominum corpora uehementer exiccata sunt, cauendum est ab usu abstergentium. Non sunt enim eo tempore detergendi humores, sed potius humectandi. At cum humectos satis reddideris, abstergentibus secure uti poteris. Hoc postea ab Hip. intellexi in primo de ratione uictus in morbis acutis ubi ita scribit. Verum dandæ sorbitionis quantitas hoc obseruabitur modo, nempe si morbus siccior quam, ut quispiam

DE VICTV FEBRICIT.

existimet fuerit, non multum dare oportet sed præbibe-
re ante sorbitionem uel mulsam, uel uinum. Alterutrū
magis conueniat. Gal. in expositione signa commemo-
rans quibus cognoscitur siccus affectus, ita scribit. Et
sanè inquit superfluitatum nihil excernere, siccorum
omnium morborum nota est. Non immerito igitur
Hippoc. humectantium aliquod ante ptisanam adsumi
iubet, & c. Nec solum ea quæ abstergunt in dicto af-
fectu fugienda sunt, uerum, & quicunque cibus, &
sorbitio. Nam solo potu humectante utendum est in
ijs quorum linguæ totumque corpus ultra modum ari-
da sunt. Si enim ijs cibum, aut sorbitionem dederis,
partes sorbitionis quæ crassioris sunt substantiæ uentri-
culi tunicis præ nimia earum siccitate adhærentes à fe-
brili calore deurentur potius quàm coquantur. Non
aliter quàm cibus illæ adhærens comburi solet, humore
aqueo deficiente. Hæc ut arbitror fuit mens Hip. supra
citato loco, cum morbo ultra modum sicco existente, an-
te sorbitionē præbibe mulsam uel uinum agrotantes
iubet uolens in tali affectu solo potu humectante prius
nutriendos esse laborantes donec ariditas soluatur. De
inde ad sorbitiones deuenire. Et hoc est quod intellexit
cum dixit ἀλλὰ προπίνειν πρὸ τῆς ρόφηματος, id est sed præ-
bibere ante sorbitionem oportet. Nec ideo quod Hip.
mulsam exhibere consulat, quæ mellis ratione abster-
tergere ualet, in Hispani pueri affectu aquam zucari
præter rationem prohibuimus. Quæ longæ inferior
est quam mulsæ in abstergendo. Nam cum Hip. in mor-

homo ultra modum squallido nec sorbitionem, nec cibum alium quęcunque recte exhiberi ob iam dictam rationem opinaretur, potum concessurus magis nutrientem elegit. Sunt autem quattuor de quibus agit in libris de ratione uictus. Nempe aqua hordei, mulsa, uinum, oximeli. In sicco affectu nec oximelitis, nec aquę hordei mentionem fecit. Alterum quia nimis incisium est sicco affectui non conuenit. Aqua hordei prout potus est, parum nutrit ob tenuitatem. Mulsę autem, & uini meminit tanquam ea, quę magis nutriunt, & humectant. Electionem uero alterutrius medico relinquit, ac si intelligat in sicco affectu posse aliquando alterum ledere, & eorum alterum conuenire. Si enim a bilioso humore ob eius indomitam qualitatem siccus eueniat affectus uitanda magnopere est mulsa, uinum uero exhibendum quod citra abstersionem incisionemue humectat. Et uires naturę ministrat. Quod si a nimis crasso humore coëtrici facultati repugnante, morbus siccior euadat, mulsa potius quàm uinum ministranda est. Tum ad humoris extenuandam crassitiem, tum ad humectandum corpus. Plus enim humectat mulsa quàm oximeli. Hanc fuisse Hip. mentem opinamur. Sed, & illud certo scimus quod siccitas, quę linguae, & toto corpori aduenit ob bilis ardentis qualitatem multo ualidior est, quàm quę a crassitie sola humorum prouenit. Quapropter recte supra additum est in uehementi siccitate uitandum esse aquam zucari, et quę abstergendi uim habeant. Potumq; solo humectante utendum esse.

DE VICTV FEBRICIT.

Sentis ne studiose lector quā dicta mea cū Hip. conueniant scriptis. Quem unum uirum unde quaque sapientissimum admiror. Sed rectius mihi qui obijciat, me in curatione pueri Hispani fuisse lapsum, febrem tertianā patientis cum ualidissima, & linguæ, & totius corporis siccitate, qui ei aquam zucari ministrassem, nam manifestum erat uehementem illam siccitatem à qualitate bilis accerrimæ ortum traxisse. Quapropter uino diluto non aqua zucari nutriendus erat. Sed bene ualeant medicorum errores quibus à tergo morosa cōiuncta est pœnitentia, ut in posterum illud caueant attētiori; cura remediorum qualitates, & affectus examinent. Ego uero ut moris est lusitanorum genti, errorem meum ingenuè fateri pium esse iudico. Eundemq; scriptis mandare. Vt posteros rei cautos reddam. Id enim est à uitio uirtutem, bonum à malo, ab obliquo rectū elicere. Scio enim hominis naturam talem esse, ut facile elabi possit. Quod si cum Homero sentiendum sit, intellectum hominis in terris talem esse qualem pater deorum atque hominum induxit in diem, medicorum errores profectò digni sunt uenia. Qui secretos corporum affectus rimātur. Quapropter cum erroribus maxime sit medicus obnoxius, pī hominis officio eum uti iudico, qui Hipp. in primo de morbis uulgaribus adimplere conatur præceptum dicētis. In hoc te exercetò, ut saltem si non prosis nequid noceas. Sed ad reliqua propositi reuertamur. In febre quæ cum ualidissima siccitate est, cibis parcendum est, solo humectante potu nutriendi sunt ægrotan-

res. Vinumq; ijs exhibendū, quod natura aquosum sit. Item pullam crassam cum hepatica, hordco ab utroque cortice exuto, prunis, passidis, floribus borraginis, et uio-
lis in copiosa aqua coquito, ut ius tenue fiat. Cūq; per-
cocta fuerint, collato. Ius ægrotanti tenue exhibeto, sta-
timq; uinum dilutum in quo super natet frustulum pa-
nis quantum uno haustu bibere possit, dato. Ventri-
culo aliquid extra, quod humectare possit apponito.
Quod si siccitas remissior fuerit, ijs quæ infrigidant, &
humectant in cibis, et potibus utemur. Cucurbita cocta
cibus est qui sitim compefcit. Lactuca etiā eo quo supra
parauimus modo utilis est, cruda etiam cum eisdem de-
uorata maxime sitim reprimit. Oleum purissimum oli-
uarum immaturi partem unam, aceti albi partes duas,
zucari tres, simul misce, & cum pane utitor. Ad sitim
sedandam, & ad alios quamplurimos usus confert. Pa-
nis præterea refrigerans conuenit prout parauimus su-
pra cū de uictu qui tertianæ puræ competit ageremus,
cibus est maxime aptus sitienti febricitanti. Sed, & sor-
bitio ex pane, & aqua hordei, & zucaro quam commu-
niter panatellā uocant, confert. Conferunt, & cibaria
ea quæ ex herbis, & fructibus parantur. Quorū omniū
melones primum locum obtinent. Sunt qui ad sitim se-
dandam aquis distillatis endiuia, cichori, buglosæ cum
syrupo rosarum uel uiolearum, aut iulep utuntur. In fe-
bribus, quæ à causa calida ortum habent absque pitui-
tæ mixtione æstate præcipue communis usus amplecten-
dus est. Cæterum latere non oportet ubicunque crudi-

DE VICTV FEBRICIT.

humoris de pituitæ genere coctionem quærimus, ut fe-
bri medeamur, magis lædere potum aquæ distillatæ
quàm aquæ naturalis. Illa quidem si frigida offera-
tur duplici nomine in frigidabit, actu, & potentia. Ma-
gis præterea penetrat in corporis interiora ratione
qualitatis igneæ. Vnde ab huiusmodi aquis magis pa-
ti natium calorem quàm à naturali manifestum est.
Quapropter in causâ frigida, & ijs qui alicuius inte-
riorum uiscerum imbecillitatem patiuntur, uitandas
esse distillationum aquas opinamur. Sed non præter-
mittendum est sitim quandoque à uentriculo, quando-
que ab iocinere, & pulmone, & renibus euenire pos-
se. Vt à Gal. in libris de locis affectis scriptum est.
Quæ à pulmone ortum habet, aqua hordei cum syru-
po uiolarum sedat. Ab hepate aquæ distillatæ frigida.
A uentriculo, potus aquæ frigida. A renibus, aqua
decoctionis liquiritiæ compefcit.

C A P. XXIX.

PATIVNTVR febricitantes aliquando dictio-
nem appetentiæ, ut eorum corpora arecant atrophia.
Cunque multiplices habeat causas nullus cibus simpli-
citer commendandus est ad inducendam appetentiam.
Sed prius causa inuestiganda est, ut quod utile ægrotan-
tibus sit inueniamus. Cæterum omissis primarijs causis
appetentia deiçitur deficiente aliquo corñ, quæ ad in-
ducendam appetentiam necessaria sunt. Appetimus se-

cundum naturam homines hoc causarum ordine. Corpora nostra à ui continentis in halitus perpetuo digeruntur. Huic effluxui ut remedium restauratio à singulis nostri corporis particulis quæritur. Restauratur uero id quod effluxum est, ab ea substantia, quæ singulis partibus apposita unica transmutatione in substantiam simplicis mutatur; (Cambium medici uocant) hæc rursus ab ea quæ in osculis tenuium uenarum est, instauratur. Non à rore ut aliqui opinati sunt. Quæ in exilibus uasis est, à sanguine qui in magnis continetur uasis renouatur. Vasa ab iocinere, hic tandē à uentriculo per meseraicas uenulas quas manus hepatis recte quidam nuncuparunt sugit. His trahentibus ad os uentriculi succus peruenit. Hunc partium eius aliqualis constrictio excipit. Huius constrictiois sensus, fames est. Tres igitur summatim causæ consequentes in fame naturali apparēt. Attractio, constrictio, & sensus oris uentriculi. Appetentia igitur quocunque horū deficiente diminui, & prosterni potest. Cæterum prima causa è tribus deficiente, remedium ab ea artis parte, quæ morbos curat petendum est. Minimam scias uim tūc inesse cibi cum naturalis totius corporis attractio deest. Aliquam sed exiguam si tertia. Magnam uero si secunda. Non solum igitur intemperies oris uentriculi cibi appetentiam deijcit, sed & humor quicunque sit, qui aut sensum oris hebetet, aut cōstrictionem partium eius prohibeat. Intemperies autem quæ ut in pluribus cibi fastidium generat calida est, cum utraque contra-

rietate sicca & humida humiori coniuncta & absq; eo. Cæterum cum caliditas, & humiditas causa sunt deiectionis appetentiæ, cappares cum aceto & conditæ oliuæ, ius lentium, profunt. Sed cum siccitati coniuncta est caliditas, & appetentiam deijcit, aqua frigida maxime inuat. Nisi quid prohibeat. Lactuca, cucurbita, citrulli, melones, & id genus fructus maxime profunt. Quæ de causa æstate his prius ad mensam utimur, ut calorem & siccitatem uentriculi reprimamus. Vnde ab ijs nosmetipsos ad cibos promptiores sentimus. Multa præterea sunt frigida & humida cibaria huic proposito conuenientia quorum supra meminimus. Sed quæ à fructibus petuntur, & ad appetentiam inducendam, & ad sitim sedandam efficaciora sunt. Deijcitur etiam ob defectum constrictionis partium oris uentriculi. Huic contraria dispositio est, quam quidam recentiorum medicorum uentriculi remollitionem, aut relaxationem dixerunt. Hæc non solum actioni facultatis appetentis, sed & reliquis uentriculi actionibus aduersatur. Ortum habet ab humore pituitoso diu uentriculo insidente, & eius tunicas irrigante. Cuius meminit Gal. septimo de methodo, ubi in remedium huius uitij absinthij potionem concedit. Hæc relaxatio superficiem uentriculi lauem reddit. Vnde appetentiam deijcit. Hæc enim aut sensus exasperantis rei est, aut ex eo nascitur. Quam ob rem absinthium recte appetentiam inducere dicitur. Nam sua siccitate laxum uentriculum corrigit, amaritudine & astrictione lauem eius superficiem.

exasperat. Quam ob rem cum ob relaxationem uentriculi deiciatur appetentia, absinthio utemur. Vnde ad hunc sensum recte à Dioscoride commendatum est, ad discutienda fastidia. Sed & cappares, & oliuæ hoc modo appetentiam excitant. Pisces quoque saliti efficacissimi sunt ad deiectam appetentiam suscitandam. Vnde supra cum de uariolis nobis sermo esset, & de pestilenti febre salitos pisces appetentiam excitare asseruimus teste Rasi. Fit & aliquando ut humor crudus uentriculi tunicis diu inhaerens fastidium inducat. Quaecunque ergo hunc excernendi, & uentriculum exasperandi facultatem habent, appetentiam proprie inducere dicuntur ob id, quod ut plurimum à iam dicta causa nascuntur cibi fastidia. Talia sunt in calidis allium, & cepa. Allium si quidem excernendi uim habet. Ventriculumq; mordet, & exiccat ut asseruit Dioscorides. Vanum est quod de eo dicitur flatuosum esse, & cibi fastidia inducere. Nam experientia quottidiana scimus, aduersus flatum non laeue remedium esse, & appetentiam excitare. Cui sententiae astipulatur Gal. quarto de ratione uictus in morbis acutis. De allio supra à nobis habitus est sermo; ubi ostendimus omnes naturales uentriculi actiones roborare. Quicumque igitur à crudis humoribus dum uentriculo insidentibus cibi fastidium patiuntur, allio in succo uinae acerbæ, aut acetosæ macerato efficacissime utentur. Sed & cepæ expurgandi uis inest, iuxta Dioscoridis sententiam, uentriculumq; mordet;

Qua de causa appetentiam inuitat. Quicumque igitur ob exercitij defectum, aut ob debilem expultricem, ob dormientem oris uentriculi sensum habent, hacq; occasione cibum fastidiunt, cepa cruda utiliter uti possunt cum aqua sale & pipere in tennes laminas incisa, unde apud hebreos in prouerbio est cepa absq; pane scrutatur. Sinapi etiam aceto & pane contusum sensum uentriculi acriorē reddit, excrementa eius transferēdo. Petroselinū cū cibo coctū, aut in uisceribus capi qui ad ignem coquitur immissum, citra eā quæ à manifestis sumitur qualitatibus actionē, appetentiā excitat. Crudum item cum aceto, et pane in mortario contusum mirum in modum prodest. Vnde angli petroselini carnibus assis infixi nidore delectantur. Recte quidam ex recentioribus de eo sentit, calido & frigido conuenire uentriculo. Cum ergo à calore & siccitate prostrata est appetentia aqua frigida summum est remediū. Olei immaturi partes duas, aceti partes tres, simul misceto. Mixtis utere cum pane. Cum à calore & humiditate ortū habet, oliuæ, cappares, uua acerba & similia profunt. Cum uero à relaxatione partium oris uentriculi, saliti pisces, cappares, & reliqua cibaria quæ uentriculum exiccantia exasperant. Allia uero feruescētā cum succo uuæ acerbæ, aut acetosæ relaxationi frigido humori coniunctæ non inutilia sunt. Quod si ob hebetem uentriculi sensum, cibum fastidiant egrotantes, cepa cum aqua sale & pipere iuuat. Sinapi praterea cum pane aceto cōtusum prodest. In summa omnia

quæ discutere ualeant, & mordendi facultatem habeant. Est unus ex arabibus medicis qui ita scribit. Et ex eis quæ conferunt illis quorum appetitus prostratus est, propter debilitatem, sicut conualescentium, aut propter materiam humidam uiscosam est, ut comedant oliuas & aliquid de piscibus salitis. Sed re uera sicut oliuæ læsioni sunt ijs, quorum uentres humido & uiscoso humore abundant, ita & pisces saliti conualescentibus ijs, qui ob debilitatem cibum fastidiant. Nam iuxta huius medici sententiam propter sanguinis penuriam ijs deijcitur appetentia. Et subdit statim ut conualescentibus accidit, aut ijs qui euacuantur plurima euacuatione. Vtrisque cum cibum fastidiunt, piscium salitorum usum potius incommodo fore, quàm adiuumento opinor. Sed neque oliuæ conditæ hos meliores reddent. Sed si succum perdicis ijs obtulisset, offamq; panis in uino odorifero madentē & similia, citius his appetentiā reduceret, cum à prædictis causis cibum fastidirent. Sed indistincte admodum multa postmodum connumerat, quæ fastidium discutiunt adhuc modum. Ex prouocantibus appetitum sunt cappares præparatæ, menta, cepa, oliuæ, piper, gariophili, galanga, acetum, acetosa almuri, allea, cepa, opoponacum & mel. Hæc ille, quibus in uerbis multa absque ulla methodo connumerauit remedia, quibus conueniant dispositionibus ea non adaptans. Quorum alia ex eo quia exiccant, & exasperant appetentiā inducunt, ut cappares præparatæ, & menta. Alia ob id quod astringendo exiccant, ut ace-

tum acetosa muria, & condita oliuæ. Alia quia exiccando excrementa à uentriculo excernunt, ut allium piper, Alia quia mordendo oris uentriculi sensum acutiores reddunt, ut cepa, si quando ab excrementis expultrici facultatis, aut coëtricis uitio redundantibus hebes fiat. Hoc profectò docere est, remedium nempe unumquodque singulis causarum à quibus morbus ortum habet contrarietatem obseruantes adaptare. Sed inter ea quæ indistincte numerat mellis meminit. Quod nec ratione nec experientia appetentiam posse inducere comperio. Nisi id melli concedas ob id quia abstergerendi uim habeat. Hocq; modo plura sunt quæ appetentiam inducunt quàm quæ experientia ostendat.

CAP. XXX.

TUSSIS in febribus cum à caliditate & siccitate absque humore ortum habet, hoc uictu utere.

Aquæ hordei libram unam, syrupi uiolarum, aut eius iulep partem decimam, misceto & utere.

Portulaca coëcta cum aqua & zucaro confert. Valde etiam prodest panis in aqua frigida infusus, zucaro uiolarum super asperso.

Fiat ptisana hoc modo. Hordei ab utroque cortice exuti manip. quinque, uiolarum recentium portulacæ, & prunorum ana manip. unum & semis, coquantur, in

aqua copiosa cum duobus pullis crassis paruulis, donec rumpatur hordeum & tenerimum fiat. Coletur tandem & modico zucaro penidiarum addito, bullire hordeum cum decocto iterum finito donec permisceantur, utitor cum oportuerit. Sunt qui hunc cibum hordeatum nuncupent. Multum prodest calidæ, & siccæ intemperiei iocineris, & pulmonis. Multum etiam his conuenit expressio quattuor seminum frigidorum (emulsionem medici uocant) ex aqua hordei cum zucaro penidiarum, & modico coriandri uiridis integri in ebullientem succum proiecti. Cum uero à phlegmate crasso ortum habet. Sorbitione furfuracea utere. Vtere & iure Galli antiqui prout supra parauimus.

CAP. XXXI.

AD obstructionem iocineris sorbitionem è furfure ad hunc modum parato, capillorum ueneris recentis manip. tres, aquæ è fonte libras tres, coquito intesta recenti quousque aqua fuluum naeta sit colorem. Collatoq; & in collaturam furfuris è recenti tritico manip. tres linteo excepti infundito, & toties exprimito donec decoctum albescat, fermenti trium dierum in æstate, & unius hebdomadæ in hyeme uncias tres simili modo in decoctum infundito, & toties exprimito quousque aqua candidior appareat. Cum zucaro tandem coquito tandiu quo ad crassitudinem sorbi-

Sorbi-
tio fur-
furacea.

tionis perueniat. Obstructionibus iocineris plurimum
ualet & lienis, præcipue addito scolopendrio, ut simul
cum capillari herba coquatur. Valet & ad alios plu-
rimo usus. Tussi à crassa pituita ortum habenti mirum
in modum prodest cum hyssopo. Febribus etiam phleg-
maticis, & ijs qui colico dolore uexantur, cum cha-
memelo. Aluum ciet, renes mundificat, calculos, &
arenas potenter pellit. Hoc unum huic sorbitioni in-
commodum est, quod appetentiam deijcit, creber eius
usus. Confert & ius cicerum, ut supra parauimus,
adiecta hepatica si hepar afficiatur, aut cæterach si
lien. Sorbitio præterea ex capite arietis decocti cum
chamemelo, passulis, & reliquis cuius supra memini-
mus maxime prodest ad antiquas, & induratas ob-
structiones.

C A P. XXXII.

FLVXVS uentris si statim inter morbi initia
eueniat, sistendus ideo uidetur esse, quia eo tempore
ui morbi potius quàm naturæ actione regulariter agen-
tis euenit. Proinde cum speculatio hæc ad curati-
uam methodum spectet, solum ea quæ ad uictus ratio-
nem attinent dicimus. Cæterum cum alius liquida
inter febris initia à ui morbi irritata natura fiat, ne-
cesse est ut ex eo labor & uirium iactura sequan-
tur. Quarum enim natura per seipsa auctor est ef-
fluxionum

fluxionum non morbi initio sed post crīsim fiunt. Roborare igitur naturam à morbi uiolentia oppressam expedit cibo crassiori, quam pro morbi acuminis ratione. Nam symptomati illud indulgendum est. Ut si Socratem ponas causo laborare cum aluo liquida, non potu solo (quem uictū alias causus exposcit) sed sorbitiuncula ex ptisanæ cremore hunc nutries. Hoc uoluit Hyppocrates quarto de ratione uictus de causi alio genere agens, quē nothum Gal. appellat, ubi sorbitiones attractorias dari iubet. Idem ab eodem in tertio cum de deiectionibus biliosis puris & spumosis ageret discimus. Sed de ijs satis in primo libro diximus. Sic ergo manifestum est ex dictis Hypp. & Gal. quibuscunque in febribus aluus ab initio liquida est, crassiori uictu febricitantes quàm morbi acumen exposcat, alendos esse. Nam ut plurimum huiusmodi uentris fluxus inter morbi initia euenientes si permanent, corpus absument contabefaciuntq; Quā ob rem colliquantium febrium inditia sunt et effectus. Quod à Gal. in quarto de ratione uictus in expositione illius quibus aluus per febres &c. Scriptū est in hæc uerba. Nam ut cætera omittam cū aluus liquida esse possit, tum propter phlegmonem, tum propter cōtabefacientem colliquantemq; febrem, frigida potus phlegmoni contrarius est &c. Sed forsā quis nobis illud Hippocr. secundo de ratione uictus obijciat. Ingens si quidem malum est, si ob laborem morbique acumen imbecillitato porrexerit quis potū uel sorbitionem &c. duplicem imbecillitatem in febribus contingere posse

X dicimus.

DE VICTV FEBRICIT.

dicimus. Alteraq; ex sola spiritus substantiæ resolutione fit. De qua intellexit Gal. cum loco citato dixit. Ob dolores sæpius ægri sine pulsu animique deliquia incurrunt & nullo pacto queunt moueri. Altera uero ex defectu materiæ ad eorū generationem, quam tetigit loco citato sub ijs uerbis. Sunt autem, inquit quibus non ob hæc uirtus offenditur, sed ob uasorum quomodolibet factam euacuationem. De primo imbecillitatis modo intellexit Hip. cum dixit ingens siquidem malum est &c. Vbi ostendimus secundum mentem Galeni, qui laborantibus huiusmodi imbecillitate cibum exhibent, maximum operari malum. Eos uero qui ob defectum materiæ ad generationem spiritus infirmiores sunt, cibari quàm celerrime oportet. Immo si quis tenui uictu hos alat, non parum ledet. In febribus autem quæ cum aluo liquida imbecillitates, sunt, eas partim ab euacuatione illa ortum habere suspicari medicum æquum est. Quapropter quantum euacuationi occasionis dat, eo tantū tenui uictui parcendum est, & crassiori indulgendum. Sed non ab re fuerit Anglæ mulieris curationē referre, quæ ad iam dictorum intellectum non parum proderit. Pharmacolæ hispani uxor ardenti febre correpta est. Aluus perpetuo liquida erat, uigilias patiebantur, & uentri culi immoderatum ardorem. Deiectiones febrilem æstum non exstinguebant. Huic aquā ordeï solum propinandam fore aliqui suadebant, morbi nanq; acumē crassiorem uictum non exposcere iudicabant. Alij medicaminibus peracuti morbi uim compescere melius esse.

esse. Alij immoderatum ventris profluvium, ijs quæ astringerent sistendum fore existimabant, ea de causa quia nullum ex eo ægrotans lenamen perciperet. Mea quidē prævaluit sententia, ut nec astringentibus fluxus ventris cohiberetur, nec ad nulla medicamina tunc adesse occasionē, nullōq; alio eos tēpestivius uti posse remedio, q̃ cassiori pro morbi ratione viētū, laborantis naturā roborare. Posse siquidem eo modo citæ alui symptoma minori ferre incōmodo. Quapropter crassa sorbitione ex pulla gallinacea convenientibus herbis tēperata, mulierē per aliquot dies nutriui, nullo alio utens remedio. Sic quidem illa acutū morbum evasit, solo cōpetenti viētū. Unde collegi in febre acuta cū immoderato ventris fluxu, saluberrimū esse id solum medicū curare, ut naturam crassiori viētū roboraret. Sed qñ astringente cibo & potu utendū sit, deinceps considerandum est. In acutis febribus morbi effectricem causam extra corpus pellere modis omnibus damus operam. Cum autem aliqua evacuatio sponte evenit & si intempestive fiat, ideo sistenda non est, quia noxij humoris superabundantis excerni portionem suspicandum est. Et si in huiusmodi intempestivis alui deiectionibus multum eius quod utile & nature conueniēs est euacuari certo sciamus, non ob id compescere aluum citam oportet. Nam maius ex retentione pravi humoris solet incommodum sequi, aucta febre & incrementibus ob id symptomatibus robur virtutis deuorantibus, quā sit imbecillitatis damnum, quod contrarium operantes vereri possent.

X ij Quapro-

DE VICTV FEBRICIT.

Quapropter consulentes febrī & eius symptomatibus fluxum ventris non sistimus, uirium robori crassiori uirtuti prouidentes. Intelligendum tamen est, quod in solo eo qui ob liquefacientes febres fit fluxu, sorbitiones frigidiores & crassioris substantiæ offerimus, potusque qui astringentia participant facultate. Vt liquefactioni plus obstat, non ut aluum sistant. Quod enim iam dissolutum ex membris est à violento febris incendio, retinere intra corpus consilium non est. Ob id diuinus Hippocrates cum in libris de ratione victus multis in locis meminisset fluxus alui in febribus, semel tantum potus astringentis, & crassioris substantiæ sorbitionis meminit. Nēpe cum alius liquida fuerit et liquefaciēs. Videtur mihi, inquit, sorbitiones frigidiores & spissiores offerendas esse & potus qui sistant uino siiores uel etiam astringentiores. In reliquis autem aliquando purgationem adhibere suadet, tantum abest ut fluxus eos inhiberi consulat. Vt in eo liquida alui habenti &c. Præterea in eo sorbitiones attractorias. Quandoque pedes calefacere iubet cæromatis & fasciis ob uolens, ita ut reliquo corpore frigidiores non sint. Cæterum scire oportet omnem ventris fluxum à duabus euenire causis, nempe à noxa facultatis expultricis aut retentricis. Vbi igitur aluus liquida ab irritata expultrice fit, fluxum astringentibus cōpescere haud tutum est, in morbis præsertim acutis. Cū uero ab imbecillitate retentricis aluus liquida fit, cibo & potu astringentibus cohibenda est in omni febre & in omni morbo. Incolliquantibus igitur febribus ob id quod liquefactio

quefactio retentricis imbecillitatem magis quam ex pultrici fortitudinem aut irritationem arguit non immerito Hyp. crassiores sorbitiones frigidioresque, & potus qui si stant uinifiores astringentiores que ministrare iubet. Quibuscunque igitur in morbis alius liquida ob retentricis imbecillitatem fiat, astringenti cibo & potu uti oportet. A symptomate potiore quam a morbo sumpta indicatione. Cum ijs tamen prius experiri oportebit, quæ moderate astringant, non penitus neglecta ea quæ a morbo sumitur indicatione. Iis igitur cibarijs potissime utemur, quæ leuissime sint coctionis, & bonum præsent corpori alimentum, parumque grauent ventriculum. Ob defectum primi, carnes bouinæ non competunt, ob secundi, lentes, ob tertij rixum utile non est. Hepata gallinaceorum satis assa in vino austero infusa non inutilia sunt. Diu tamen in uentriculo immorantur, quapropter assa in vino infusa in sorbitiones dissoluere expediet. Sic enim efficacius retentricem facultatem roborabunt. Succus perdicis satis asse omnia quæ exegimus habet eo tamen uti cum pane ægrotanti commodius erit. Phasianus similiter optima caro est, & magis nutrit, quam perdix, minus tamen imbecilles particulas roborat. Caro enim Phasiani media est inter perdicem & pullam gallinaceam. Quæ nam victus forma, & qualitas ijs qui liquefacientibus detinentur febribus conueniat, supra dictum est.

F I N I S.

Series literarum.

A B C D E F G H I K L M N O P Q
R S T V X.

Omnes quaterniones, præter X duernionem.



VENETIIS PER IOANNEM RVBEVM
M D LVIII.

